# Panc-1-celler

300228

PANC-1-celler, som stammer fra et pankreasgangkarsinom hos en 56 år gammel kaukasisk mann, er en sentral epitelcellelinje i kreftforskningen, særlig i studiet av pankreaskarsinom. Panc1-celler er en nyttig modell for å studere bukspyttkjertelkreft, inkludert duktale adenokarsinomcellelinjer og deres tumorgeniske potensial.
Cellenes epitelmorfologi og deres evne til å fremvise ulike morfologiske mønstre understreker deres relevans når det gjelder å etterligne den klonale heterogeniteten og det komplekse mikromiljøet man ser ved duktalt adenokarsinom i bukspyttkjertelen (PDAC).
PANC-1-celler uttrykker markører som vimentin og somatostatinreseptorer som SSTR2, som spiller en avgjørende rolle i nevroendokrin differensiering. Denne uttrykksprofilen, kombinert med cellenes evne til å uttrykke markører for epitelial-mesenkymal transisjon (EMT) og skifte EMT-subtype, gjør dem til en utmerket plattform for å utforske terapeutiske strategier rettet mot EMT-prosessen og nevroendokrine trekk ved bukspyttkjertelkreft.
Den karyotypiske analysen av cellelinjen viser en hyperdiploid tilstand med betydelige genetiske endringer, inkludert tap av Y-kromosomet og mutasjoner i kritiske gener som CDKN2A og p53-genet.
PANC-1-celler er en mangefasettert modell for forskning på bukspyttkjertelkreft, som muliggjør detaljerte undersøkelser av fenotypen og genotypen til adenokarsinom i bukspyttkjertelen, effekten av målrettede behandlinger og de molekylære mekanismene som driver kreftutviklingen.

## GENERELL INFORMASJON

### Beskrivelse

PANC-1-celler, som stammer fra et pankreasgangkarsinom hos en 56 år gammel kaukasisk mann, er en sentral epitelcellelinje i kreftforskningen, særlig i studiet av pankreaskarsinom. Panc1-celler er en nyttig modell for å studere bukspyttkjertelkreft, inkludert duktale adenokarsinomcellelinjer og deres tumorgeniske potensial.
Cellenes epitelmorfologi og deres evne til å fremvise ulike morfologiske mønstre understreker deres relevans når det gjelder å etterligne den klonale heterogeniteten og det komplekse mikromiljøet man ser ved duktalt adenokarsinom i bukspyttkjertelen (PDAC).
PANC-1-celler uttrykker markører som vimentin og somatostatinreseptorer som SSTR2, som spiller en avgjørende rolle i nevroendokrin differensiering. Denne uttrykksprofilen, kombinert med cellenes evne til å uttrykke markører for epitelial-mesenkymal transisjon (EMT) og skifte EMT-subtype, gjør dem til en utmerket plattform for å utforske terapeutiske strategier rettet mot EMT-prosessen og nevroendokrine trekk ved bukspyttkjertelkreft.
Den karyotypiske analysen av cellelinjen viser en hyperdiploid tilstand med betydelige genetiske endringer, inkludert tap av Y-kromosomet og mutasjoner i kritiske gener som CDKN2A og p53-genet.
PANC-1-celler er en mangefasettert modell for forskning på bukspyttkjertelkreft, som muliggjør detaljerte undersøkelser av fenotypen og genotypen til adenokarsinom i bukspyttkjertelen, effekten av målrettede behandlinger og de molekylære mekanismene som driver kreftutviklingen.

| | |
|---|---|
| **Vev** | Bukspyttkjertelen |
| **Sykdom** | Adenokarsinom |

### Synonymer

- PANC-1
- PANC.1
- Panc 1
- PanC1
- Panc1
- PANC1
- Panc-1-P

## KLASSIFISERING

| | |
|---|---|
| **Organisme** | Menneske |
| **Sex** | Mann |

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

| | |
|---|---|
| **Vekstegenskaper** | Tilhenger |
| **Biosikkerhetsnivå** | 1 |

## EGENSKAPER

| | |
|---|---|
| **Tumorinduserende** | Vekst i myk agar. Dannelse av progressivt voksende karsinomer i nakne athymiske mus. |

**Karyotype**

Tre distinkte markørkromosomer og ett ringkromosom

## IDENTIFIKATORER

**Kildehenvisning**

Panc-1 (Cytion katalognummer 300228)

| | |
|---|---|
| **NCBI-skattenummer** | 9606 |
| **Cellosaurus** | CVCL_0480 |

## UTTRYKK OG MOTTAKELIGHET

**Proteinekspresjon**

P53-positiv, CEA-negativ

**Isoenzymer**

G6PD, B

**Mutasjonsprofil**

Panc-1-celler bærer en heterozygot Kras-mutasjon i kodon12: GGT(Wt Gly) >GAT(Asp)

## HÅNDTERING OG KULTUR

**Næringsmedium**

DMEM, m: 4,5 g/L glukose, m: 4 mM L-glutamin, m: 3,7 g/L NaHCO3, m: 1,0 mM natriumpyruvat (Cytion artikkelnummer 820300a)

| | |
|---|---|
| **Inkubasjonsatmosfære** | 37 °C, 5 %CO2, befuktet atmosfære. |

**Kosttilskudd**

Suppler mediet med 10 % FBS

| | |
|---|---|
| **Dissosiasjonsmiddel** | Accutase |

**Subkultivering**

Fjern det gamle mediet fra de adherente cellene, og vask dem med PBS uten kalsium og magnesium. Bruk 3-5 ml PBS for T25-kolber og 5-10 ml for T75-kolber. Dekk deretter cellene helt med Accutase, med 1-2 ml for T25-kolber og 2,5 ml for T75-kolber. La cellene inkubere i romtemperatur i 8-10 minutter for å løsne dem. Etter inkubasjon blandes cellene forsiktig med 10 ml medium for å resuspendere dem, og sentrifuger deretter ved 300xg i 3 minutter. Kast supernatanten, resuspender cellene i nytt medium, og overfør dem til nye kolber som allerede inneholder nytt medium.

| | |
|---|---|
| **Såtetthet** | 1 x $10^4$ celler/$cm^2$ |
| **Væskefornyelse** | 2 til 3 ganger per uke |
| **Gjenoppretting etter tining** | Etter tining, plasser cellene på 5 x $10^4$ celler/$cm^2$ og la cellene komme seg etter fryseprosessen og feste seg i minst 48 timer. |

### Tining og dyrking

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

## KVALITETSKONTROLL OG KRYOKONSERVERING

### Sterilitet

Mykoplasma-kontaminering utelukkes ved hjelp av både PCR-baserte analyser og luminescensbaserte metoder for påvisning av mykoplasma.
For å sikre at det ikke finnes bakterie-, sopp- eller gjærkontaminering, blir cellekulturene inspisert visuelt hver dag.

| | |
|---|---|
| **Frysemedium** | Som kryopreserveringsmedium bruker vi komplett vekstmedium (inkludert FBS) + 10 % DMSO for tilstrekkelig levedyktighet etter opptining, eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som inneholder optimaliserte osmobeskyttende midler og metabolske stabilisatorer for å øke utvinningen og redusere kryoindusert stress. |

### Oppbevaringsbetingelser

For langtidsoppbevaring plasseres hetteglassene i flytende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Lagring ved -80 °C er kun akseptabelt som et kort mellomtrinn før overføring til flytende nitrogen.

### Fraktvilkår

Kryopreserverte cellelinjer sendes på tørris i validert, isolert emballasje med tilstrekkelig kjølemiddel til å opprettholde en temperatur på ca. -78 °C under hele transporten. Ved mottak skal beholderen inspiseres umiddelbart, og hetteglassene skal straks overføres til egnet lagringsplass.

## DONOR

| | |
|---|---|
| **Donorens alder** | 56 år |
| **Etnisitet** | Kaukasisk |

## JURIDISK OG SIKKERHET

### Sikkerhetsregler

Når du planlegger å oppbevare et kryovial i flytende nitrogen for senere tining, er det obligatorisk å følge strenge sikkerhetstiltak. Det er viktig å bruke egnede vernehansker og -klær, og det er påbudt å bruke ansiktsmaske eller vernebriller under overføring av frosne prøver til eller fra tanken med flytende nitrogen. Dette er for å redusere risikoen for skader som følge av potensielle kryovæskeeksplosjoner ved fjerning, noe som kan føre til at skarpe fragmenter slynges ut.

### Garanti

Hos Cytion står vi bak kvaliteten og levedyktigheten til produktene våre.
Vi garanterer at cellene våre vil være levedyktige ved starten av dyrkingen i 60 dager etter at de er sendt fra våre anlegg.
Vi forsikrer at alle materialer er i samsvar med spesifikasjonene som er beskrevet i analysesertifikatet og/eller produktarket
For fullstendig informasjon, se vår <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantierklæring

| | |
|---|---|
| **Avtale om materialoverføring kreves** | Yes |