Sel HCT-15

300229

Sel HCT-15 berasal dari adenokarsinoma usus besar seorang pria Kaukasia berusia 44 tahun. Lini sel yang dikembangkan pada awal tahun 1970-an ini banyak digunakan dalam bidang penelitian kanker, terutama untuk mengeksplorasi biologi dan pengobatan kanker kolorektal. Secara morfologis, sel HCT-15 dicirikan oleh penampilan seperti epitel dengan kecenderungan untuk tumbuh baik sebagai lapisan tunggal maupun berkelompok, yang menunjukkan heterogenitas seluler yang signifikan. Fitur ini mencerminkan lingkungan seluler yang bervariasi yang ditemukan pada tumor padat, menjadikan HCT-15 model yang berharga untuk mempelajari dinamika tumor dan interaksi seluler dalam lingkungan mikro tumor.
Secara genotipe, sel HCT-15 menunjukkan kariotipe hiperdiploid dengan beberapa kelainan kromosom, yang merupakan ciri khas banyak kanker kolorektal. Ini termasuk mutasi pada onkogen utama dan gen penekan tumor, seperti mutasi pada gen KRAS dan penghapusan yang memengaruhi jalur p53, yang terlibat dalam patogenesis dan perkembangan kanker kolorektal. Sifat-sifat genetik ini menjadikan sel HCT-15 sebagai alat yang sangat penting untuk menyelidiki mekanisme genetik dan molekuler yang terkait dengan perkembangan kanker, metastasis, dan resistensi terhadap terapi.
Penggunaan sel HCT-15 secara luas dalam penelitian telah menghasilkan wawasan yang signifikan tentang jalur molekuler yang terlibat dalam kanker kolorektal, meningkatkan pemahaman kita tentang mekanisme penyakit dan membantu pengembangan terapi yang ditargetkan.

INFORMASI UMUM

Deskripsi

Sel HCT-15 berasal dari adenokarsinoma usus besar seorang pria Kaukasia berusia 44 tahun. Lini sel yang dikembangkan pada awal tahun 1970-an ini banyak digunakan dalam bidang penelitian kanker, terutama untuk mengeksplorasi biologi dan pengobatan kanker kolorektal.
Secara morfologis, sel HCT-15 dicirikan oleh penampilan seperti epitel dengan kecenderungan untuk tumbuh baik sebagai lapisan tunggal maupun berkelompok, yang menunjukkan heterogenitas seluler yang signifikan. Fitur ini mencerminkan lingkungan seluler yang bervariasi yang ditemukan pada tumor padat, menjadikan HCT-15 model yang berharga untuk mempelajari dinamika tumor dan interaksi seluler dalam lingkungan mikro tumor.
Secara genotipe, sel HCT-15 menunjukkan kariotipe hiperdiploid dengan beberapa kelainan kromosom, yang merupakan ciri khas banyak kanker kolorektal. Ini termasuk mutasi pada onkogen utama dan gen penekan tumor, seperti mutasi pada gen KRAS dan penghapusan yang memengaruhi jalur p53, yang terlibat dalam patogenesis dan perkembangan kanker kolorektal. Sifat-sifat genetik ini menjadikan sel HCT-15 sebagai alat yang sangat penting untuk menyelidiki mekanisme genetik dan molekuler yang terkait dengan perkembangan kanker, metastasis, dan resistensi terhadap terapi.
Penggunaan sel HCT-15 secara luas dalam penelitian telah menghasilkan wawasan yang signifikan tentang jalur molekuler yang terlibat dalam kanker kolorektal, meningkatkan pemahaman kita tentang mekanisme penyakit dan membantu pengembangan terapi yang ditargetkan.

Tisu	Kolorektal
Penyakit	Adenokarsinoma

Sinonim

- HCT 15
- HCT.15
- HCT15

KLASIFIKASI

Organisme	Manusia
Seks	Laki-laki
Sifat-sifat pertumbuhan	Pengikut
Tingkat keamanan hayati	1

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

KARAKTERISTIK

Morfologi	Seperti epitel
Tumorigenik	Pada tikus telanjang
Waktu penggandaan	15 jam

PENGIDENTIFIKASI

Referensi

HCT-15 (Nomor katalog Cytion 300229)

Nomor Identifikasi Pajak NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_0292

EKSPRESI DAN KERENTANAN

Ekspresi antigen

Sel-sel tersebut positif mengandung keratin dengan pewarnaan imunoperoksidase.

Virus

Transkriptase balik negatif

PENANGANAN DAN BUDIDAYA

Media kultur

RPMI 1640, w: 2,0 mM Glutamin stabil, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Nomor artikel Cytion 820700a)

Suasana inkubasi	37°C, 5%CO2, atmosfer yang dilembabkan.

Suplemen

Tambahkan media dengan 10% FBS

Reagen disosiasi	Accutase

Perbanyakan sel

Buang media lama dari sel yang melekat dan cuci dengan PBS yang tidak mengandung kalsium dan magnesium. Untuk labu T25, gunakan 3-5 ml PBS, dan untuk labu T75, gunakan 5-10 ml. Kemudian, tutupi sel sepenuhnya dengan Accutase, menggunakan 1-2 ml untuk labu T25 dan 2,5 ml untuk labu T75. Biarkan sel diinkubasi pada suhu kamar selama 8-10 menit untuk melepaskannya. Setelah inkubasi, campurkan sel secara perlahan dengan 10 ml medium untuk meresuspensi sel, kemudian sentrifugasi pada 300xg selama 3 menit. Buang supernatan, resuspensi sel dalam medium segar, dan pindahkan ke dalam labu baru yang sudah berisi medium segar.

Kepadatan penanaman	1 hingga 2 x 10^4 sel/cm^2
Pergantian cairan	2 hingga 3 kali per minggu
Pemulihan pasca-pencairan	Cepat

Pencairan dan pembiakan

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

PENGENDALIAN MUTU DAN KRIOPRESERVASI

Kemandulan

Kontaminasi mikoplasma disingkirkan dengan menggunakan tes berbasis PCR dan metode deteksi mikoplasma berbasis pendaran.
Untuk memastikan tidak ada kontaminasi bakteri, jamur, atau ragi, kultur sel menjalani inspeksi visual setiap hari.

Media pembekuan	Sebagai media kriopreservasi, kami menggunakan media pertumbuhan lengkap (termasuk FBS) + 10% DMSO untuk viabilitas pasca-pencairan yang memadai, atau CM-1 (nomor katalog Cytion 800100), yang mencakup osmoprotektan yang dioptimalkan dan penstabil metabolisme untuk meningkatkan pemulihan dan mengurangi stres yang diinduksi kriopreservasi.

Kondisi penyimpanan

Untuk pengawetan jangka panjang, tempatkan botol dalam nitrogen cair fase uap pada suhu sekitar -150 hingga -196 °C. Penyimpanan pada suhu -80 °C hanya dapat diterima sebagai langkah sementara sebelum dipindahkan ke nitrogen cair.

Ketentuan pengiriman

Lini sel kriopreservasi dikirim di atas es kering dalam kemasan terisolasi yang divalidasi dengan refrigeran yang cukup untuk mempertahankan suhu sekitar -78 ° C selama perjalanan. Setelah diterima, segera periksa wadah dan pindahkan botol tanpa penundaan ke tempat penyimpanan yang sesuai.

DONATUR

Usia donor	67 tahun

HUKUM DAN KESELAMATAN

Tindakan pencegahan keselamatan

Ketika berencana menyimpan kriovial dalam nitrogen cair untuk pencairan di masa mendatang, Anda wajib mematuhi langkah-langkah keamanan yang ketat. Sarung tangan dan pakaian pelindung yang tepat sangat penting, dan penggunaan masker wajah atau kacamata pengaman diperlukan selama pemindahan sampel beku ke atau dari tangki nitrogen cair. Hal ini untuk mengurangi risiko cedera akibat potensi ledakan cryovial pada saat pemindahan, yang dapat mengakibatkan proyeksi fragmen tajam.

Garansi

Di Cytion, kami mendukung kualitas dan kelangsungan hidup produk kami.
Kami menjamin bahwa sel kami akan dapat bertahan hidup pada awal kultur selama 60 hari setelah pengiriman dari fasilitas kami.
Kami menjamin bahwa semua bahan sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan dalam Sertifikat Analisis dan / atau Lembar Produk
Untuk detail lengkap, silakan merujuk ke <a href=""/Siapa-kami-Garansi/Garansi/"" hreflang=""x-default"">Pernyataan Jaminan kami

Diperlukan Perjanjian Transfer Material	Yes