Κύτταρα UWO37

300257

Η κυτταρική σειρά UWO37 (HPV16) προέρχεται από τα καρκινικά κύτταρα ενός άνδρα ασθενούς που διαγνώστηκε με καρκίνο της γλώσσας του στόματος και παρουσιάζει έκφραση του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων τύπου 16 (HPV16). Αυτή η κυτταρική σειρά είναι καθοριστικής σημασίας για τη διερεύνηση των μοριακών μηχανισμών με τους οποίους ο HPV16 συμβάλλει στην παθογένεια του πλακώδους καρκινώματος κεφαλής και τραχήλου (HNSCC). Παρέχοντας ένα πρότυπο σύστημα που διατηρεί τα γενετικά και φαινοτυπικά χαρακτηριστικά του αρχικού όγκου, η UWO37 επιτρέπει τη λεπτομερή διερεύνηση της ιικής ογκογένεσης, των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ιικών πρωτεϊνών και των μονοπατιών των κυττάρων-ξενιστών και των κυτταρικών αποκρίσεων στην ενσωμάτωση του HPV16.
Η έρευνα που χρησιμοποιεί την κυτταρική σειρά UWO37 επικεντρώνεται στην αποκάλυψη της πολύπλοκης αλληλεπίδρασης μεταξύ του HPV16 και των κυτταρικών μηχανισμών, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο τα ιικά ογκογονίδια, όπως τα E6 και E7, συμβάλλουν στον κυτταρικό μετασχηματισμό και την κακοήθεια. Αυτό το μοντέλο είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τον έλεγχο πιθανών φαρμακολογικών παραγόντων και για την ανάπτυξη προσεγγίσεων γονιδιακής θεραπείας με στόχο τη στόχευση συγκεκριμένων μονοπατιών που μεταβάλλονται από τον HPV16. Επιπλέον, η κυτταρική σειρά UWO37 χρησιμεύει ως πολύτιμο εργαλείο για τη μελέτη της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας νέων ανοσοθεραπευτικών στρατηγικών, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε βελτιωμένη θεραπεία και πρόληψη των καρκίνων που σχετίζονται με τον HPV.

ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Περιγραφή

Η κυτταρική σειρά UWO37 (HPV16) προέρχεται από τα καρκινικά κύτταρα ενός άνδρα ασθενούς που διαγνώστηκε με καρκίνο της γλώσσας του στόματος και παρουσιάζει έκφραση του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων τύπου 16 (HPV16). Αυτή η κυτταρική σειρά είναι καθοριστικής σημασίας για τη διερεύνηση των μοριακών μηχανισμών με τους οποίους ο HPV16 συμβάλλει στην παθογένεια του πλακώδους καρκινώματος κεφαλής και τραχήλου (HNSCC). Παρέχοντας ένα πρότυπο σύστημα που διατηρεί τα γενετικά και φαινοτυπικά χαρακτηριστικά του αρχικού όγκου, η UWO37 επιτρέπει τη λεπτομερή διερεύνηση της ιικής ογκογένεσης, των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ιικών πρωτεϊνών και των μονοπατιών των κυττάρων-ξενιστών και των κυτταρικών αποκρίσεων στην ενσωμάτωση του HPV16.
Η έρευνα που χρησιμοποιεί την κυτταρική σειρά UWO37 επικεντρώνεται στην αποκάλυψη της πολύπλοκης αλληλεπίδρασης μεταξύ του HPV16 και των κυτταρικών μηχανισμών, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο τα ιικά ογκογονίδια, όπως τα E6 και E7, συμβάλλουν στον κυτταρικό μετασχηματισμό και την κακοήθεια. Αυτό το μοντέλο είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τον έλεγχο πιθανών φαρμακολογικών παραγόντων και για την ανάπτυξη προσεγγίσεων γονιδιακής θεραπείας με στόχο τη στόχευση συγκεκριμένων μονοπατιών που μεταβάλλονται από τον HPV16. Επιπλέον, η κυτταρική σειρά UWO37 χρησιμεύει ως πολύτιμο εργαλείο για τη μελέτη της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας νέων ανοσοθεραπευτικών στρατηγικών, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε βελτιωμένη θεραπεία και πρόληψη των καρκίνων που σχετίζονται με τον HPV.

Ιστός	Στοματική κοιλότητα- αμυγδαλές
Ασθένεια	Καρκίνωμα πλακωδών κυττάρων του στοματοφάρυγγα

Εφαρμογές

Δημιουργία ανθεκτικών στη σισπλατίνη HPV-θετικών κυτταρικών σειρών HNSCC για τη μελέτη της αντοχής στη σισπλατίνη σε HPV-θετικά κύτταρα

Συνώνυμα

- University of Western Ontario 37

ΤΑΞΙΝΌΜΗΣΗ

Οργανισμός	Άνθρωπος
Σεξ	Άνδρας
Ιδιότητες ανάπτυξης	Πιστός
Επίπεδο βιοασφάλειας	2

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΆ

Παραπομπή

UWO37 (αριθμός καταλόγου Cytion 300257)

Αριθμός φορολογικού μητρώου NCBI	9606
Κελλοσαύρος	CVCL_B7MH

ΈΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑ

Ιοί

Μετασχηματιστής: Ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων τύπου 16 (HPV16)- ασθενής έκφραση του HPV16 E7

ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΑ

Θρεπτικό μέσο

DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3,1 g/L γλυκόζη, w: 2,5 mM L-γλουταμίνη, w: 15 mM HEPES, w: 0,5 mM πυρουβικό νάτριο, w: 1,2 g/L NaHCO3 (αριθμός άρθρου Cytion 820400a)

Ατμόσφαιρα επώασης	37°C, 5%CO2, υγροποιημένη ατμόσφαιρα.

Συμπληρώματα

Συμπληρώστε το μέσο με 10% FBS

Αντιδραστήριο αποσύνδεσης	Accutase

Αναπαραγωγή σε υποκαλλιέργεια

Αφαιρέστε το παλιό μέσο από τα προσκολλημένα κύτταρα και πλύντε τα με PBS που δεν περιέχει ασβέστιο και μαγνήσιο. Για φιάλες T25, χρησιμοποιήστε 3-5 ml PBS και για φιάλες T75, χρησιμοποιήστε 5-10 ml. Στη συνέχεια, καλύψτε πλήρως τα κύτταρα με Accutase, χρησιμοποιώντας 1-2 ml για φιάλες T25 και 2,5 ml για φιάλες T75. Αφήστε τα κύτταρα να επωαστούν σε θερμοκρασία δωματίου για 8-10 λεπτά για να αποκολληθούν. Μετά την επώαση, αναμείξτε απαλά τα κύτταρα με 10 ml μέσου για να ανασυσταθούν και, στη συνέχεια, φυγοκεντρίστε στα 300xg για 3 λεπτά. Απορρίψτε το υπερκείμενο υγρό, ανασυστάστε τα κύτταρα σε φρέσκο μέσο και μεταφέρετέ τα σε νέες φιάλες που περιέχουν ήδη φρέσκο μέσο.

Απόψυξη και καλλιέργεια

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΡΥΟΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

Στειρότητα

Η μόλυνση από μυκόπλασμα αποκλείεται με τη χρήση τόσο των δοκιμασιών που βασίζονται στην PCR όσο και των μεθόδων ανίχνευσης μυκοπλάσματος με βάση τη φωταύγεια.
Για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει μόλυνση από βακτήρια, μύκητες ή ζύμες, οι κυτταροκαλλιέργειες υποβάλλονται σε καθημερινές οπτικές επιθεωρήσεις.

Μέσο κατάψυξης	Ως μέσο κρυοσυντήρησης, χρησιμοποιούμε πλήρες μέσο ανάπτυξης (συμπεριλαμβανομένου του FBS) + 10% DMSO για επαρκή βιωσιμότητα μετά την απόψυξη, ή CM-1 (αριθμός καταλόγου Cytion 800100), το οποίο περιλαμβάνει βελτιστοποιημένα ωσμοπροστατευτικά και μεταβολικούς σταθεροποιητές για την ενίσχυση της ανάκαμψης και τη μείωση του στρες που προκαλείται από την κρυοσυντήρηση.

Συνθήκες αποθήκευσης

Για μακροχρόνια συντήρηση, τοποθετήστε τα φιαλίδια σε υγρό άζωτο σε φάση ατμών σε θερμοκρασία περίπου -150 έως -196 °C. Η αποθήκευση στους -80 °C είναι αποδεκτή μόνο ως σύντομο ενδιάμεσο βήμα πριν από τη μεταφορά σε υγρό άζωτο.

Όροι αποστολής

Οι κρυοσυντηρημένες κυτταρικές σειρές αποστέλλονται σε ξηρό πάγο σε επικυρωμένη, μονωμένη συσκευασία με επαρκές ψυκτικό μέσο για τη διατήρηση περίπου των -78 °C καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς. Κατά την παραλαβή, επιθεωρήστε αμέσως τον περιέκτη και μεταφέρετε τα φιαλίδια χωρίς καθυστέρηση στην κατάλληλη αποθήκη.

ΔΩΡΗΤΉΣ

Ηλικία δωρητή	64 χρόνια

ΝΟΜΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

Μέτρα ασφαλείας

Όταν σχεδιάζετε να αποθηκεύσετε ένα κρυοφιαλίδιο σε υγρό άζωτο για μελλοντική απόψυξη, είναι υποχρεωτικό να τηρείτε αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Τα κατάλληλα προστατευτικά γάντια και ο κατάλληλος προστατευτικός ρουχισμός είναι απαραίτητα, ενώ απαιτείται η χρήση μάσκας προσώπου ή γυαλιών ασφαλείας κατά τη μεταφορά κατεψυγμένων δειγμάτων προς ή από τη δεξαμενή υγρού αζώτου. Αυτό γίνεται για να μετριαστεί ο κίνδυνος τραυματισμού από πιθανές εκρήξεις κρυοσωλήνων κατά την απομάκρυνση, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην προβολή αιχμηρών θραυσμάτων.

Εγγύηση

Στην Cytion, υποστηρίζουμε την ποιότητα και τη βιωσιμότητα των προϊόντων μας.
Εγγυόμαστε ότι τα κύτταρά μας θα είναι βιώσιμα κατά την έναρξη της καλλιέργειας για 60 ημέρες μετά την αποστολή από τις εγκαταστάσεις μας.
Διαβεβαιώνουμε ότι όλα τα υλικά συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο Πιστοποιητικό Ανάλυσης ή/και στο Φύλλο Προϊόντος
Για πλήρεις λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"">Δήλωση εγγύησης

Απαιτείται συμφωνία μεταφοράς υλικού	Yes