UWO23 Клетки

300258

Клетъчната линия UWO23 (HPV33) е получена от туморни клетки на пациент от мъжки пол с рак на устната кухина и се отличава с експресия на човешки папиломавирус тип 33 (HPV33). Тази специфична характеристика на UWO23 я прави важен ресурс за изследване на онкогенната роля на HPV при плоскоклетъчния карцином на главата и шията (HNSCC). Наличието на HPV33 в тези клетки предоставя уникална възможност да се проучи как този вирус влияе върху процеса на канцерогенеза, особено в контекста на оралната и орофарингеалната област.
Изследванията, при които се използва клетъчната линия UWO23, са насочени към разкриване на молекулярните и генетичните взаимодействия, управлявани от HPV33, които водят до развитието и прогресията на рака. Това включва изучаване на промените в регулацията на клетъчния цикъл, резистентността към апоптоза и промените в клетъчната адхезия и подвижност, които са от решаващо значение за разбирането на поведението на туморите и метастазите. Освен това клетъчната линия UWO23 е от съществено значение за оценката на нови фармакологични лечения и потенциални диагностични биомаркери за ракови заболявания, свързани с HPV. Чрез изясняване на пътищата, по които HPV33 допринася за злокачественото заболяване, изследователите могат да разработят целеви терапии, които биха могли да подобрят терапевтичните резултати за пациентите, страдащи от HPV-свързани ракови заболявания на главата и шията.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Описание

Клетъчната линия UWO23 (HPV33) е получена от туморни клетки на пациент от мъжки пол с рак на устната кухина и се отличава с експресия на човешки папиломавирус тип 33 (HPV33). Тази специфична характеристика на UWO23 я прави важен ресурс за изследване на онкогенната роля на HPV при плоскоклетъчния карцином на главата и шията (HNSCC). Наличието на HPV33 в тези клетки предоставя уникална възможност да се проучи как този вирус влияе върху процеса на канцерогенеза, особено в контекста на оралната и орофарингеалната област.
Изследванията, при които се използва клетъчната линия UWO23, са насочени към разкриване на молекулярните и генетичните взаимодействия, управлявани от HPV33, които водят до развитието и прогресията на рака. Това включва изучаване на промените в регулацията на клетъчния цикъл, резистентността към апоптоза и промените в клетъчната адхезия и подвижност, които са от решаващо значение за разбирането на поведението на туморите и метастазите. Освен това клетъчната линия UWO23 е от съществено значение за оценката на нови фармакологични лечения и потенциални диагностични биомаркери за ракови заболявания, свързани с HPV. Чрез изясняване на пътищата, по които HPV33 допринася за злокачественото заболяване, изследователите могат да разработят целеви терапии, които биха могли да подобрят терапевтичните резултати за пациентите, страдащи от HPV-свързани ракови заболявания на главата и шията.

Тъкан	Устна кухина; език
Заболяване	Плоскоклетъчен карцином на устната кухина на езика

Приложения

Генериране на цисплатин резистентни HPV-позитивни HNSCC клетъчни линии за изследване на резистентността към цисплатин в HPV-позитивни клетки

Синоними

- University of Western Ontario 23

КЛАСИФИКАЦИЯ

Организъм	Човек
Секс	Мъж
Свойства, свързани с растежа	Привърженик
Ниво на биологична безопасност	2

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

ИДЕНТИФИКАТОРИ

Източник

UWO23 (каталожен номер 300258 на Cytion)

Данъчен идентификационен номер в NCBI	9606
Целозавър	CVCL_B7MF

ПРОЯВА И ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНОСТ

Вируси

Трансформатор: човешки папиломен вирус тип 33 (HPV33)

ОБРАБОТКА И ОТГЛЕЖДАНЕ

Хранителна среда

DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3,1 g/L глюкоза, w: 2,5 mM L-глутамин, w: 15 mM HEPES, w: 0,5 mM натриев пируват, w: 1,2 g/L NaHCO3 (номер на изделието на Cytion 820400a)

Атмосфера за инкубация	37°C, 5%CO2, овлажнена атмосфера.

Добавки

Допълнете средата с 10% FBS

Реагент за дисоциация	Accutase

Пресаждане

Отстранете старата среда от адхезивните клетки и ги промийте с PBS, която не съдържа калций и магнезий. За колби T25 използвайте 3-5 ml PBS, а за колби T75 - 5-10 ml. След това покрийте клетките изцяло с Accutase, като използвате 1-2 ml за колби T25 и 2,5 ml за колби T75. Оставете клетките да се инкубират на стайна температура за 8-10 минути, за да се отделят. След инкубацията внимателно разбъркайте клетките с 10 ml среда, за да ги ресуспендирате, след което центрофугирайте при 300xg за 3 минути. Изхвърлете супернатантата, ресуспендирайте клетките в прясна среда и ги прехвърлете в нови колби, които вече съдържат прясна среда.

Размразяване и култивиране

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И КРИОКОНСЕРВАЦИЯ

Стерилност

Замърсяването с микоплазма се изключва както чрез PCR-базирани анализи, така и чрез луминесцентни методи за откриване на микоплазма.
За да се гарантира, че няма бактериално, гъбично или дрождево замърсяване, клетъчните култури се подлагат на ежедневни визуални проверки.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Среда за замразяване	Като среда за криоконсервация използваме пълна среда за растеж (включително FBS) + 10% DMSO за адекватна жизнеспособност след размразяване или CM-1 (каталожен номер 800100 на Cytion), която включва оптимизирани осмопротектори и метаболитни стабилизатори за подобряване на възстановяването и намаляване на криоиндуцирания стрес.

Условия за съхранение

За дълготрайно съхранение поставете флаконите в течен азот в парна фаза при температура около -150 до -196 °C. Съхранението при -80 °C е приемливо само като кратък междинен етап преди прехвърлянето в течен азот.

Условия за доставка

Криоконсервираните клетъчни линии се транспортират върху сух лед в утвърдени, изолирани опаковки с достатъчно хладилен агент, за да се поддържа приблизително -78 °C по време на транспортирането. При получаването незабавно прегледайте опаковката и незабавно прехвърлете флаконите за подходящо съхранение.

ДАРИТЕЛ

Възраст на донора	52 години

ПРАВНИ ВЪПРОСИ И БЕЗОПАСНОСТ

Мерки за безопасност

Когато планирате да съхранявате криопрепарат в течен азот за бъдещо размразяване, е задължително да спазвате строги мерки за безопасност. Подходящите защитни ръкавици и облекло са от съществено значение, а по време на прехвърлянето на замразени проби към или от резервоара с течен азот е необходимо да се използва маска за лице или предпазни очила. Това се прави, за да се намали рискът от нараняване от потенциални експлозии на криовиолите при изваждането им, които могат да доведат до изхвърляне на остри фрагменти.

Гаранция

Ние в Cytion заставаме зад качеството и жизнеспособността на нашите продукти.
Гарантираме, че нашите клетки ще бъдат жизнеспособни в началото на култивирането в продължение на 60 дни след изпращането им от нашите съоръжения.
Гарантираме, че всички материали отговарят на спецификациите, описани в сертификата за анализ и/или продуктовата листа
За пълни подробности, моля, направете справка с нашата <a href=""/Кои сме ние/Гаранция/"" hreflang=""x-default"">Гаранционна декларация

Необходимо е споразумение за прехвърляне на материали	Yes