UWO23 Solut

300258

UWO23 (HPV33) -solulinja on peräisin suulakielisyöpää sairastavan miespotilaan kasvainsoluista, ja se ilmentää erityisesti ihmisen papilloomaviruksen tyyppiä 33 (HPV33). Tämä UWO23:n erityispiirre tekee siitä kriittisen resurssin, kun tutkitaan HPV:n onkogeenistä roolia pään ja kaulan levyepiteelisolusyövässä (HNSCC). HPV33:n esiintyminen näissä soluissa tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia, miten tämä virus vaikuttaa karsinogeneesiprosessiin erityisesti suun ja nielun alueella.
UWO23-solulinjaa hyödyntävässä tutkimuksessa keskitytään paljastamaan HPV33:n ohjaamia molekulaarisia ja geneettisiä vuorovaikutuksia, jotka johtavat syövän kehittymiseen ja etenemiseen. Tähän sisältyy solusyklin säätelyn muutosten, apoptoosiresistenssin sekä solujen adheesion ja liikkuvuuden muutosten tutkiminen, jotka kaikki ovat ratkaisevia kasvainten käyttäytymisen ja metastaasin ymmärtämisen kannalta. Lisäksi UWO23-solulinja on tärkeä uusien farmakologisten hoitojen ja mahdollisten diagnostisten biomarkkereiden arvioinnissa HPV:hen liittyvien syöpien osalta. Selvittämällä reittejä, joiden kautta HPV33 vaikuttaa pahanlaatuisuuteen, tutkijat voivat kehittää kohdennettuja hoitoja, jotka voivat parantaa hoitotuloksia potilaille, jotka kärsivät HPV:hen liittyvistä pään ja kaulan alueen syövistä.

YLEISTÄ TIETOA

Kuvaus

UWO23 (HPV33) -solulinja on peräisin suulakielisyöpää sairastavan miespotilaan kasvainsoluista, ja se ilmentää erityisesti ihmisen papilloomaviruksen tyyppiä 33 (HPV33). Tämä UWO23:n erityispiirre tekee siitä kriittisen resurssin, kun tutkitaan HPV:n onkogeenistä roolia pään ja kaulan levyepiteelisolusyövässä (HNSCC). HPV33:n esiintyminen näissä soluissa tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia, miten tämä virus vaikuttaa karsinogeneesiprosessiin erityisesti suun ja nielun alueella.
UWO23-solulinjaa hyödyntävässä tutkimuksessa keskitytään paljastamaan HPV33:n ohjaamia molekulaarisia ja geneettisiä vuorovaikutuksia, jotka johtavat syövän kehittymiseen ja etenemiseen. Tähän sisältyy solusyklin säätelyn muutosten, apoptoosiresistenssin sekä solujen adheesion ja liikkuvuuden muutosten tutkiminen, jotka kaikki ovat ratkaisevia kasvainten käyttäytymisen ja metastaasin ymmärtämisen kannalta. Lisäksi UWO23-solulinja on tärkeä uusien farmakologisten hoitojen ja mahdollisten diagnostisten biomarkkereiden arvioinnissa HPV:hen liittyvien syöpien osalta. Selvittämällä reittejä, joiden kautta HPV33 vaikuttaa pahanlaatuisuuteen, tutkijat voivat kehittää kohdennettuja hoitoja, jotka voivat parantaa hoitotuloksia potilaille, jotka kärsivät HPV:hen liittyvistä pään ja kaulan alueen syövistä.

Kudos	Suuontelo; kieli
Sairaus	Suun kielen levyepiteelisyöpä

Sovellukset

Sisplatiiniresistenttien HPV-positiivisten HNSCC-solulinjojen tuottaminen HPV-positiivisten solujen sisplatiiniresistenssin tutkimiseksi

Synonyymit

- University of Western Ontario 23

LUOKITTELU

Organismi	Ihminen
Sukupuoli	Mies
Kasvuominaisuudet	Kiinnittynyt
Bioturvallisuustaso	2

TUNNISTEET

Lähdeviite

UWO23 (Cytionin luettelonumero 300258)

NCBI-verotunnus	9606
Cellosaurus	CVCL_B7MF

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

ILMENTYMINEN JA ALTTIUS

Virukset

Transformantti: ihmisen papilloomavirus tyyppi 33 (HPV33)

KÄSITTELY JA VILJELY

Viljelyalusta

DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3,1 g/L glukoosia, w: 2,5 mM L-glutamiinia, w: 15 mM HEPES, w: 0,5 mM natriumpyruvaattia, w: 1,2 g/L NaHCO3 (Cytionin artikkelinumero 820400a)

Inkubaatioilma	37 °C, 5 %CO2, kostutettu ilmakehä.

Ravintolisät

Täydennetään elatusainetta 10 %:lla FBS:llä

Dissosiaatioreagenssi	Accutase

Soluviljely

Poista vanha väliaine tarttuneista soluista ja pese ne PBS:llä, josta puuttuu kalsiumia ja magnesiumia. Käytä T25-pulloissa 3-5 ml PBS:ää ja T75-pulloissa 5-10 ml. Peitä sitten solut kokonaan Accutase-valmisteella, käyttäen 1-2 ml T25-pulloissa ja 2,5 ml T75-pulloissa. Anna solujen inkuboitua huoneenlämmössä 8-10 minuuttia solujen irtoamiseksi. Inkuboinnin jälkeen solut sekoitetaan varovasti 10 ml:n väliaineella niiden resuspendoimiseksi ja sentrifugoidaan sitten 300xg:n nopeudella 3 minuutin ajan. Hävitä supernatantti, suspendoi solut uudelleen tuoreeseen väliaineeseen ja siirrä ne uusiin pulloihin, jotka sisältävät jo tuoretta väliaineita.

Sulatus ja viljely

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

LAADUNVALVONTA JA KRYOSÄILYTYS

Hedelmättömyys

Mykoplasmakontaminaatio suljetaan pois sekä PCR-pohjaisilla määrityksillä että luminesenssiin perustuvilla mykoplasman osoitusmenetelmillä.
Bakteeri-, sieni- tai hiivakontaminaation välttämiseksi soluviljelmät tarkastetaan päivittäin silmämääräisesti.

Jäädytysaine	Kryosäilytysmediana käytämme täydellistä kasvualustaa (mukaan lukien FBS) + 10 % DMSO:ta riittävän sulatuksen jälkeisen elinkelpoisuuden varmistamiseksi tai CM-1:tä (Cytionin luettelonumero 800100), joka sisältää optimoituja osmoprotectantteja ja metabolisia stabilisaattoreita, jotka parantavat elpymistä ja vähentävät kryosäilytyksen aiheuttamaa stressiä.

Säilytysolosuhteet

Pitkäaikaissäilytystä varten injektiopullot asetetaan höyryfaasissa olevaan nestemäiseen typpeen noin -150 - -196 °C:een. Säilytys -80 °C:ssa on hyväksyttävää vain lyhyenä välivaiheena ennen siirtoa nestemäiseen typpeen.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Toimitusehdot

Kryosäilytetyt solulinjat kuljetetaan kuivajäässä validoidussa, eristetyssä pakkauksessa, jossa on riittävästi kylmäainetta, jotta lämpötila pysyy noin -78 °C:ssa koko kuljetuksen ajan. Pakkaus on tarkastettava välittömästi sen vastaanottamisen jälkeen ja injektiopullot on siirrettävä viipymättä asianmukaiseen varastoon.

LAHJOITTAJA

Luovuttajan ikä	52 vuotta

OIKEUDELLISET JA TURVALLISUUSASIAT

Turvallisuusohjeet

Kun suunnitellaan kryoputken säilyttämistä nestemäisessä typessä sulatusta varten, on noudatettava tiukkoja turvatoimenpiteitä. Asianmukaiset suojakäsineet ja -vaatteet ovat välttämättömiä, ja kasvonaamarin tai suojalasien käyttö on välttämätöntä siirrettäessä jäädytettyjä näytteitä nestetyppisäiliöön tai siitä pois. Tällä pyritään pienentämään loukkaantumisriskiä, joka aiheutuu kryoputkien mahdollisista räjähdyksistä, jotka voivat aiheuttaa terävien sirpaleiden sinkoutumisen.

Takuu

Me Cytionilla seisomme tuotteidemme laadun ja elinkelpoisuuden takana.
Takaamme, että solumme ovat elinkelpoisia viljelyn alkaessa 60 päivän ajan sen jälkeen, kun ne on lähetetty laitoksestamme.
Vakuutamme, että kaikki materiaalit ovat analyysitodistuksessa ja/tai tuoteselosteessa kuvattujen eritelmien mukaisia
Lisätietoja on <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"">Takuulausumassa

Aineiden siirtoa koskeva sopimus vaaditaan	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB