תאי UWO23

300258

נגזר מתאי הגידול של חולה גבר הסובל מסרטן הלשון, והוא בולט במיוחד בשל ביטויו של נגיף הפפילומה האנושי מסוג 33 (HPV33) קו התאים UWO23 בקרצינומה של תאי קשקש בראש ובצוואר HPV הופכת אותו למשאב חיוני למחקר על תפקידו האונקוגני של UWO23 תכונה ספציפית זו של (HPV33). בתאים אלה מספקת הזדמנות ייחודית לחקור כיצד נגיף זה משפיע על תהליך הקרצינוגנזה, במיוחד בהקשר של אזורי הפה HPV33 נוכחות (HNSCC). והלוע.

המובילות להתפתחות HPV33, מתמקדים בחשיפת האינטראקציות המולקולריות והגנטיות המונעות על ידי UWO23 מחקרים המשתמשים בקו התאים והתקדמות הסרטן. זה כולל מחקר של שינויים בוויסות מחזור התא, עמידות לאפופטוזיס ושינויים בהידבקות ובתנועתיות התאית, כולם גורמים מכריעים מסייע בהערכת טיפולים תרופתיים חדשים וסמנים ביולוגיים אבחנתיים פוטנציאליים לסרטן UWO23 להבנת התנהגות הגידול והגרורות. בנוסף, קו התאים תורם לממאירות, חוקרים יכולים לפתח טיפולים ממוקדים העשויים לשפר את תוצאות הטיפול HPV33 על ידי הבהרת המסלולים דרכם HPV-הקשור ל-HPV בחולים הסובלים מסרטן הראש והצוואר הקשור ל.

GENERAL INFORMATION

Description

נגזר מתאי הגידול של חולה גבר הסובל מסרטן הלשון, והוא בולט במיוחד בשל ביטויו של נגיף הפפילומה האנושי מסוג 33 (HPV33) קו התאים UWO23 בקרצינומה של תאי קשקש בראש ובצוואר HPV הופכת אותו למשאב חיוני למחקר על תפקידו האונקוגני של UWO23 תכונה ספציפית זו של (HPV33). בתאים אלה מספקת הזדמנות ייחודית לחקור כיצד נגיף זה משפיע על תהליך הקרצינוגנזה, במיוחד בהקשר של אזורי הפה HPV33 נוכחות (HNSCC). והלוע.

המובילות להתפתחות HPV33, מתמקדים בחשיפת האינטראקציות המולקולריות והגנטיות המונעות על ידי UWO23 מחקרים המשתמשים בקו התאים והתקדמות הסרטן. זה כולל מחקר של שינויים בוויסות מחזור התא, עמידות לאפופטוזיס ושינויים בהידבקות ובתנועתיות התאית, כולם גורמים מכריעים מסייע בהערכת טיפולים תרופתיים חדשים וסמנים ביולוגיים אבחנתיים פוטנציאליים לסרטן UWO23 להבנת התנהגות הגידול והגרורות. בנוסף, קו התאים תורם לממאירות, חוקרים יכולים לפתח טיפולים ממוקדים העשויים לשפר את תוצאות הטיפול HPV33 על ידי הבהרת המסלולים דרכם HPV-הקשור ל-HPV בחולים הסובלים מסרטן הראש והצוואר הקשור ל.

Tissue	חלל הפה; לשון
Disease	קרצינומה של תאי קשקש בלשון

Applications

HPV-ועמידים לציספלטין, לצורך מחקר על עמידות לציספלטין בתאים חיוביים ל HPV-חיוביים ל HNSCC יצירת קווי תאים

Synonyms

- University of Western Ontario 23

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Male
Growth properties	Adherent
Biosafety level	2

IDENTIFIERS

Citation

UWO23 (מספר קטלוגי Cytion 300258)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_B7MF

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Viruses

טרנספורמנט: נגיף הפפילומה האנושי מסוג 33 (HPV33)

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3.1 g/L גלוקוז, w: 2.5 mM L-גלוטמין, w: 15 mM HEPES, w: 0.5 mM נתרן פירובט, w: 1.2 g/L NaHCO3 (מספר קטלוגי Cytion 820400a)

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, אווירה לחה.

Supplements

10% FBS הוסף לתווך

Dissociation reagent	אקוטאז

Subculturing

T75, השתמש ב-3-5 מ"ל PBS, ועבור בקבוקי T25, ללא סידן ומגנזיום. עבור בקבוקי PBS-הסר את המדיום הישן מהתאים הדבוקים ושטוף אותם ב השאר את .T75 ו-2.5 מ"ל עבור בקבוקי T25 תוך שימוש ב-1-2 מ"ל עבור בקבוקי Accutase-השתמש ב-5-10 מ"ל. לאחר מכן, כסה את התאים לחלוטין ב התאים לדגירה בטמפרטורת החדר למשך 8-10 דקות כדי לנתק אותם. לאחר הדגירה, ערבב בעדינות את התאים עם 10 מ"ל של מדיום כדי להחזיר אותם למשך 3 דקות. השלך את הנוזל העליון, החזר את התאים לתמיסה במדיום טרי והעבר אותם לצלחות חדשות xgלתמיסה, ואז סובב בצנטריפוגה ב-300 שכבר מכילות מדיום טרי.

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

ושיטות זיהוי מיקופלסמה מבוססות לומניסצנציה PCR זיהום במיקופלסמה נשלל באמצעות בדיקות מבוססות.
כדי להבטיח שאין זיהום חיידקי, פטרייתי או שמרי, תרבויות התאים עוברות בדיקות ויזואליות יומיות.

Freeze medium	כדי להבטיח 10% DMSO + (FBS כולל) כמדיום לשימור בקירור, אנו משתמשים במדיום גידול מלא הכולל חומרים אוסמו-, (מספר קטלוגי Cytion 800100) CM-1 חיוניות נאותה לאחר ההפשרה, או מגנים ומייצבי מטבוליזם משופרים כדי לשפר את ההתאוששות ולהפחית את הלחץ הנגרם מהקפאה.

Storage conditions

לשימור לטווח ארוך, יש להניח את הבקבוקונים בחנקן נוזלי במצב של אדי בטמפרטורה של כ-150 עד 196 מעלות צלזיוס. אחסון בטמפרטורה של 80 מעלות צלזיוס מקובל רק כצעד ביניים קצר לפני העברה לחנקן נוזלי.

Shipping conditions

במהלך C-שורות תאים שהוקפאו נשלחות בקרח יבש באריזה מאושרת ומבודדת עם כמות מספקת של חומר קירור כדי לשמור על טמפרטורה של כ-78° ההובלה. עם קבלת המשלוח, יש לבדוק את המכל מיד ולהעביר את הבקבוקונים ללא דיחוי לאחסון מתאים.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

DONOR

Donor age	שנים 52

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

כאשר מתכננים לאחסן קריוביאל בחנקן נוזלי להפשרה עתידית, חובה להקפיד על אמצעי בטיחות מחמירים. יש להקפיד על שימוש בכפפות ובבגדים מגנים מתאימים, וכן על שימוש במסכת פנים או משקפי מגן בעת העברת דגימות קפואות אל מיכל החנקן הנוזלי או ממנו. זאת כדי להפחית את הסיכון לפציעה כתוצאה מפיצוץ אפשרי של הקריוביאל בעת הוצאתו, העלול לגרום להתזת רסיסים חדים.

Warranty

אנו עומדים מאחורי האיכות והכדאיות של המוצרים שלנו, ב-Cytion.
אנו מבטיחים שתאינו יהיו קיימים בתחילת התרבית למשך
60 יום לאחר המשלוח מהמתקנים שלנו.
אנו מבטיחים שכל החומרים תואמים למפרטים המתוארים
בתעודת הניתוח ו/או בדף המוצר.
לפרטים מלאים, אנא עיינו ב
<a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">הצהרת האחריות שלנו

Material Transfer Agreement required	Yes