UWO23 □胞

300258

UWO23 (HPV33)□胞系来源于一名男性口腔舌癌患者的肿瘤□胞，其特别之处在于表达人乳头状瘤病毒 33 型 (HPV33)。UWO23 的这一特性使其成为研究人乳头瘤病毒在头颈部鳞状□胞癌（HNSCC）中致癌作用的重要资源。这些□胞中HPV33的存在为探索这种病毒如何影响癌变过程，尤其是口腔和口咽区域的癌变过程提供了一个独特的机会。

利用 UWO23 □胞系进行的研究重点是揭示 HPV33 驱动的分子和基因相互作用导致癌症的发生和发展。这包括研究 □胞周期调控的改变、□胞凋亡抵抗以及□胞粘附性和运动性的变化，所有这些对于了解肿瘤行为和转移至关重要。此外， UWO23 □胞系还有助于评估新的药物治疗方法和 HPV 相关癌症的潜在诊断生物标记物。通过阐明 HPV33导致恶性肿瘤的途径，研究人员可以开发出靶向疗法，从而改善 HPV相关头颈部癌症患者的治疗效果。

GENERAL INFORMATION

Description

UWO23 (HPV33)□胞系来源于一名男性口腔舌癌患者的肿瘤□胞，其特别之处在于表达人乳头状瘤病毒 33 型 (HPV33)。UWO23 的这一特性使其成为研究人乳头瘤病毒在头颈部鳞状□胞癌（HNSCC）中致癌作用的重要资源。这些□胞中HPV33的存在为探索这种病毒如何影响癌变过程，尤其是口腔和口咽区域的癌变过程提供了一个独特的机会。

利用 UWO23 □胞系进行的研究重点是揭示 HPV33 驱动的分子和基因相互作用导致癌症的发生和发展。这包括研究 □胞周期调控的改变、□胞凋亡抵抗以及□胞粘附性和运动性的变化，所有这些对于了解肿瘤行为和转移至关重要。此外， UWO23 □胞系还有助于评估新的药物治疗方法和 HPV 相关癌症的潜在诊断生物标记物。通过阐明 HPV33导致恶性肿瘤的途径，研究人员可以开发出靶向疗法，从而改善 HPV相关头颈部癌症患者的治疗效果。

Tissue	口腔；舌头
Disease	口腔舌鳞状□胞癌

Applications

生成顺铂耐药的 HPV 阳性 HNSCC □胞系，以研究 HPV 阳性□胞的顺铂耐药性

Synonyms

- University of Western Ontario 23

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Male
Growth properties	Adherent
Biosafety level	2

IDENTIFIERS

Citation

UWO23（Cytion 目录号 300258）

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_B7MF

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Viruses

变形体：人乳头瘤病毒 33 型 (HPV33)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

DMEM:Ham's F12（1:1），w: 3.1 g/L 葡萄糖，w: 2.5 mM L-谷氨酰胺，w: 15 mM HEPES，w: 0.5 mM 丙酮酸钠，w: 1.2 g/L NaHCO3（Cytion 文章编号 820400a）。

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, 加湿环境。

Supplements

在培养基中添加 10% FBS

Dissociation reagent	Accutase

Subculturing

去除粘附□胞上的旧培养基，用不含钙和镁的 PBS 冲洗。T25 烧瓶用 3-5 毫升 PBS，T75 烧瓶用 5-10 毫升。然后用 Accutase 完全覆盖□胞，T25 烧瓶用 1-2 毫升，T75 烧瓶用 2.5 毫升。让□胞在室温下孵育 8-10 分钟，使其分离。孵育后，用 10 毫升培养基轻轻混合□胞使其重悬，然后用 300xg 离心 3 分钟。弃去上清液，用新鲜培养基重悬□胞，并将其转移到已装有新鲜培养基的新烧瓶中。

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

使用基于 PCR 的检测方法和基于发光的支原体检测方法排除支原体污染。
为确保没有□菌、真菌或酵母菌污染，每天都要对□胞培养物进行目视检查。

Freeze medium	我们使用完全生长培养基（包括 FBS）+10% DMSO 或 CM-1（Cytion 商品目录编号 800100）作为冷冻保存培养基，以获得足够的解冻后存活率，CM-1（Cytion 商品目录编号 800100）含有优化的渗透保护剂和代谢稳定剂，可提高恢复能力并减少冷冻引起的应激。

Storage conditions

如需长期保存，可将样品瓶放入气相液氮中，温度约为 -150 至 -196 ℃。在-80 °C下保存只能作为转入液氮前的短暂过渡。

Shipping conditions

冷冻保存的□胞系用干冰装运，并用经过验证的隔热包装和足够的制冷剂在整个运输过程中保持约 -78 °C 的温度。收到货后，应立即检查容器，并立即将小瓶转移到适当的储藏室。

DONOR

Donor age	52 年

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

计划将低温样品储存在液氮中以便将来解冻时，必须遵守严格的安全措施。在将冷冻样本移入或移出液氮罐时，必须穿戴适当的防护手套和防护服，并使用面罩或安全护目镜。这样做是为了降低在移出时因冷冻样品爆炸而造成伤害的风险，因为爆炸可能导致锋利的碎片飞溅。

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Warranty

在Cytion，我们保证产品的质量和活力。
我们保证，从我们的工厂发货后 60 天内，我们的□胞在开始培养时都是存活的。
我们保证所有材料均符合分析证书和/或产品说明书中描述的规格。
有关详□信息，请参阅我们的 <a href="" /Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">保修声明。

Material Transfer Agreement required	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB