خلايا U266 U266

300259

هو خط خلايا الورم النقوي المتعدد البشري الذي تم إنشاؤه من الدم المحيطي لرجل يبلغ من العمر 53 عاماً، U-266 والمعروف أيضاً باسم U266، خط الخلايا مصاب بالورم النقوي IgE. ويتميز هذا الخط الخلوي بإفراز سلاسل الغلوبولين المناعي الخفيف والثقيل على حد سواء، وفي الغالب سلاسل لامبدا الخفيفة علامات نموذجية للخلايا اللمفاوية البائية وقد تم استخدامه على نطاق واسع في دراسة بيولوجيا الورم النقوي، U266 الثقيلة. يُظهر خط الخلايا IgE وسلاسل وخاصة في فهم الآليات الفيزيولوجية المرضية لأورام خلايا البلازما الخبيثة والاستجابة المناعية.

ذات قيمة كبيرة لدورها في اكتشاف الأدوية وتطويرها، حيث توفر نموذجاً قوياً لتقييم فعالية العوامل المضادة للورم النقوي. كما تُستخدم هذه U266 تُعد خلايا الخلايا أيضاً في دراسة تفاعلات خلايا الورم النقوي مع البيئة الدقيقة لنخاع العظم، وهو أمر بالغ الأهمية لفهم تطور الورم النقوي ومقاومة العلاج. كشفت والتي تساهم في نمطها الظاهري الخبيث ومقاومتها للموت المبرمج. كان لهذا، U266 الدراسات الوراثية عن العديد من التشوهات الكروموسومية في خلايا الخط الخلوي دور أساسي في تطوير العلاجات الجزيئية المستهدفة في الورم النقوي المتعدد.

معلومات عامة

الوصف

هو خط خلايا الورم النقوي المتعدد البشري الذي تم إنشاؤه من الدم المحيطي لرجل يبلغ من العمر 53 عاماً، U-266 والمعروف أيضاً باسم U266، خط الخلايا مصاب بالورم النقوي IgE. ويتميز هذا الخط الخلوي بإفراز سلاسل الغلوبولين المناعي الخفيف والثقيل على حد سواء، وفي الغالب سلاسل لامبدا الخفيفة علامات نموذجية للخلايا اللمفاوية البائية وقد تم استخدامه على نطاق واسع في دراسة بيولوجيا الورم النقوي، U266 الثقيلة. يُظهر خط الخلايا IgE وسلاسل وخاصة في فهم الآليات الفيزيولوجية المرضية لأورام خلايا البلازما الخبيثة والاستجابة المناعية.

ذات قيمة كبيرة لدورها في اكتشاف الأدوية وتطويرها، حيث توفر نموذجاً قوياً لتقييم فعالية العوامل المضادة للورم النقوي. كما تُستخدم هذه U266 تُعد خلايا الخلايا أيضاً في دراسة تفاعلات خلايا الورم النقوي مع البيئة الدقيقة لنخاع العظم، وهو أمر بالغ الأهمية لفهم تطور الورم النقوي ومقاومة العلاج. كشفت والتي تساهم في نمطها الظاهري الخبيث ومقاومتها للموت المبرمج. كان لهذا، U266 الدراسات الوراثية عن العديد من التشوهات الكروموسومية في خلايا الخط الخلوي دور أساسي في تطوير العلاجات الجزيئية المستهدفة في الورم النقوي المتعدد.

الأنسجة	خلية البلازما
المرض	الورم النخاعي المتعدد

المرادفات

- U266B1
- U266-B1
- U266 B1
- U-266
- U 266
- U266S
- U266BL
- U266

التصنيف

كائن حي	إنسان
الجنس	ذكر
خصائص النمو	التعليق
مستوى السلامة البيولوجية	1

المعرّفات

المرجع

U266 (300259 الرقم الكتالوجي لسيتيون)

NCBI رقم التعريف الضريبي لدى	9606

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

سيلوصور	CVCL_0566

التعامل مع النباتات وزراعتها

وسط الاستزراع

RPMI 1640، 2.0 جم/لتر ث: 2.0 مللي مولار جلوتامين مستقر، NaHCO3 (820700 مرقم المادة aمن سايتيون)

بيئة الحضانة	37 درجة مئوية، و5% من ثاني أكسيد الكربون في جو مرطب.

المكملات الغذائية

المعطل بالحرارة إلى الوسط FBS إضافة 10% من

إعادة الاستنبات

حافظ على الثقافات عن طريق إضافة أو استبدال الوسط بشكل دوري. ابدأ الثقافات بكثافة 5 × 10^5 خلية/مل وحافظ على تركيز الخلايا في نطاق 3 × 10^5 إلى 1 × 10^6 خلية/مل لتحقيق النمو الأمثل.

كثافة البذر	5 × 10^5 خلية/مل
التعافي بعد ذوبان الجليد	بعد الذوبان اترك الخلايا تتعافى من عملية التجميد لمدة 24 ساعة على الأقل.

إذابة الثلج والزراعة

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

مراقبة الجودة والحفظ بالتبريد

العقم

وطرق الكشف عن الميكوبلازما القائمة على (PCR) يُستبعد التلوث بالميكوبلازما باستخدام كل من المقايسات القائمة على تفاعل البوليميراز المتسلسل التألق.

ولضمان عدم وجود تلوث بكتيري أو فطري أو خميرة يتم إخضاع مزارع الخلايا للفحص البصري اليومي.

وسط التجميد	من أجل الحفاظ DMSO 10% + (FBS بما في ذلك) كوسيط للحفظ بالتبريد، نستخدم وسط نمو كامل والذي يتضمن مواد حماية ،(رقم Cytion 800100 كتالوج) CM-1 على حيوية كافية بعد ذوبان الجليد أو أسموزمويبروتيكتية ومثبتات أيضية مُحسّنة لتعزيز التعافي وتقليل الإجهاد الناجم عن التبريد.

شروط التخزين

للحفظ طويل الأمد، ضع القوارير في نيتروجين سائل في طور البخار عند درجة حرارة تتراوح بين -150 و -196 درجة مئوية تقريباً. يُقبل التخزين عند درجة حرارة -80 درجة مئوية فقط كخطوة مؤقتة قصيرة قبل النقل إلى النيتروجين السائل.

شروط الشحن

تُشحن خطوط الخلايا المحفوظة بالتبريد على ثلج جاف في عبوات معزولة وموثوقة مع مبرد كافٍ للحفاظ على درجة حرارة -78 درجة مئوية تقريبًا طوال فترة النقل. عند الاستلام، افحص الحاوية على الفور وانقل القوارير دون تأخير إلى المخزن المناسب.

المانح

عمر المتبرع	53 سنة

الشؤون القانونية والسلامة

احتياطات السلامة

عند التخطيط لتخزين القارورة المبردة في النيتروجين السائل لإذابتها في المستقبل، من الضروري الالتزام بتدابير السلامة الصارمة. من الضروري ارتداء قفازات وملابس واقية مناسبة، كما يلزم استخدام قناع الوجه أو نظارات السلامة أثناء نقل العينات المجمدة من خزان النيتروجين السائل أو إليه. وذلك للتخفيف من خطر الإصابة من الانفجارات المحتملة للنيتروجين المبرد عند الإزالة، والتي يمكن أن تؤدي إلى قذف شظايا حادة.

الضمان

نلتزم في Cytion، في Cytion بجودة منتجاتنا وحيويتها.
نحن نضمن أن تكون خلايانا قابلة للحياة في بداية الاستزراع لمدة 60 يومًا بعد الشحن من منشآتنا.
نؤكد أن جميع المواد مطابقة للمواصفات الموضحة في شهادة التحليل و/أو ورقة المنتج
بيان الضمان<a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">للحصول على التفاصيل الكاملة، يُرجى الرجوع إلى

يلزم إبرام اتفاقية نقل المواد	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB