Buňky U266

300259

Buněčná linie U266, známá také jako U-266, je lidská buněčná linie mnohočetného myelomu, která byla vytvořena z periferní krve 53letého muže s myelomem IgE. Tato buněčná linie se vyznačuje sekrecí lehkých i těžkých imunoglobulinových řetězců, převážně lehkých řetězců lambda a těžkých řetězců IgE. Buněčná linie U266 vykazuje typické markery B lymfocytů a byla hojně využívána při studiu biologie myelomu, zejména pro pochopení patofyziologických mechanismů malignit plazmatických buněk a imunitní odpovědi.
Buňky U266 jsou cenné pro svou roli při objevování a vývoji léčiv, protože poskytují robustní model pro hodnocení účinnosti látek proti myelomu. Využívají se také při studiu interakcí myelomových buněk s mikroprostředím kostní dřeně, což je zásadní pro pochopení progrese myelomu a rezistence na léčbu. Genetické studie odhalily u buněk U266 několik chromozomálních abnormalit, které přispívají k jejich malignímu fenotypu a odolnosti vůči apoptóze. Tato buněčná linie se významně podílela na rozvoji molekulárně cílené léčby mnohočetného myelomu.

OBECNÉ INFORMACE

Popis

Buněčná linie U266, známá také jako U-266, je lidská buněčná linie mnohočetného myelomu, která byla vytvořena z periferní krve 53letého muže s myelomem IgE. Tato buněčná linie se vyznačuje sekrecí lehkých i těžkých imunoglobulinových řetězců, převážně lehkých řetězců lambda a těžkých řetězců IgE. Buněčná linie U266 vykazuje typické markery B lymfocytů a byla hojně využívána při studiu biologie myelomu, zejména pro pochopení patofyziologických mechanismů malignit plazmatických buněk a imunitní odpovědi.
Buňky U266 jsou cenné pro svou roli při objevování a vývoji léčiv, protože poskytují robustní model pro hodnocení účinnosti látek proti myelomu. Využívají se také při studiu interakcí myelomových buněk s mikroprostředím kostní dřeně, což je zásadní pro pochopení progrese myelomu a rezistence na léčbu. Genetické studie odhalily u buněk U266 několik chromozomálních abnormalit, které přispívají k jejich malignímu fenotypu a odolnosti vůči apoptóze. Tato buněčná linie se významně podílela na rozvoji molekulárně cílené léčby mnohočetného myelomu.

Tkáň	Plazmatická buňka
Nemoc	Mnohočetný myelom

Synonyma

- U266B1
- U266-B1
- U266 B1
- U-266
- U 266
- U266S
- U266BL
- U266

KLASIFIKACE

Organismus	Člověk
Sex	Muž
Růstové vlastnosti	Odpružení
Úroveň biologické bezpečnosti	1

IDENTIFIKÁTORY

Citace

U266 (katalogové číslo Cytion 300259)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Daňové identifikační číslo NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_0566

MANIPULACE A CHOV

Pěstovací médium

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabilní glutamin, w: 2,0 g/l NaHCO3 (číslo výrobku Cytion 820700a)

Inkubační atmosféra	37 °C, 5 %CO2, zvlhčená atmosféra.

Doplňky stravy

Doplňte médium o 10 % tepelně inaktivovaného FBS

Subkultivace

Kultury udržujte pravidelným přidáváním nebo výměnou média. Zahajte kultury s hustotou 5 x 10^5 buněk/ml a pro optimální růst udržujte koncentraci buněk v rozmezí 3 x 10^5 až 1 x 10^6 buněk/ml.

Hustota výsevu	5 x 10^5 buněk/ml
Zotavení po rozmrazení	Po rozmrazení nechte buňky alespoň 24 hodin zotavovat z procesu zmrazování.

Rozmrazování a kultivace

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KVALITY A KRYOKONZERVACE

Sterilita

Kontaminace mykoplazmaty je vyloučena jak pomocí testů založených na PCR, tak pomocí luminiscenčních metod detekce mykoplazmy. Aby se zajistilo, že nedojde ke kontaminaci bakteriemi, plísněmi nebo kvasinkami, jsou buněčné kultury denně podrobovány vizuálním kontrolám.

Mrazicí médium	Jako kryokonzervační médium používáme kompletní růstové médium (včetně FBS) + 10 % DMSO pro zajištění dostatečné životaschopnosti po rozmrazení nebo CM-1 (katalogové číslo 800100 společnosti Cytion), které obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory pro zlepšení regenerace a snížení stresu způsobeného kryo.

Podmínky skladování

Pro dlouhodobé uchování umístěte lahvičky do kapalného dusíku v plynné fázi při teplotě přibližně -150 až -196 °C. Skladování při -80 °C je přijatelné pouze jako krátký přechodný krok před přemístěním do kapalného dusíku.

Dopravní podmínky

Kryokonzervované buněčné linie se přepravují na suchém ledu v ověřených, izolovaných obalech s dostatečným množstvím chladiva, aby se po celou dobu přepravy udržovala teplota přibližně -78 °C. Po obdržení ihned zkontrolujte obal a neprodleně přeneste lahvičky do vhodného skladu.

DÁRCE

Věk dárce	53 let

PRÁVNÍ INFORMACE A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Bezpečnostní opatření

Při plánování uložení kryovialu v kapalném dusíku pro budoucí rozmrazení je nutné dodržovat přísná bezpečnostní opatření. Nezbytné jsou vhodné ochranné rukavice a oděv a při přenášení zmrazených vzorků do nádrže s kapalným dusíkem nebo z ní je nutné používat obličejovou masku nebo ochranné brýle. To proto, aby se snížilo riziko zranění v důsledku možných výbuchů kryovialů při jejich vyjímání, které mohou mít za následek vystřelování ostrých úlomků.

Záruka

Ve společnosti Cytion si stojíme za kvalitou a životaschopností našich produktů.
Zaručujeme, že naše buňky budou životaschopné na začátku kultivace po dobu 60 dnů po odeslání z našich zařízení.
Zaručujeme, že všechny materiály odpovídají specifikacím popsaným v certifikátu analýzy a/nebo v produktovém listu
Úplné informace naleznete v našem <a href=""/Kdo-jsme/Záruka/"" hreflang=""x-default"">Záručním prohlášení

Je nutná smlouva o převodu materiálu	Yes