Κύτταρα U266

300259

Η κυτταρική σειρά U266, επίσης γνωστή ως U-266, είναι μια ανθρώπινη κυτταρική σειρά πολλαπλού μυελώματος που δημιουργήθηκε από το περιφερικό αίμα ενός 53χρονου άνδρα με μυέλωμα IgE. Η εν λόγω κυτταρική σειρά χαρακτηρίζεται από την έκκριση τόσο ελαφρών όσο και βαρέων αλυσίδων ανοσοσφαιρίνης, κυρίως ελαφρών αλυσίδων λάμδα και βαρέων αλυσίδων IgE. Η κυτταρική σειρά U266 εμφανίζει τυπικούς δείκτες Β λεμφοκυττάρων και έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς στη μελέτη της βιολογίας του μυελώματος, ιδίως για την κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών των κακοηθειών των πλασματοκυττάρων και της ανοσολογικής απάντησης.
Τα κύτταρα U266 είναι πολύτιμα για το ρόλο τους στην ανακάλυψη και ανάπτυξη φαρμάκων, παρέχοντας ένα ισχυρό μοντέλο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παραγόντων κατά του μυελώματος. Χρησιμοποιούνται επίσης στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων των κυττάρων του μυελώματος με το μικροπεριβάλλον του μυελού των οστών, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση της εξέλιξης του μυελώματος και της αντίστασης στη θεραπεία. Γενετικές μελέτες έχουν αποκαλύψει διάφορες χρωμοσωμικές ανωμαλίες στα κύτταρα U266, οι οποίες συμβάλλουν στον κακοήθη φαινότυπο και την αντοχή τους στην απόπτωση. Αυτή η κυτταρική σειρά έχει συμβάλει καθοριστικά στην εξέλιξη των μοριακών στοχευμένων θεραπειών στο πολλαπλό μυέλωμα.

ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Περιγραφή

Η κυτταρική σειρά U266, επίσης γνωστή ως U-266, είναι μια ανθρώπινη κυτταρική σειρά πολλαπλού μυελώματος που δημιουργήθηκε από το περιφερικό αίμα ενός 53χρονου άνδρα με μυέλωμα IgE. Η εν λόγω κυτταρική σειρά χαρακτηρίζεται από την έκκριση τόσο ελαφρών όσο και βαρέων αλυσίδων ανοσοσφαιρίνης, κυρίως ελαφρών αλυσίδων λάμδα και βαρέων αλυσίδων IgE. Η κυτταρική σειρά U266 εμφανίζει τυπικούς δείκτες Β λεμφοκυττάρων και έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς στη μελέτη της βιολογίας του μυελώματος, ιδίως για την κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών των κακοηθειών των πλασματοκυττάρων και της ανοσολογικής απάντησης.
Τα κύτταρα U266 είναι πολύτιμα για το ρόλο τους στην ανακάλυψη και ανάπτυξη φαρμάκων, παρέχοντας ένα ισχυρό μοντέλο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παραγόντων κατά του μυελώματος. Χρησιμοποιούνται επίσης στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων των κυττάρων του μυελώματος με το μικροπεριβάλλον του μυελού των οστών, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση της εξέλιξης του μυελώματος και της αντίστασης στη θεραπεία. Γενετικές μελέτες έχουν αποκαλύψει διάφορες χρωμοσωμικές ανωμαλίες στα κύτταρα U266, οι οποίες συμβάλλουν στον κακοήθη φαινότυπο και την αντοχή τους στην απόπτωση. Αυτή η κυτταρική σειρά έχει συμβάλει καθοριστικά στην εξέλιξη των μοριακών στοχευμένων θεραπειών στο πολλαπλό μυέλωμα.

Ιστός	Κύτταρο πλάσματος
Ασθένεια	Πολλαπλό μυέλωμα

Συνώνυμα

- U266B1
- U266-B1
- U266 B1
- U-266
- U 266
- U266S
- U266BL
- U266

ΤΑΞΙΝΌΜΗΣΗ

Οργανισμός	Άνθρωπος
Σεξ	Άνδρας
Ιδιότητες ανάπτυξης	Αναστολή
Επίπεδο βιοασφάλειας	1

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΆ

Παραπομπή

U266 (αριθμός καταλόγου Cytion 300259)

Αριθμός φορολογικού μητρώου NCBI	9606
Κελλοσαύρος	CVCL_0566

ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΑ

Θρεπτικό μέσο

RPMI 1640, w: 2,0 mM σταθερής γλουταμίνης, w: 2,0 g/L NaHCO3 (αριθμός άρθρου Cytion 820700a)

Ατμόσφαιρα επώασης	37°C, 5%CO2, υγροποιημένη ατμόσφαιρα.

Συμπληρώματα

Συμπληρώστε το θρεπτικό μέσο με 10% θερμικά αδρανοποιημένο FBS

Αναπαραγωγή σε υποκαλλιέργεια

Διατηρήστε τις καλλιέργειες προσθέτοντας ή αντικαθιστώντας περιοδικά το μέσο. Ξεκινήστε τις καλλιέργειες με πυκνότητα 5 x 10^5 κύτταρα/ml και διατηρήστε τη συγκέντρωση των κυττάρων εντός του εύρους 3 x 10^5 έως 1 x 10^6 κύτταρα/ml για βέλτιστη ανάπτυξη.

Πυκνότητα σποράς	5 x 10^5 κύτταρα/mL
Ανάκαμψη μετά την απόψυξη	Μετά την απόψυξη αφήστε τα κύτταρα να ανακάμψουν από τη διαδικασία κατάψυξης για τουλάχιστον 24 ώρες.

Απόψυξη και καλλιέργεια

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΡΥΟΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

Στειρότητα

Η μόλυνση από μυκόπλασμα αποκλείεται με τη χρήση τόσο των δοκιμασιών που βασίζονται στην PCR όσο και των μεθόδων ανίχνευσης μυκοπλάσματος με βάση τη φωταύγεια.
Για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει μόλυνση από βακτήρια, μύκητες ή ζύμες, οι κυτταροκαλλιέργειες υποβάλλονται σε καθημερινές οπτικές επιθεωρήσεις.

Μέσο κατάψυξης	Ως μέσο κρυοσυντήρησης, χρησιμοποιούμε πλήρες μέσο ανάπτυξης (συμπεριλαμβανομένου του FBS) + 10% DMSO για επαρκή βιωσιμότητα μετά την απόψυξη, ή CM-1 (αριθμός καταλόγου Cytion 800100), το οποίο περιλαμβάνει βελτιστοποιημένα ωσμοπροστατευτικά και μεταβολικούς σταθεροποιητές για την ενίσχυση της ανάκαμψης και τη μείωση του στρες που προκαλείται από την κρυοσυντήρηση.

Συνθήκες αποθήκευσης

Για μακροχρόνια συντήρηση, τοποθετήστε τα φιαλίδια σε υγρό άζωτο σε φάση ατμών σε θερμοκρασία περίπου -150 έως -196 °C. Η αποθήκευση στους -80 °C είναι αποδεκτή μόνο ως σύντομο ενδιάμεσο βήμα πριν από τη μεταφορά σε υγρό άζωτο.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Όροι αποστολής

Οι κρυοσυντηρημένες κυτταρικές σειρές αποστέλλονται σε ξηρό πάγο σε επικυρωμένη, μονωμένη συσκευασία με επαρκές ψυκτικό μέσο για τη διατήρηση περίπου των -78 °C καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς. Κατά την παραλαβή, επιθεωρήστε αμέσως τον περιέκτη και μεταφέρετε τα φιαλίδια χωρίς καθυστέρηση στην κατάλληλη αποθήκη.

ΔΩΡΗΤΉΣ

Ηλικία δωρητή	53 χρόνια

ΝΟΜΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

Μέτρα ασφαλείας

Όταν σχεδιάζετε να αποθηκεύσετε ένα κρυοφιαλίδιο σε υγρό άζωτο για μελλοντική απόψυξη, είναι υποχρεωτικό να τηρείτε αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Τα κατάλληλα προστατευτικά γάντια και ο κατάλληλος προστατευτικός ρουχισμός είναι απαραίτητα, ενώ απαιτείται η χρήση μάσκας προσώπου ή γυαλιών ασφαλείας κατά τη μεταφορά κατεψυγμένων δειγμάτων προς ή από τη δεξαμενή υγρού αζώτου. Αυτό γίνεται για να μετριαστεί ο κίνδυνος τραυματισμού από πιθανές εκρήξεις κρυοσωλήνων κατά την απομάκρυνση, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην προβολή αιχμηρών θραυσμάτων.

Εγγύηση

Στην Cytion, υποστηρίζουμε την ποιότητα και τη βιωσιμότητα των προϊόντων μας.
Εγγυόμαστε ότι τα κύτταρά μας θα είναι βιώσιμα κατά την έναρξη της καλλιέργειας για 60 ημέρες μετά την αποστολή από τις εγκαταστάσεις μας.
Διαβεβαιώνουμε ότι όλα τα υλικά συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο Πιστοποιητικό Ανάλυσης ή/και στο Φύλλο Προϊόντος
Για πλήρεις λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"">Δήλωση εγγύησης

Απαιτείται συμφωνία μεταφοράς υλικού	Yes