Bunky U266

300259

Bunková línia U266, známa aj ako U-266, je ľudská bunková línia mnohopočetného myelómu, ktorá bola vytvorená z periférnej krvi 53-ročného muža s myelómom IgE. Táto bunková línia sa vyznačuje sekréciou ľahkých aj ťažkých imunoglobulínových reťazcov, prevažne ľahkých reťazcov lambda a ťažkých reťazcov IgE. Bunková línia U266 vykazuje typické markery B-lymfocytov a vo veľkej miere sa využíva pri štúdiu biológie myelómu, najmä pri pochopení patofyziologických mechanizmov malignít plazmatických buniek a imunitnej odpovede. Bunky U266 sú cenné pre svoju úlohu pri objavovaní a vývoji liekov, pretože poskytujú spoľahlivý model na hodnotenie účinnosti látok proti myelómu. Využívajú sa aj pri štúdiu interakcií myelómových buniek s mikroprostredím kostnej drene, čo je kľúčové pre pochopenie progresie myelómu a rezistencie na liečbu. Genetické štúdie odhalili niekoľko chromozómových abnormalít v bunkách U266, ktoré prispievajú k ich malígnemu fenotypu a odolnosti voči apoptóze. Táto bunková línia zohrala dôležitú úlohu pri vývoji molekulárnej cielenej terapie mnohopočetného myelómu.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Popis

Bunková línia U266, známa aj ako U-266, je ľudská bunková línia mnohopočetného myelómu, ktorá bola vytvorená z periférnej krvi 53-ročného muža s myelómom IgE. Táto bunková línia sa vyznačuje sekréciou ľahkých aj ťažkých imunoglobulínových reťazcov, prevažne ľahkých reťazcov lambda a ťažkých reťazcov IgE. Bunková línia U266 vykazuje typické markery B-lymfocytov a vo veľkej miere sa využíva pri štúdiu biológie myelómu, najmä pri pochopení patofyziologických mechanizmov malignít plazmatických buniek a imunitnej odpovede. Bunky U266 sú cenné pre svoju úlohu pri objavovaní a vývoji liekov, pretože poskytujú spoľahlivý model na hodnotenie účinnosti látok proti myelómu. Využívajú sa aj pri štúdiu interakcií myelómových buniek s mikroprostredím kostnej drene, čo je kľúčové pre pochopenie progresie myelómu a rezistencie na liečbu. Genetické štúdie odhalili niekoľko chromozómových abnormalít v bunkách U266, ktoré prispievajú k ich malígnemu fenotypu a odolnosti voči apoptóze. Táto bunková línia zohrala dôležitú úlohu pri vývoji molekulárnej cielenej terapie mnohopočetného myelómu.

Tkanivo	Plazmatická bunka
Choroba	Mnohopočetný myelóm

Synonymá

- U266B1
- U266-B1
- U266 B1
- U-266
- U 266
- U266S
- U266BL
- U266

KLASIFIKÁCIA

Organizmus	Človek
Sex	Muž
Rastové vlastnosti	Zavesenie
Úroveň biologickej bezpečnosti	1

IDENTIFIKÁTORY

Citácia

U266 (katalógové číslo Cytion 300259)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Daňové identifikačné číslo NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_0566

MANIPULÁCIA A KULTIVÁCIA

Kultivačné médium

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabilný glutamín, w: 2,0 g/L NaHCO3 (číslo výrobku Cytion 820700a)

Inkubačná atmosféra	37 °C, 5 %CO2, zvlhčená atmosféra.

Doplnky stravy

Doplňte médium o 10 % tepelne inaktivovaného FBS

Rozmnožovanie kultúr

Kultúry udržiavajte pravidelným pridávaním alebo výmenou média. Kultúry začnite s hustotou 5 x 10^5 buniek/ml a pre optimálny rast udržujte koncentráciu buniek v rozmedzí 3 x 10^5 až 1 x 10^6 buniek/ml.

Hustota výsevu	5 x 10^5 buniek/ml
Zotavenie po rozmrazení	Po rozmrazení nechajte bunky aspoň 24 hodín zotavovať sa z procesu zmrazovania.

Rozmrazovanie a kultivácia

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KVALITY A KRYOKONZERVÁCIA

Sterilita

Kontaminácia mykoplazmami sa vylučuje pomocou testov založených na PCR a metód detekcie mykoplaziem založených na luminiscencii. Aby sa zabezpečilo, že nedošlo ku kontaminácii baktériami, hubami alebo kvasinkami, bunkové kultúry sa denne vizuálne kontrolujú.

Mrazové médium	Ako kryokonzervačné médium používame kompletné rastové médium (vrátane FBS) + 10 % DMSO na zabezpečenie primeranej životaschopnosti po rozmrazení alebo CM-1 (katalógové číslo 800100 spoločnosti Cytion), ktoré obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory na zlepšenie obnovy a zníženie stresu spôsobeného kryo.

Podmienky skladovania

Na dlhodobé uchovávanie umiestnite injekčné liekovky do kvapalnej fázy dusíka v pare pri teplote približne -150 až -196 °C. Skladovanie pri teplote -80 °C je prijateľné len ako krátky prechodný krok pred presunom do tekutého dusíka.

Dopravné podmienky

Kryokonzervované bunkové línie sa prepravujú na suchom ľade v overených, izolovaných obaloch s dostatočným množstvom chladiva na udržanie teploty približne -78 °C počas celej prepravy. Po prijatí ihneď skontrolujte obal a bezodkladne premiestnite injekčné liekovky do vhodného skladu.

DARCA

Vek darcu	53 rokov

PRÁVNE INFORMÁCIE A BEZPEČNOSŤ

Bezpečnostné opatrenia

Pri plánovaní uskladnenia kryovírusu v kvapalnom dusíku na budúce rozmrazenie je potrebné dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia. Vhodné ochranné rukavice a odev sú nevyhnutné a počas prenosu zmrazených vzoriek do nádrže s tekutým dusíkom alebo z nej sa vyžaduje používanie tvárovej masky alebo ochranných okuliarov. Je to z dôvodu zníženia rizika poranenia v dôsledku možnej explózie kryovírusu pri vyberaní, ktorá môže mať za následok vymrštenie ostrých úlomkov.

Záruka

V spoločnosti Cytion si stojíme za kvalitou a životaschopnosťou našich produktov.
Garantujeme, že naše bunky budú životaschopné na začiatku kultivácie počas 60 dní po odoslaní z našich zariadení.
Zaručujeme, že všetky materiály zodpovedajú špecifikáciám opísaným v certifikáte analýzy a/alebo v produktovom liste
Úplné informácie nájdete v našom <a href=""/Kto sme/záruka/"" hreflang=""x-default"">Vyhlásení o záruke

Je potrebná dohoda o prenose materiálu	Yes