Клетки HEK293-F

300260

Клетките HEK293-F са бързо растяща, силно трансфектируема подлиния, получена от клетъчната линия човешки ембрионален бъбрек 293 (HEK293). Обозначението "F" показва, че тези клетки са адаптирани за растеж в суспензионни култури, което ги прави особено полезни за широкомащабно производство на протеини. Клетките растат в различни среди без серум, което улеснява мащабируемите процеси в биотехнологичните и фармацевтичните приложения. Клетките HEK293-F запазват епителната морфология на изходната линия HEK293 и се поддържат в суспензия, без да е необходимо да се прикрепят към твърд субстрат. Тези клетки са високо ефективни при експресията на рекомбинантни протеини и се използват широко при производството на вирусни вектори за генна терапия, включително аденовирусни, лентивирусни и ретровирусни вектори. Техният стабилен растеж в суспензия и лесната трансфекция ги правят идеални за използване в протоколи за преходна трансфекция, при които могат да произвеждат високи добиви на протеини в рамките на няколко дни след трансфекцията. Тази характеристика е от решаващо значение за бързите производствени цикли в изследователската и промишлената сфера. Адаптивността на клетките HEK293-F към различни условия на растеж и способността им за култивиране с висока плътност повишават полезността им в средите за биопреработка.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Описание

Клетките HEK293-F са бързо растяща, силно трансфектируема подлиния, получена от клетъчната линия човешки ембрионален бъбрек 293 (HEK293). Обозначението "F" показва, че тези клетки са адаптирани за растеж в суспензионни култури, което ги прави особено полезни за широкомащабно производство на протеини. Клетките растат в различни среди без серум, което улеснява мащабируемите процеси в биотехнологичните и фармацевтичните приложения. Клетките HEK293-F запазват епителната морфология на изходната линия HEK293 и се поддържат в суспензия, без да е необходимо да се прикрепят към твърд субстрат. Тези клетки са високо ефективни при експресията на рекомбинантни протеини и се използват широко при производството на вирусни вектори за генна терапия, включително аденовирусни, лентивирусни и ретровирусни вектори. Техният стабилен растеж в суспензия и лесната трансфекция ги правят идеални за използване в протоколи за преходна трансфекция, при които могат да произвеждат високи добиви на протеини в рамките на няколко дни след трансфекцията. Тази характеристика е от решаващо значение за бързите производствени цикли в изследователската и промишлената сфера. Адаптивността на клетките HEK293-F към различни условия на растеж и способността им за култивиране с висока плътност повишават полезността им в средите за биопреработка.

Тъкан	Бъбреци

Приложения

Гостоприемник за трансфекция

Синоними

- HEK-293-F
- HEK 293-F
- HEK-293F
- HEK293F
- 293-F
- 293 F
- 293F

КЛАСИФИКАЦИЯ

Организъм	Човек
Секс	Женски
Свойства, свързани с растежа	Окачване
Статус на ГМО	GMO-S1

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Подробности относно статуса на ГМО

GMO-S1: This HEK293-F cell line contains SV40, enabling high transfection efficiency and robust growth in suspension culture. The modification is stably present in embryonic kidney cells. This classification applies only within Germany and may differ elsewhere.

Ниво на биологична безопасност	1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Морфология	Подобни на епител
Туморогенен	При голи мишки
Време за удвояване	30 часа

ИДЕНТИФИКАТОРИ

Източник

HEK293-F (каталожен номер 300260 на Cytion)

Данъчен идентификационен номер в NCBI	9606
Целозавър	CVCL_6642

ПРОЯВА И ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНОСТ

Експресирани рецептори

Витронектин

Експресия на протеини

CEA отрицателен, p53 положителен

Вируси

Трансформирани с аденовирус 5 ДНК аденовирус 5 ДНК

ОБРАБОТКА И ОТГЛЕЖДАНЕ

Хранителна среда

CD293 (Thermo)

Атмосфера за инкубация	37°C, 5%CO2, овлажнена атмосфера.
Реагент за дисоциация	Accutase

Пресаждане

Отстранете старата среда от адхезивните клетки и ги промийте с PBS, която не съдържа калций и магнезий. За колби T25 използвайте 3-5 ml PBS, а за колби T75 - 5-10 ml. След това покрийте клетките изцяло с Accutase, като използвате 1-2 ml за колби T25 и 2,5 ml за колби T75. Оставете клетките да се инкубират на стайна температура за 8-10 минути, за да се отделят. След инкубацията внимателно разбъркайте клетките с 10 ml среда, за да ги ресуспендирате, след което центрофугирайте при 300xg за 3 минути. Изхвърлете супернатантата, ресуспендирайте клетките в прясна среда и ги прехвърлете в нови колби, които вече съдържат прясна среда.

Плътност на засяването	1 x 10^4 клетки/cm^2 ще дадат конфулентен слой за около 4 дни
Обновяване на течността	2 пъти седмично
Възстановяване след размразяване	След размразяване, поставете клетките в плаки с плътност 5 x 10^4 клетки/cm^2 и оставете клетките да се възстановят от процеса на замразяване и да се прикрепят за най-малко 24 часа.

Размразяване и култивиране

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И КРИОКОНСЕРВАЦИЯ

Стерилност

Замърсяването с микоплазма се изключва както чрез PCR-базирани анализи, така и чрез луминесцентни методи за откриване на микоплазма.
За да се гарантира, че няма бактериално, гъбично или дрождево замърсяване, клетъчните култури се подлагат на ежедневни визуални проверки.

Среда за замразяване	Като среда за криоконсервация използваме пълна среда за растеж (включително FBS) + 10% DMSO за адекватна жизнеспособност след размразяване или CM-1 (каталожен номер 800100 на Cytion), която включва оптимизирани осмопротектори и метаболитни стабилизатори за подобряване на възстановяването и намаляване на криоиндуцирания стрес.

Условия за съхранение

За дълготрайно съхранение поставете флаконите в течен азот в парна фаза при температура около -150 до -196 °C. Съхранението при -80 °C е приемливо само като кратък междинен етап преди прехвърлянето в течен азот.

Условия за доставка

Криоконсервираните клетъчни линии се транспортират върху сух лед в утвърдени, изолирани опаковки с достатъчно хладилен агент, за да се поддържа приблизително -78 °C по време на транспортирането. При получаването незабавно прегледайте опаковката и незабавно прехвърлете флаконите за подходящо съхранение.

ДАРИТЕЛ

Възраст на донора	Плод

ПРАВНИ ВЪПРОСИ И БЕЗОПАСНОСТ

Мерки за безопасност

Когато планирате да съхранявате криопрепарат в течен азот за бъдещо размразяване, е задължително да спазвате строги мерки за безопасност. Подходящите защитни ръкавици и облекло са от съществено значение, а по време на прехвърлянето на замразени проби към или от резервоара с течен азот е необходимо да се използва маска за лице или предпазни очила. Това се прави, за да се намали рискът от нараняване от потенциални експлозии на криовиолите при изваждането им, които могат да доведат до изхвърляне на остри фрагменти.

Гаранция

Ние в Cytion заставаме зад качеството и жизнеспособността на нашите продукти.
Гарантираме, че нашите клетки ще бъдат жизнеспособни в началото на култивирането в продължение на 60 дни след изпращането им от нашите съоръжения.
Гарантираме, че всички материали отговарят на спецификациите, описани в сертификата за анализ и/или продуктовата листа
За пълни подробности, моля, направете справка с нашата <a href=""/Кои сме ние/Гаранция/"" hreflang=""x-default"">Гаранционна декларация

Необходимо е споразумение за прехвърляне на материали	Yes