Sel HEK293-F

300260

Sel HEK293-F adalah subgalur yang tumbuh cepat dan sangat mudah ditransfeksi yang berasal dari garis sel ginjal embrionik manusia 293 (HEK293). Penunjukan 'F' menunjukkan bahwa sel-sel ini telah diadaptasi untuk pertumbuhan dalam kultur suspensi, membuatnya sangat berguna untuk produksi protein skala besar. Sel-sel ini tumbuh dalam berbagai media bebas serum, memfasilitasi proses yang dapat diskalakan dalam aplikasi bioteknologi dan farmasi. Sel HEK293-F mempertahankan morfologi seperti epitel dari garis induk HEK293 dan dipertahankan dalam suspensi tanpa perlu menempel pada substrat padat.
Sel-sel ini sangat efisien dalam mengekspresikan protein rekombinan dan digunakan secara luas dalam produksi vektor virus untuk terapi gen, termasuk vektor adenoviral, lentiviral, dan retroviral. Pertumbuhannya yang kuat dalam suspensi dan kemudahan transfeksi menjadikannya ideal untuk digunakan dalam protokol transfeksi sementara, di mana mereka dapat menghasilkan protein dalam jumlah besar dalam beberapa hari setelah transfeksi. Karakteristik ini sangat penting untuk siklus produksi yang cepat dalam penelitian dan industri. Kemampuan beradaptasi sel HEK293-F terhadap berbagai kondisi pertumbuhan dan kapasitasnya untuk kultur dengan kepadatan tinggi meningkatkan kegunaannya dalam lingkungan bioproses.

INFORMASI UMUM

Deskripsi

Sel HEK293-F adalah subgalur yang tumbuh cepat dan sangat mudah ditransfeksi yang berasal dari garis sel ginjal embrionik manusia 293 (HEK293). Penunjukan 'F' menunjukkan bahwa sel-sel ini telah diadaptasi untuk pertumbuhan dalam kultur suspensi, membuatnya sangat berguna untuk produksi protein skala besar. Sel-sel ini tumbuh dalam berbagai media bebas serum, memfasilitasi proses yang dapat diskalakan dalam aplikasi bioteknologi dan farmasi. Sel HEK293-F mempertahankan morfologi seperti epitel dari garis induk HEK293 dan dipertahankan dalam suspensi tanpa perlu menempel pada substrat padat.
Sel-sel ini sangat efisien dalam mengekspresikan protein rekombinan dan digunakan secara luas dalam produksi vektor virus untuk terapi gen, termasuk vektor adenoviral, lentiviral, dan retroviral. Pertumbuhannya yang kuat dalam suspensi dan kemudahan transfeksi menjadikannya ideal untuk digunakan dalam protokol transfeksi sementara, di mana mereka dapat menghasilkan protein dalam jumlah besar dalam beberapa hari setelah transfeksi. Karakteristik ini sangat penting untuk siklus produksi yang cepat dalam penelitian dan industri. Kemampuan beradaptasi sel HEK293-F terhadap berbagai kondisi pertumbuhan dan kapasitasnya untuk kultur dengan kepadatan tinggi meningkatkan kegunaannya dalam lingkungan bioproses.

Tisu	Ginjal

Aplikasi

Tuan rumah transfeksi

Sinonim

- HEK-293-F
- HEK 293-F
- HEK-293F
- HEK293F
- 293-F
- 293 F
- 293F

KLASIFIKASI

Organisme	Manusia
Seks	Perempuan
Sifat-sifat pertumbuhan	Penangguhan
Status GMO	GMO-S1

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Rincian status GMO

GMO-S1: This HEK293-F cell line contains SV40, enabling high transfection efficiency and robust growth in suspension culture. The modification is stably present in embryonic kidney cells. This classification applies only within Germany and may differ elsewhere.

Tingkat keamanan hayati	1

KARAKTERISTIK

Morfologi	Seperti epitel
Tumorigenik	Pada tikus telanjang
Waktu penggandaan	30 jam

PENGIDENTIFIKASI

Referensi

HEK293-F (Nomor katalog Cytion 300260)

Nomor Identifikasi Pajak NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_6642

EKSPRESI DAN KERENTANAN

Reseptor yang diekspresikan

Vitronectin

Ekspresi protein

CEA negatif, p53 positif

Virus

Ditransformasi dengan DNA adenovirus 5 DNA adenovirus 5

PENANGANAN DAN BUDIDAYA

Media kultur

CD293 (Thermo)

Suasana inkubasi	37°C, 5%CO2, atmosfer yang dilembabkan.
Reagen disosiasi	Accutase

Perbanyakan sel

Buang media lama dari sel yang melekat dan cuci dengan PBS yang tidak mengandung kalsium dan magnesium. Untuk labu T25, gunakan 3-5 ml PBS, dan untuk labu T75, gunakan 5-10 ml. Kemudian, tutupi sel sepenuhnya dengan Accutase, menggunakan 1-2 ml untuk labu T25 dan 2,5 ml untuk labu T75. Biarkan sel diinkubasi pada suhu kamar selama 8-10 menit untuk melepaskannya. Setelah inkubasi, campurkan sel secara perlahan dengan 10 ml medium untuk meresuspensi sel, kemudian sentrifugasi pada 300xg selama 3 menit. Buang supernatan, resuspensi sel dalam medium segar, dan pindahkan ke dalam labu baru yang sudah berisi medium segar.

Kepadatan penanaman	1 x 10^4 sel/cm^2 akan membentuk lapisan yang padat dalam waktu sekitar 4 hari.
Pergantian cairan	2 kali per minggu
Pemulihan pasca-pencairan	Setelah dicairkan, tanam sel pada kepadatan 5 x 10^4 sel/cm^2 dan biarkan sel pulih dari proses pembekuan serta menempel setidaknya selama 24 jam.

Pencairan dan pembiakan

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

PENGENDALIAN MUTU DAN KRIOPRESERVASI

Kemandulan

Kontaminasi mikoplasma disingkirkan dengan menggunakan tes berbasis PCR dan metode deteksi mikoplasma berbasis pendaran.
Untuk memastikan tidak ada kontaminasi bakteri, jamur, atau ragi, kultur sel menjalani inspeksi visual setiap hari.

Media pembekuan	Sebagai media kriopreservasi, kami menggunakan media pertumbuhan lengkap (termasuk FBS) + 10% DMSO untuk viabilitas pasca-pencairan yang memadai, atau CM-1 (nomor katalog Cytion 800100), yang mencakup osmoprotektan yang dioptimalkan dan penstabil metabolisme untuk meningkatkan pemulihan dan mengurangi stres yang diinduksi kriopreservasi.

Kondisi penyimpanan

Untuk pengawetan jangka panjang, tempatkan botol dalam nitrogen cair fase uap pada suhu sekitar -150 hingga -196 °C. Penyimpanan pada suhu -80 °C hanya dapat diterima sebagai langkah sementara sebelum dipindahkan ke nitrogen cair.

Ketentuan pengiriman

Lini sel kriopreservasi dikirim di atas es kering dalam kemasan terisolasi yang divalidasi dengan refrigeran yang cukup untuk mempertahankan suhu sekitar -78 ° C selama perjalanan. Setelah diterima, segera periksa wadah dan pindahkan botol tanpa penundaan ke tempat penyimpanan yang sesuai.

DONATUR

Usia donor	Janin

HUKUM DAN KESELAMATAN

Tindakan pencegahan keselamatan

Ketika berencana menyimpan kriovial dalam nitrogen cair untuk pencairan di masa mendatang, Anda wajib mematuhi langkah-langkah keamanan yang ketat. Sarung tangan dan pakaian pelindung yang tepat sangat penting, dan penggunaan masker wajah atau kacamata pengaman diperlukan selama pemindahan sampel beku ke atau dari tangki nitrogen cair. Hal ini untuk mengurangi risiko cedera akibat potensi ledakan cryovial pada saat pemindahan, yang dapat mengakibatkan proyeksi fragmen tajam.

Garansi

Di Cytion, kami mendukung kualitas dan kelangsungan hidup produk kami.
Kami menjamin bahwa sel kami akan dapat bertahan hidup pada awal kultur selama 60 hari setelah pengiriman dari fasilitas kami.
Kami menjamin bahwa semua bahan sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan dalam Sertifikat Analisis dan / atau Lembar Produk
Untuk detail lengkap, silakan merujuk ke <a href=""/Siapa-kami-Garansi/Garansi/"" hreflang=""x-default"">Pernyataan Jaminan kami

Diperlukan Perjanjian Transfer Material	Yes