תאי Lama-84

300261

במשבר בלאסט. קו תאים זה מאופיין בנוכחות (CML) הוא קו תאים אנושי שמקורו בדם ההיקפי של חולה הסובל מלוקמיה מיאלואידית כרונית LAMA-84 ידועים בתפקידם בהגברת פעילות טירוזין קינאז, BCR-ABL הגנים האונקוגניים. CML המאפיין את BCR-ABL, כרומוזום פילדלפיה, המביא ליצירת גן היתוך מהווים אפוא מודל יקר ערך לחקר המנגנונים LAMA-84 המקדמת מסלולי איתות שונים המובילים לשגשוג תאים בלתי מבוקר ועמידות לאפופטוזיס. תאי בסביבה פרה-קלינית (TKI) ולהערכת היעילות של מעכבי טירוזין קינאז CML המולקולריים של התקדמות.
במיוחד בהקשר של עמידות לתרופות והתפתחות המחלה. מחקרים שבוצעו על קו תאים זה CML, שימש רבות להבנת הביולוגיה של LAMA-84, תרם לחקר אסטרטגיות טיפוליות LAMA-84, כגון אימטיניב, דאסאטיניב ונילוטיניב. יתר על כן TKI, סייעו בהבהרת התגובות התאיות לדורות שונים של TKI-חדשות שמטרתן להתגבר על עמידות ל BCR-ABL-כולל בדיקת טיפולים משולבים המכוונים למסלולי איתות אחרים המושפעים באופן סינרגטי מחלבון ה ABL.

GENERAL INFORMATION

Description

במשבר בלאסט. קו תאים זה מאופיין בנוכחות (CML) הוא קו תאים אנושי שמקורו בדם ההיקפי של חולה הסובל מלוקמיה מיאלואידית כרונית LAMA-84 ידועים בתפקידם בהגברת פעילות טירוזין קינאז, BCR-ABL הגנים האונקוגניים. CML המאפיין את BCR-ABL, כרומוזום פילדלפיה, המביא ליצירת גן היתוך מהווים אפוא מודל יקר ערך לחקר המנגנונים LAMA-84 המקדמת מסלולי איתות שונים המובילים לשגשוג תאים בלתי מבוקר ועמידות לאפופטוזיס. תאי בסביבה פרה-קלינית (TKI) ולהערכת היעילות של מעכבי טירוזין קינאז CML המולקולריים של התקדמות.
במיוחד בהקשר של עמידות לתרופות והתפתחות המחלה. מחקרים שבוצעו על קו תאים זה CML, שימש רבות להבנת הביולוגיה של LAMA-84, תרם לחקר אסטרטגיות טיפוליות LAMA-84, כגון אימטיניב, דאסאטיניב ונילוטיניב. יתר על כן TKI, סייעו בהבהרת התגובות התאיות לדורות שונים של TKI-חדשות שמטרתן להתגבר על עמידות ל BCR-ABL-כולל בדיקת טיפולים משולבים המכוונים למסלולי איתות אחרים המושפעים באופן סינרגטי מחלבון ה ABL.

Tissue	דם
Disease	לוקמיה מיאלואידית כרונית

Synonyms

- LAMA-84
- LAMA84
- Lama84

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Female
Growth properties	Suspension
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	תאים עגולים
Doubling time	30 שעות

IDENTIFIERS

Citation

Lama-84 (מספר קטלוגי Cytion 300261)

NCBI TaxID	9606

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Cellosaurus	CVCL_0388

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Surface antigens

GPIIb/IIIa+, GPIIIa+

Mutational profile

BCR-ABL1 חיובי

Viruses

EBNA, EA ו-VCA לא אותרו

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

RPMI 1640, w: 2.0 mM גלוטמין יציב, w: 2.0 g/L NaHCO3 (מספר קטלוגי של Cytion 820700a)

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, אווירה לחה.

Supplements

מנוטרל בחום FBS הוסף לתווך 10%

Subculturing

תאים הנצמדים לתחתית צלוחית התרבית ניתן לשחרר על ידי ניעור. יש לשמור על התרבית על ידי הוספה או החלפה תקופתית של המצע. יש להתחיל את התרבית בצפיפות של 5 x 10^5 3 תאים/מ"ל ולשמור על ריכוז התאים בטווח של 1 x 10^5 עד 1 x 10^6 תאים/מ"ל לצורך צמיחה מיטבית.

Seeding density	1 2 עד x 10^4 תאים/סמ"ר
Post-thaw recovery	תאים/סמ"ר והניח לתאים להתאושש מתהליך ההקפאה x 10^4 לאחר ההפשרה, צלחת את התאים ב-5 ולהידבק למשך 24 שעות לפחות.

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

ושיטות זיהוי מיקופלסמה מבוססות לומניסצנציה PCR זיהום במיקופלסמה נשלל באמצעות בדיקות מבוססות.
כדי להבטיח שאין זיהום חיידקי, פטרייתי או שמרי, תרבויות התאים עוברות בדיקות ויזואליות יומיות.

Freeze medium	כדי להבטיח 10% DMSO + (FBS כולל) כמדיום לשימור בקירור, אנו משתמשים במדיום גידול מלא הכולל חומרים אוסמו-מגנים ומייצבי מטבוליזם משופרים כדי לשפר את ההתאוששות ולהפחית את הלחץ הנגרם מהקפאה, או חיוניות נאותה לאחר ההפשרה, מספר קטלוגי Cytion 800100), CM-1.

Storage conditions

לשימור לטווח ארוך, יש להניח את הבקבוקונים בחנקן נוזלי במצב של אדי בטמפרטורה של כ-150 עד 196 מעלות צלזיוס. אחסון בטמפרטורה של 80 מעלות צלזיוס מקובל רק כצעד ביניים קצר לפני העברה לחנקן נוזלי.

Shipping conditions

במהלך -Cשורות תאים שהוקפאו נשלחות בקרח יבש באריזה מאושרת ומבודדת עם כמות מספקת של חומר קירור כדי לשמור על טמפרטורה של כ-78° ההובלה. עם קבלת המשלוח, יש לבדוק את המכל מיד ולהעביר את הבקבוקונים ללא דיחוי לאחסון מתאים.

DONOR

Donor age	שנים 29
Ethnicity	קווקזי

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

כאשר מתכננים לאחסן קריוביאל בחנקן נוזלי להפשרה עתידית, חובה להקפיד על אמצעי בטיחות מחמירים. יש להקפיד על שימוש בכפפות ובבגדים מגנים מתאימים, וכן על שימוש במסכת פנים או משקפי מגן בעת העברת דגימות קפואות אל מיכל החנקן הנוזלי או ממנו. זאת כדי להפחית את הסיכון לפציעה כתוצאה מפיצוץ אפשרי של הקריוביאל בעת הוצאתו, העלול לגרום להתזת רסיסים חדים.

Warranty

אנו עומדים מאחורי האיכות והכדאיות של המוצרים שלנו, Cytion-ב.
אנו מבטיחים שתאינו יהיו קיימים בתחילת התרבית למשך
60 יום לאחר המשלוח מהמתקנים שלנו.
אנו מבטיחים שכל החומרים תואמים למפרטים המתוארים
בתעודת הניתוח ו/או בדף המוצר.
לפרטים מלאים, אנא עיינו ב
<a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">הצהרת האחריות שלנו

Material Transfer Agreement required	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB