Celle Lama-84

300261

LAMA-84 è una linea cellulare umana derivata dal sangue periferico di un paziente affetto da leucemia mieloide cronica (CML) in crisi di blasti. Questa linea cellulare è caratterizzata dalla presenza del cromosoma Philadelphia, che determina la fusione del gene BCR-ABL, un segno distintivo della CML. L'oncogene BCR-ABL è noto per il suo ruolo nell'aumentare l'attività della tirosin-chinasi, che promuove diverse vie di segnalazione che portano alla proliferazione cellulare incontrollata e alla resistenza all'apoptosi. Le cellule LAMA-84 sono quindi un modello prezioso per studiare i meccanismi molecolari della progressione della CML e per valutare l'efficacia degli inibitori della tirosin-chinasi (TKI) in un contesto preclinico.
Nella ricerca, LAMA-84 è stata ampiamente utilizzata per comprendere la biologia della CML, soprattutto nel contesto della resistenza ai farmaci e dell'evoluzione della malattia. Gli studi condotti su questa linea cellulare hanno contribuito a chiarire le risposte cellulari a diverse generazioni di TKI, come imatinib, dasatinib e nilotinib. Inoltre, LAMA-84 ha contribuito allo studio di nuove strategie terapeutiche volte a superare la resistenza ai TKI, compresa la sperimentazione di terapie di combinazione che mirano ad altre vie di segnalazione sinergicamente influenzate dalla proteina di fusione BCR-ABL.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrizione

LAMA-84 è una linea cellulare umana derivata dal sangue periferico di un paziente affetto da leucemia mieloide cronica (CML) in crisi di blasti. Questa linea cellulare è caratterizzata dalla presenza del cromosoma Philadelphia, che determina la fusione del gene BCR-ABL, un segno distintivo della CML. L'oncogene BCR-ABL è noto per il suo ruolo nell'aumentare l'attività della tirosin-chinasi, che promuove diverse vie di segnalazione che portano alla proliferazione cellulare incontrollata e alla resistenza all'apoptosi. Le cellule LAMA-84 sono quindi un modello prezioso per studiare i meccanismi molecolari della progressione della CML e per valutare l'efficacia degli inibitori della tirosin-chinasi (TKI) in un contesto preclinico.
Nella ricerca, LAMA-84 è stata ampiamente utilizzata per comprendere la biologia della CML, soprattutto nel contesto della resistenza ai farmaci e dell'evoluzione della malattia. Gli studi condotti su questa linea cellulare hanno contribuito a chiarire le risposte cellulari a diverse generazioni di TKI, come imatinib, dasatinib e nilotinib. Inoltre, LAMA-84 ha contribuito allo studio di nuove strategie terapeutiche volte a superare la resistenza ai TKI, compresa la sperimentazione di terapie di combinazione che mirano ad altre vie di segnalazione sinergicamente influenzate dalla proteina di fusione BCR-ABL.

Tessuto	Sangue
Malattia	Leucemia mieloide cronica

Sinonimi

- LAMA-84
- LAMA84
- Lama84

CLASSIFICAZIONE

Organismo	Umano
Sesso	Donna
Proprietà di crescita	Sospensione
Livello di biosicurezza	1

CARATTERISTICHE

Morfologia	Celle rotonde
Tempo di raddoppio	30 ore

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IDENTIFICATORI

Riferimento bibliografico

Lama-84 (numero di catalogo Cytion 300261)

Codice fiscale NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_0388

ESPRESSIONE E SUSCETTIBILITÀ

Antigeni di superficie

GPIIb/IIIa+, GPIIIa+

Profilo mutazionale

BCR-ABL1 pos

Virus

EBNA, EA e VCA non sono stati rilevati

MANIPOLAZIONE E COLTURA

Terreno di coltura

RPMI 1640, w: 2,0 mM di glutammina stabile, w: 2,0 g/L di NaHCO3 (articolo Cytion numero 820700a)

Atmosfera di incubazione	37°C, 5%CO2, atmosfera umidificata.

Integratori

Integrare il terreno di coltura con il 10% di FBS inattivato termicamente

Subcoltura

Le cellule che aderiscono al fondo della fiasca di coltura cellulare possono essere staccate agitando. Mantenere le colture aggiungendo o sostituendo periodicamente il terreno. Avviare le colture con una densità di 5 x 10^5 cellule/ml e mantenere la concentrazione cellulare nell'intervallo compreso tra 3 x 10^5 e 1 x 10^6 cellule/ml per una crescita ottimale.

Densità di semina	Da 1 a 2 x 10^4 cellule/cm^2
Recupero post-scongelamento	Dopo lo scongelamento, piastrare le cellule a 5 x 10^4 cellule/cm^2 e lasciare che le cellule si riprendano dal processo di congelamento e aderiscano per almeno 24 ore.

Scongelamento e coltura

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTROLLO DI QUALITÀ E CRIOCONSERVAZIONE

Sterilità

La contaminazione da micoplasma viene esclusa utilizzando sia saggi basati sulla PCR sia metodi di rilevamento del micoplasma basati sulla luminescenza.
Per garantire l'assenza di contaminazione batterica, fungina o da lieviti, le colture cellulari sono sottoposte a ispezioni visive quotidiane.

Terreno di coltura congelato	Come terreno di crioconservazione, utilizziamo un terreno di crescita completo (incluso FBS) + 10% DMSO per un'adeguata vitalità post-scongelamento, o CM-1 (numero di catalogo Cytion 800100), che include osmoprotettori e stabilizzatori metabolici ottimizzati per migliorare il recupero e ridurre lo stress crio-indotto.

Condizioni di conservazione

Per la conservazione a lungo termine, porre le fiale in azoto liquido in fase vapore a una temperatura compresa tra -150 e -196 °C circa. La conservazione a -80 °C è accettabile solo come breve fase intermedia prima del trasferimento in azoto liquido.

Condizioni di spedizione

Le linee cellulari crioconservate vengono spedite su ghiaccio secco in confezioni isolate e convalidate, con una quantità di refrigerante sufficiente a mantenere circa -78 °C durante il trasporto. Al ricevimento, ispezionare immediatamente il contenitore e trasferire immediatamente le fiale in un luogo di conservazione appropriato.

DONATORE

Età dei donatori	29 anni
Etnia	Caucasico

ASPETTI LEGALI E DI SICUREZZA

Misure di sicurezza

Quando si prevede di conservare una crioviale in azoto liquido per un futuro scongelamento, è obbligatorio attenersi a rigorose misure di sicurezza. Guanti e indumenti protettivi appropriati sono essenziali e l'uso di una maschera facciale o di occhiali di sicurezza è richiesto durante il trasferimento dei campioni congelati da o verso il serbatoio di azoto liquido. Questo per ridurre il rischio di lesioni dovute a potenziali esplosioni di crioviali al momento della rimozione, che possono provocare la proiezione di frammenti taglienti.

Garanzia

Noi di Cytion garantiamo la qualità e la vitalità dei nostri prodotti.
Garantiamo che le nostre cellule saranno vitali all'inizio della coltura per 60 giorni dopo la spedizione dai nostri stabilimenti.
Assicuriamo che tutti i materiali sono conformi alle specifiche descritte nel Certificato di Analisi e/o nella Scheda Prodotto
Per tutti i dettagli, consultare la nostra <a href=""/Chi-siamo/Garanzia/"" hreflang=""x-default"">Dichiarazione di Garanzia

È richiesto un accordo di trasferimento di materiale	Yes