Células Lama-84

300261

A LAMA-84 é uma linhagem celular humana derivada do sangue periférico de um paciente com leucemia mielóide crônica (LMC) em crise blástica. Essa linhagem celular é caracterizada pela presença do cromossomo Filadélfia, que resulta no gene de fusão BCR-ABL, uma característica marcante da LMC. O oncogene BCR-ABL é conhecido por seu papel no aumento da atividade da tirosina quinase, o que promove várias vias de sinalização que levam à proliferação celular descontrolada e à resistência à apoptose. As células LAMA-84 são, portanto, um modelo inestimável para o estudo dos mecanismos moleculares da progressão da LMC e para a avaliação da eficácia dos inibidores da tirosina quinase (TKIs) em um contexto pré-clínico.
Na pesquisa, a LAMA-84 tem sido amplamente utilizada para compreender a biologia da LMC, especialmente no contexto da resistência aos medicamentos e da evolução da doença. Estudos envolvendo essa linhagem celular ajudaram a elucidar as respostas celulares a diferentes gerações de TKIs, como o imatinibe, o dasatinibe e o nilotinibe. Além disso, a LAMA-84 contribuiu para a investigação de novas estratégias terapêuticas destinadas a superar a resistência aos TKIs, incluindo o teste de terapias combinadas que têm como alvo outras vias de sinalização afetadas sinergicamente pela proteína de fusão BCR-ABL.

GENERAL INFORMATION

Description

A LAMA-84 é uma linhagem celular humana derivada do sangue periférico de um paciente com leucemia mielóide crônica (LMC) em crise blástica. Essa linhagem celular é caracterizada pela presença do cromossomo Filadélfia, que resulta no gene de fusão BCR-ABL, uma característica marcante da LMC. O oncogene BCR-ABL é conhecido por seu papel no aumento da atividade da tirosina quinase, o que promove várias vias de sinalização que levam à proliferação celular descontrolada e à resistência à apoptose. As células LAMA-84 são, portanto, um modelo inestimável para o estudo dos mecanismos moleculares da progressão da LMC e para a avaliação da eficácia dos inibidores da tirosina quinase (TKIs) em um contexto pré-clínico.
Na pesquisa, a LAMA-84 tem sido amplamente utilizada para compreender a biologia da LMC, especialmente no contexto da resistência aos medicamentos e da evolução da doença. Estudos envolvendo essa linhagem celular ajudaram a elucidar as respostas celulares a diferentes gerações de TKIs, como o imatinibe, o dasatinibe e o nilotinibe. Além disso, a LAMA-84 contribuiu para a investigação de novas estratégias terapêuticas destinadas a superar a resistência aos TKIs, incluindo o teste de terapias combinadas que têm como alvo outras vias de sinalização afetadas sinergicamente pela proteína de fusão BCR-ABL.

Tissue	Sangue
Disease	Leucemia mielóide crônica

Synonyms

- LAMA-84
- LAMA84
- Lama84

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Female
Growth properties	Suspension
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	Células redondas
Doubling time	30 horas

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IDENTIFIERS

Citation

Lama-84 (número de catálogo da Cytion 300261)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_0388

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Surface antigens

GPIIb/IIIa+, GPIIIa+

Mutational profile

BCR-ABL1 positivo

Viruses

Não foram detectados EBNA, EA e VCA

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

RPMI 1640, com 2,0 mM de glutamina estável e 2,0 g/L de $NaHCO_3$ (número de artigo da Cytion: 820700a)

Incubation atmosphere	37 °C, 5% de CO_2, atmosfera umidificada.

Supplements

Adicione ao meio 10% de FBS inativado por calor

Subculturing

As células aderidas ao fundo do frasco de cultura celular podem ser desprendidas por agitação. Mantenha as culturas adicionando ou substituindo periodicamente o meio. Inicie as culturas com uma densidade de 5 x 10^5 células/ml e mantenha a concentração celular na faixa de 3 x 10^5 a 1 x 10^6 células/ml para um crescimento ideal.

Seeding density	1 a 2 x 10^4 células/cm^2
Post-thaw recovery	Após o descongelamento, semeie as células a uma densidade de 5 x 10^4 células/cm^2 e deixe que elas se recuperem do processo de congelamento e se adiram por pelo menos 24 horas.

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

A contaminação por micoplasma é descartada por meio de ensaios baseados em PCR e de métodos de detecção de micoplasma baseados em luminescência.
Para garantir que não haja contaminação por bactérias, fungos ou leveduras, as culturas celulares são submetidas a inspeções visuais diárias.

Freeze medium	Como meio de criopreservação, utilizamos meio de crescimento completo (incluindo FBS) + 10% de DMSO para garantir viabilidade adequada após o descongelamento, ou CM-1 (número de catálogo da Cytion 800100), que inclui osmoprotetores e estabilizadores metabólicos otimizados para melhorar a recuperação e reduzir o estresse induzido pela criopreservação.

Storage conditions

Para preservação a longo prazo, coloque os frascos em nitrogênio líquido em fase de vapor a uma temperatura entre aproximadamente −150 e −196 °C. O armazenamento a −80 °C é aceitável apenas como uma etapa intermediária de curta duração antes da transferência para o nitrogênio líquido.

Shipping conditions

As linhagens celulares criopreservadas são enviadas em gelo seco, em embalagens isoladas e validadas, com refrigerante suficiente para manter a temperatura em aproximadamente −78 °C durante todo o transporte. Ao receber a remessa, inspecione o recipiente imediatamente e transfira os frascos sem demora para o local de armazenamento adequado.

DONOR

Donor age	29 anos
Ethnicity	caucasiano

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

Ao planejar o armazenamento de um criotubo em nitrogênio líquido para descongelamento futuro, é obrigatório seguir medidas de segurança rigorosas. É essencial o uso de luvas e roupas de proteção adequadas, além do uso obrigatório de máscara facial ou óculos de proteção durante a transferência de amostras congeladas para dentro ou para fora do tanque de nitrogênio líquido. Isso visa mitigar o risco de ferimentos decorrentes de possíveis explosões dos criotubos durante a remoção, o que pode resultar na projeção de fragmentos pontiagudos.

Warranty

Na Cytion, garantimos a qualidade e a viabilidade de nossos produtos.
Garantimos que nossas células permanecerão viáveis no início da cultura por
60 dias após o envio de nossas instalações.
Asseguramos que todos os materiais estão em conformidade com as especificações descritas no
Certificado de Análise e/ou na Ficha Técnica do Produto.
Para obter todos os detalhes, consulte nossa
Declaração de Garantia.

Material Transfer Agreement required	Yes