Lama-84 Hücreleri

300261

LAMA-84, blast krizindeki kronik miyeloid lösemili (KML) bir hastanın periferik kanından elde edilen bir insan hücre hattıdır. Bu hücre hattı, KML'nin ayırt edici özelliklerinden biri olan BCR-ABL füzyon geniyle sonuçlanan Philadelphia kromozomunun varlığıyla karakterize edilir. BCR-ABL onkogeni, kontrolsüz hücre çoğalmasına ve apoptoza karşı dirence yol açan çeşitli sinyal yollarını destekleyen tirozin kinaz aktivitesini artırmadaki rolüyle bilinir. Bu nedenle LAMA-84 hücreleri, KML ilerlemesinin moleküler mekanizmalarını incelemek ve klinik öncesi ortamda tirozin kinaz inhibitörlerinin (TKI'ler) etkinliğini değerlendirmek için çok değerli bir modeldir.
Araştırmalarda LAMA-84, özellikle ilaç direnci ve hastalık evrimi bağlamında KML biyolojisini anlamak için yaygın olarak kullanılmıştır. Bu hücre hattını içeren çalışmalar, imatinib, dasatinib ve nilotinib gibi farklı TKI nesillerine karşı hücresel tepkilerin aydınlatılmasına yardımcı olmuştur. Ayrıca, LAMA-84, BCR-ABL füzyon proteini tarafından sinerjik olarak etkilenen diğer sinyal yolaklarını hedef alan kombinasyon tedavilerinin test edilmesi de dahil olmak üzere, TKI direncinin üstesinden gelmeyi amaçlayan yeni terapötik stratejilerin araştırılmasına katkıda bulunmuştur.

GENEL BILGILER

Açıklama

LAMA-84, blast krizindeki kronik miyeloid lösemili (KML) bir hastanın periferik kanından elde edilen bir insan hücre hattıdır. Bu hücre hattı, KML'nin ayırt edici özelliklerinden biri olan BCR-ABL füzyon geniyle sonuçlanan Philadelphia kromozomunun varlığıyla karakterize edilir. BCR-ABL onkogeni, kontrolsüz hücre çoğalmasına ve apoptoza karşı dirence yol açan çeşitli sinyal yollarını destekleyen tirozin kinaz aktivitesini artırmadaki rolüyle bilinir. Bu nedenle LAMA-84 hücreleri, KML ilerlemesinin moleküler mekanizmalarını incelemek ve klinik öncesi ortamda tirozin kinaz inhibitörlerinin (TKI'ler) etkinliğini değerlendirmek için çok değerli bir modeldir.
Araştırmalarda LAMA-84, özellikle ilaç direnci ve hastalık evrimi bağlamında KML biyolojisini anlamak için yaygın olarak kullanılmıştır. Bu hücre hattını içeren çalışmalar, imatinib, dasatinib ve nilotinib gibi farklı TKI nesillerine karşı hücresel tepkilerin aydınlatılmasına yardımcı olmuştur. Ayrıca, LAMA-84, BCR-ABL füzyon proteini tarafından sinerjik olarak etkilenen diğer sinyal yolaklarını hedef alan kombinasyon tedavilerinin test edilmesi de dahil olmak üzere, TKI direncinin üstesinden gelmeyi amaçlayan yeni terapötik stratejilerin araştırılmasına katkıda bulunmuştur.

Doku	Kan
Hastalık	Kronik miyeloid lösemi

Eş anlamlılar

- LAMA-84
- LAMA84
- Lama84

SINIFLANDIRMA

Canlı	İnsan
Cinsiyet	Kadın
Büyüme özellikleri	Askıya alma
Biyogüvenlik seviyesi	1

ÖZELLIKLER

Morfoloji	Yuvarlak hücreler
İki katına çıkma süresi	30 saat

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

TANIMLAYICILAR

Kaynak gösterimi

Lama-84 (Cytion katalog numarası 300261)

NCBI Vergi Kimlik Numarası	9606
Cellosaurus	CVCL_0388

İFADE VE DUYARLILIK

Yüzey antijenleri

GPIIb/IIIa+, GPIIIa+

Mutasyon profili

BCR-ABL1 pos

Virüsler

EBNA, EA ve VCA tespit edilmedi

İŞLEME VE YETIŞTIRME

Besiyeri

RPMI 1640, w: 2.0 mM stabil Glutamin, w: 2.0 g/L NaHCO3 (Cytion makale numarası 820700a)

Kuluçka ortamı	37°C, %5CO2, nemlendirilmiş atmosfer.

Takviyeler

Ortamı %10 ısıyla inaktive edilmiş FBS ile destekleyin

Alt kültür oluşturma

Hücre kültürü şişesinin dibine yapışan hücreler çalkalayarak çıkarılabilir. Ortamı periyodik olarak ekleyerek veya değiştirerek kültürleri muhafaza edin. Kültürleri 5 x 10^5 hücre/ml yoğunlukta başlatın ve optimum büyüme için hücre konsantrasyonunu 3 x 10^5 ila 1 x 10^6 hücre/ml aralığında tutun.

Ekim yoğunluğu	1 ila 2 x 10^4 hücre/cm^2
Çözülme sonrası toparlanma	Çözüldükten sonra, hücreleri 5 x 10^4 hücre/cm^2 olarak plakaya yerleştirin ve hücrelerin dondurma işleminden kurtulmasını ve en az 24 saat boyunca yapışmasını bekleyin.

Çözme ve kültürleme

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KALITE KONTROL VE KRIYOPREZERVASYON

Kısırlık

Mikoplazma kontaminasyonu hem PCR tabanlı tahliller hem de lüminesans tabanlı mikoplazma tespit yöntemleri kullanılarak dışlanır. Bakteriyel, fungal veya maya kontaminasyonu olmadığından emin olmak için hücre kültürleri günlük görsel incelemelere tabi tutulur.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Dondurma ortamı	Kriyoprezervasyon ortamı olarak, yeterli çözülme sonrası canlılık için tam büyüme ortamı (FBS dahil) + %10 DMSO veya iyileşmeyi artırmak ve kriyo-indüklenmiş stresi azaltmak için optimize edilmiş ozmoprotektanlar ve metabolik stabilizatörler içeren CM-1 (Cytion katalog numarası 800100) kullanıyoruz.

Saklama koşulları

Uzun süreli muhafaza için flakonları yaklaşık -150 ila -196 °C'de buhar fazlı sıvı nitrojen içine yerleştirin. 80 °C'de saklama yalnızca sıvı nitrojene aktarılmadan önce kısa bir ara adım olarak kabul edilebilir.

Nakliye koşulları

Kriyoprezerve edilmiş hücre hatları, nakliye boyunca yaklaşık -78 °C'yi korumak için yeterli soğutucu akışkan içeren, onaylanmış, yalıtılmış ambalajlarda kuru buz üzerinde gönderilir. Teslim aldığınızda, kabı hemen inceleyin ve flakonları gecikmeden uygun depoya aktarın.

BAĞIŞÇI

Bağışçının yaşı	29 yıl
Etnik köken	Kafkas

YASAL VE GÜVENLIK

Güvenlik önlemleri

İleride çözdürmek üzere sıvı nitrojen içinde bir kriyoviyal saklamayı planlarken, sıkı güvenlik önlemlerine uymak zorunludur. Uygun koruyucu eldivenler ve giysiler şarttır ve dondurulmuş numunelerin sıvı nitrojen tankına veya tanktan transferi sırasında yüz maskesi veya koruyucu gözlük kullanılması gerekir. Bu, çıkarma sırasında keskin parçaların fırlamasına neden olabilecek potansiyel kriyoviyal patlamalardan kaynaklanan yaralanma riskini azaltmak içindir.

Garanti

Cytion olarak ürünlerimizin kalitesinin ve canlılığının arkasındayız.
Hücrelerimizin, tesislerimizden sevkiyattan sonra 60 gün boyunca kültürün başlangıcında canlı olacağını garanti ediyoruz.
Tüm malzemelerin Analiz Sertifikası ve/veya Ürün Sayfasında açıklanan özelliklere uygun olduğunu garanti ediyoruz
Tüm ayrıntılar için lütfen <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garanti Beyanımıza bakın

Malzeme Transfer Anlaşması gereklidir	Yes