Tế bào Lama-84

300261

LAMA-84 là dòng tế bào người được phân lập từ máu ngoại vi của một bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu tủy mạn tính (CML) ở giai đoạn bùng phát. Dòng tế bào này được đặc trưng bởi sự hiện diện của nhiễm sắc thể Philadelphia, dẫn đến sự hình thành gen hợp nhất BCR-ABL, một đặc trưng điển hình của CML. Gen ung thư BCR-ABL được biết đến với vai trò tăng cường hoạt động kinase tyrosine, thúc đẩy các con đường tín hiệu dẫn đến sự tăng sinh tế bào không kiểm soát và kháng apoptosis. Do đó, tế bào LAMA-84 là mô hình vô giá để nghiên cứu các cơ chế phân tử của sự tiến triển CML và đánh giá hiệu quả của các chất ức chế kinase tyrosine (TKIs) trong môi trường tiền lâm sàng. Trong nghiên cứu, LAMA-84 đã được sử dụng rộng rãi để hiểu rõ sinh học của CML, đặc biệt trong bối cảnh kháng thuốc và tiến triển bệnh. Các nghiên cứu sử dụng dòng tế bào này đã giúp làm sáng tỏ các phản ứng tế bào đối với các thế hệ TKIs khác nhau, như imatinib, dasatinib và nilotinib. Hơn nữa, LAMA-84 đã góp phần vào việc nghiên cứu các chiến lược điều trị mới nhằm vượt qua kháng thuốc TKIs, bao gồm việc thử nghiệm các liệu pháp kết hợp nhắm vào các con đường tín hiệu khác bị ảnh hưởng đồng thời bởi protein BCR-ABL.

GENERAL INFORMATION

Description

LAMA-84 là dòng tế bào người được phân lập từ máu ngoại vi của một bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu tủy mạn tính (CML) ở giai đoạn bùng phát. Dòng tế bào này được đặc trưng bởi sự hiện diện của nhiễm sắc thể Philadelphia, dẫn đến sự hình thành gen hợp nhất BCR-ABL, một đặc trưng điển hình của CML. Gen ung thư BCR-ABL được biết đến với vai trò tăng cường hoạt động kinase tyrosine, thúc đẩy các con đường tín hiệu dẫn đến sự tăng sinh tế bào không kiểm soát và kháng apoptosis. Do đó, tế bào LAMA-84 là mô hình vô giá để nghiên cứu các cơ chế phân tử của sự tiến triển CML và đánh giá hiệu quả của các chất ức chế kinase tyrosine (TKIs) trong môi trường tiền lâm sàng. Trong nghiên cứu, LAMA-84 đã được sử dụng rộng rãi để hiểu rõ sinh học của CML, đặc biệt trong bối cảnh kháng thuốc và tiến triển bệnh. Các nghiên cứu sử dụng dòng tế bào này đã giúp làm sáng tỏ các phản ứng tế bào đối với các thế hệ TKIs khác nhau, như imatinib, dasatinib và nilotinib. Hơn nữa, LAMA-84 đã góp phần vào việc nghiên cứu các chiến lược điều trị mới nhằm vượt qua kháng thuốc TKIs, bao gồm việc thử nghiệm các liệu pháp kết hợp nhắm vào các con đường tín hiệu khác bị ảnh hưởng đồng thời bởi protein BCR-ABL.

Tissue	Máu
Disease	Bệnh bạch cầu mạn tính dòng tủy

Synonyms

- LAMA-84
- LAMA84
- Lama84

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Female
Growth properties	Suspension
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	Tế bào tròn
Doubling time	30 giờ

IDENTIFIERS

Citation

Lama-84 (Số catalog Cytion 300261)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_0388

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Surface antigens

GPIIb/IIIa dương tính, GPIIIa dương tính

Mutational profile

BCR-ABL1 dương tính

Viruses

EBNA, EA và VCA không được phát hiện

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

RPMI 1640, chứa: 2,0 mM glutamine ổn định, chứa: 2,0 g/L $NaHCO_3$ (Số hiệu sản phẩm Cytion 820700a)

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO_2, môi trường ẩm.

Supplements

Bổ sung vào môi trường nuôi cấy 10% huyết thanh bò đã được khử hoạt tính bằng nhiệt

Subculturing

Các tế bào bám dính vào đáy của bình nuôi cấy tế bào có thể được tách ra bằng cách lắc. Duy trì nuôi cấy bằng cách định kỳ thêm hoặc thay thế môi trường nuôi cấy. Bắt đầu nuôi cấy với mật độ 5 x 10^5 tế bào/ml và duy trì nồng độ tế bào trong khoảng từ 3 x 10^5 đến 1 x 10^6 tế bào/ml để đạt được sự phát triển tối ưu.

Seeding density	1 đến 2 × 10^4 tế bào/cm^2
Post-thaw recovery	Sau khi rã đông, cấy tế bào với mật độ 5 x 10^4 tế bào/cm^2 và để tế bào phục hồi sau quá trình đông lạnh và bám dính ít nhất 24 giờ.

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

Sự nhiễm khuẩn Mycoplasma được loại trừ bằng cả các phương pháp xét nghiệm dựa trên PCR và các phương pháp phát hiện Mycoplasma dựa trên phát quang.
Để đảm bảo không có nhiễm khuẩn vi khuẩn, nấm hoặc men, các mẫu nuôi cấy tế bào được kiểm tra trực quan hàng ngày.

Freeze medium	Như một môi trường bảo quản đông lạnh, chúng tôi sử dụng môi trường tăng trưởng hoàn chỉnh (bao gồm FBS) + 10% DMSO để đảm bảo độ sống sau khi rã đông, hoặc CM-1 (mã sản phẩm Cytion 800100), bao gồm các chất bảo vệ thẩm thấu và chất ổn định chuyển hóa được tối ưu hóa để cải thiện quá trình phục hồi và giảm stress do đông lạnh gây ra.

Storage conditions

Để bảo quản lâu dài, hãy đặt ống nghiệm vào nitơ lỏng ở pha hơi ở nhiệt độ khoảng −150 đến −196 °C. Việc bảo quản ở −80 °C chỉ được chấp nhận như một bước trung gian ngắn hạn trước khi chuyển sang nitơ lỏng.

Shipping conditions

Các dòng tế bào được bảo quản bằng phương pháp đông lạnh được vận chuyển trên đá khô trong bao bì cách nhiệt đã được kiểm định, kèm theo lượng chất làm lạnh đủ để duy trì nhiệt độ khoảng −78 °C trong suốt quá trình vận chuyển. Khi nhận hàng, hãy kiểm tra ngay lập tức bao bì và chuyển các ống nghiệm sang nơi lưu trữ phù hợp mà không chậm trễ.

DONOR

Donor age	29 năm
Ethnicity	Người da trắng

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

Khi lập kế hoạch lưu trữ ống cryovial trong nitơ lỏng để rã đông sau này, việc tuân thủ các biện pháp an toàn nghiêm ngặt là bắt buộc. Găng tay và quần áo bảo hộ phù hợp là điều cần thiết, và việc sử dụng khẩu trang hoặc kính bảo hộ là bắt buộc trong quá trình chuyển mẫu đông lạnh vào hoặc ra khỏi bể nitơ lỏng. Điều này nhằm giảm thiểu nguy cơ chấn thương do nổ ống cryovial khi lấy ra, có thể dẫn đến việc văng ra các mảnh vỡ sắc nhọn.

Warranty

Tại Cytion, chúng tôi cam kết về chất lượng và khả năng sống của các sản phẩm của mình.
Chúng tôi đảm bảo rằng các tế bào của chúng tôi sẽ có khả năng sống tại thời điểm bắt đầu nuôi cấy trong
60 ngày kể từ khi vận chuyển từ cơ sở của chúng tôi.
Chúng tôi cam kết rằng tất cả các vật liệu tuân thủ các thông số kỹ thuật được mô tả trong
Giấy chứng nhận phân tích và/hoặc Tài liệu sản phẩm.
Để biết chi tiết đầy đủ, vui lòng tham khảo
<a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Tuyên bố Bảo hành.

Material Transfer Agreement required	Yes