Komórki HEK293 EBNA

300264

Linia komórkowa HEK293 EBNA jest pochodną oryginalnej linii HEK293, która sama pochodzi z ludzkich embrionalnych komórek nerki hodowanych w hodowli tkankowej. Ta konkretna podlinia została zaprojektowana w celu stabilnej ekspresji antygenu jądrowego-1 wirusa Epsteina-Barr (EBNA-1). Ekspresja EBNA-1 pozwala na episomalną replikację plazmidów, które niosą pochodzenie replikacji EBV, dzięki czemu komórki HEK293 EBNA są szczególnie cenne do produkcji białek rekombinowanych i badań ekspresji genów z wykorzystaniem wektorów episomalnych.
Komórki HEK293 EBNA zachowują wiele cech macierzystych komórek HEK293, w tym ich przyleganie do plastiku do hodowli komórkowych i ich silny wzrost w standardowych pożywkach do hodowli komórek ssaków. Dodanie EBNA-1 rozszerza ich użyteczność w badaniach i zastosowaniach biotechnologicznych, ponieważ zwiększa zdolność komórek do propagacji plazmidów z pochodzeniem replikacji plazmidu EBV. Cecha ta ma kluczowe znaczenie dla produkcji stabilnych, wysokowydajnych białek rekombinowanych, co jest niezbędne zarówno do celów badawczych, jak i produkcji na skalę przemysłową.

INFORMACJE OGÓLNE

Opis

Linia komórkowa HEK293 EBNA jest pochodną oryginalnej linii HEK293, która sama pochodzi z ludzkich embrionalnych komórek nerki hodowanych w hodowli tkankowej. Ta konkretna podlinia została zaprojektowana w celu stabilnej ekspresji antygenu jądrowego-1 wirusa Epsteina-Barr (EBNA-1). Ekspresja EBNA-1 pozwala na episomalną replikację plazmidów, które niosą pochodzenie replikacji EBV, dzięki czemu komórki HEK293 EBNA są szczególnie cenne do produkcji białek rekombinowanych i badań ekspresji genów z wykorzystaniem wektorów episomalnych.
Komórki HEK293 EBNA zachowują wiele cech macierzystych komórek HEK293, w tym ich przyleganie do plastiku do hodowli komórkowych i ich silny wzrost w standardowych pożywkach do hodowli komórek ssaków. Dodanie EBNA-1 rozszerza ich użyteczność w badaniach i zastosowaniach biotechnologicznych, ponieważ zwiększa zdolność komórek do propagacji plazmidów z pochodzeniem replikacji plazmidu EBV. Cecha ta ma kluczowe znaczenie dla produkcji stabilnych, wysokowydajnych białek rekombinowanych, co jest niezbędne zarówno do celów badawczych, jak i produkcji na skalę przemysłową.

Chusteczka	Nerka embrionalna

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Synonimy

- HEK293-EBNA
- 293 c18
- 293c18
- HEK 293 c18
- HEK-293 c18
- HEK293-EBNA1
- HEK-293-EBNA
- HEK 293-EBNA
- HEK 293 EBNA
- HEK293EBNA
- 293 EBNA
- 293-EBNA1
- 293-EBNA
- 293/EBNA
- 293EBNA
- EBNA-293
- EBNA293
- HEK293E
- HEK/EBNA
- HEK-EBNA
- HEK.EBNA
- 293/EBNA-1
- 298E

KLASYFIKACJA

Organizm	Człowiek
Seks	Kobieta
Właściwości związane ze wzrostem	Zwolennik
Status GMO	GMO-S1

Szczegółowe informacje dotyczące statusu GMO

GMO-S1: This HEK293 EBNA cell line contains EBV nuclear antigen (EBNA) sequences enabling episomal replication of EBV-derived plasmids, without releasing infectious virus particles. The modification is stably present in embryonic kidney-derived cells. This classification applies only within Germany and may differ elsewhere.

Poziom bezpieczeństwa biologicznego	2

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Morfologia	Nabłonek

IDENTYFIKATORY

Źródło

HEK293 EBNA (numer katalogowy Cytion 300264)

Numer identyfikacji podatkowej NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_6974

EKSPRESJA I PODATNOŚĆ

Ekspresja antygenu

EBNA1

Wirusy

Adenowirus 5 (transformant), EBV (wykazuje ekspresję EBNA1)

POSTĘPOWANIE I HODOWLA

Pożywka hodowlana

DMEM, w: 4,5 g/l glukozy, w: 4 mM L-glutaminy, w: 3,7 g/l NaHCO3, w: 1,0 mM pirogronianu sodu (numer artykułu Cytion 820300a)

Atmosfera inkubacyjna	37°C, 5%CO2, nawilżona atmosfera.

Suplementy

Uzupełnić podłoże 10% FBS

Odczynnik dysocjacyjny	Accutase

Hodowla komórek w subkulturze

Usuń starą pożywkę z przylegających komórek i przemyj je PBS, który nie zawiera wapnia i magnezu. W przypadku kolb T25 należy użyć 3-5 ml PBS, a w przypadku kolb T75 5-10 ml. Następnie całkowicie pokryj komórki Accutase, używając 1-2 ml dla kolb T25 i 2,5 ml dla kolb T75. Pozwól komórkom inkubować w temperaturze pokojowej przez 8-10 minut, aby je oddzielić. Po inkubacji delikatnie wymieszaj komórki z 10 ml pożywki, aby ponownie je zawiesić, a następnie odwiruj przy 300xg przez 3 minuty. Odrzucić supernatant, ponownie zawiesić komórki w świeżej pożywce i przenieść je do nowych kolb zawierających już świeżą pożywkę.

Rozmrażanie i hodowla

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA JAKOŚCI I KRIOKONSERWACJA

Bezpłodność

Zanieczyszczenie mykoplazmą jest wykluczane przy użyciu zarówno testów opartych na PCR, jak i metod wykrywania mykoplazmy opartych na luminescencji.
Aby upewnić się, że nie ma zanieczyszczenia bakteriami, grzybami lub drożdżami, hodowle komórkowe są poddawane codziennym kontrolom wizualnym.

Pożywka do zamrażania	Jako pożywki do kriokonserwacji używamy kompletnej pożywki wzrostowej (w tym FBS) + 10% DMSO w celu zapewnienia odpowiedniej żywotności po rozmrożeniu lub CM-1 (numer katalogowy Cytion 800100), która zawiera zoptymalizowane osmoprotektanty i stabilizatory metaboliczne w celu zwiększenia regeneracji i zmniejszenia stresu wywołanego kriokonserwacją.

Warunki przechowywania

W celu długotrwałego przechowywania należy umieścić fiolki w ciekłym azocie w fazie lotnej w temperaturze od -150 do -196 °C.
Przechowywanie w temperaturze -80 °C jest dopuszczalne tylko jako krótki etap przejściowy przed przeniesieniem do ciekłego azotu.

Warunki wysyłki

Linie komórkowe poddane kriokonserwacji są wysyłane w suchym lodzie w zatwierdzonych, izolowanych opakowaniach z wystarczającą ilością czynnika chłodniczego, aby utrzymać temperaturę około -78°C przez cały czas transportu. Po otrzymaniu przesyłki należy natychmiast sprawdzić pojemnik i bezzwłocznie przenieść fiolki do odpowiedniego miejsca przechowywania.

DARCZYŃCA

Wiek dawcy	Płód

KWESTIE PRAWNE I BEZPIECZEŃSTWO

Środki bezpieczeństwa

Planując przechowywanie kriofiolek w ciekłym azocie w celu ich późniejszego rozmrożenia, należy bezwzględnie przestrzegać rygorystycznych środków bezpieczeństwa. Niezbędne są odpowiednie rękawice i odzież ochronna, a podczas przenoszenia zamrożonych próbek do lub ze zbiornika z ciekłym azotem wymagane jest stosowanie maski lub okularów ochronnych. Ma to na celu zmniejszenie ryzyka obrażeń spowodowanych potencjalnymi eksplozjami kriowialu podczas wyjmowania, które mogą skutkować wyrzuceniem ostrych fragmentów.

Gwarancja

W Cytion gwarantujemy jakość i żywotność naszych produktów.
Gwarantujemy, że nasze komórki będą żywotne na początku hodowli przez 60 dni po wysyłce z naszych zakładów.
Zapewniamy, że wszystkie materiały są zgodne ze specyfikacjami opisanymi w certyfikacie analizy i/lub karcie produktu
Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Oświadczeniu gwarancyjnym

Wymagana umowa o transferze materiałów	Yes