HEK293 EBNA-celler

300264

HEK293 EBNA-cellinjen är ett derivat av den ursprungliga HEK293-cellinjen, som i sin tur härrör från mänskliga embryonala njurceller som odlats i vävnadskultur. Denna speciella sublinje har konstruerats för att stabilt uttrycka Epstein-Barr-virusets nukleära antigen-1 (EBNA-1). Uttrycket av EBNA-1 möjliggör episomal replikation av plasmider som bär på EBV:s replikationsursprung, vilket gör HEK293 EBNA-celler särskilt värdefulla för produktion av rekombinanta proteiner och för genuttrycksstudier som involverar episomala vektorer.
HEK293 EBNA-cellerna behåller många av de egenskaper som kännetecknar HEK293-cellerna, inklusive deras vidhäftning till cellodlingsplast och deras robusta tillväxt i standardmedier för cellodling av däggdjur. Tillägget av EBNA-1 utökar deras användbarhet inom forskning och biotekniska tillämpningar, eftersom det förbättrar cellernas förmåga att sprida plasmider med EBV-ursprunget för plasmidreplikation. Denna egenskap är avgörande för att producera stabila rekombinanta proteiner med hög avkastning, vilket är viktigt för både forskningsändamål och produktion i industriell skala.

ALLMÄN INFORMATION

Beskrivning

HEK293 EBNA-cellinjen är ett derivat av den ursprungliga HEK293-cellinjen, som i sin tur härrör från mänskliga embryonala njurceller som odlats i vävnadskultur. Denna speciella sublinje har konstruerats för att stabilt uttrycka Epstein-Barr-virusets nukleära antigen-1 (EBNA-1). Uttrycket av EBNA-1 möjliggör episomal replikation av plasmider som bär på EBV:s replikationsursprung, vilket gör HEK293 EBNA-celler särskilt värdefulla för produktion av rekombinanta proteiner och för genuttrycksstudier som involverar episomala vektorer.
HEK293 EBNA-cellerna behåller många av de egenskaper som kännetecknar HEK293-cellerna, inklusive deras vidhäftning till cellodlingsplast och deras robusta tillväxt i standardmedier för cellodling av däggdjur. Tillägget av EBNA-1 utökar deras användbarhet inom forskning och biotekniska tillämpningar, eftersom det förbättrar cellernas förmåga att sprida plasmider med EBV-ursprunget för plasmidreplikation. Denna egenskap är avgörande för att producera stabila rekombinanta proteiner med hög avkastning, vilket är viktigt för både forskningsändamål och produktion i industriell skala.

Vävnad	Embryonal njure

Synonymer

- HEK293-EBNA
- 293 c18
- 293c18
- HEK 293 c18
- HEK-293 c18
- HEK293-EBNA1
- HEK-293-EBNA
- HEK 293-EBNA
- HEK 293 EBNA
- HEK293EBNA
- 293 EBNA
- 293-EBNA1
- 293-EBNA
- 293/EBNA
- 293EBNA
- EBNA-293
- EBNA293
- HEK293E
- HEK/EBNA
- HEK-EBNA
- HEK.EBNA
- 293/EBNA-1
- 298E

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

KLASSIFICERING

Organism	Människa
Kön	Kvinna
Tillväxtegenskaper	Följsam
GMO-status	GMO-S1

Detaljer om GMO-status

GMO-S1: This HEK293 EBNA cell line contains EBV nuclear antigen (EBNA) sequences enabling episomal replication of EBV-derived plasmids, without releasing infectious virus particles. The modification is stably present in embryonic kidney-derived cells. This classification applies only within Germany and may differ elsewhere.

Biosäkerhetsnivå	2

EGENSKAPER

Morfologi	Epitelial

IDENTIFIERARE

Källa

HEK293 EBNA (Cytion katalognummer 300264)

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_6974

UTTRYCK OCH MOTTAGLIGHET

Antigenuttryck

EBNA1

Virus

Adenovirus 5 (transformant), EBV (uttrycker EBNA1)

HANTERING OCH ODLING

Odlingsmedium

DMEM, w: 4,5 g/L glukos, w: 4 mM L-glutamin, w: 3,7 g/L NaHCO3, w: 1,0 mM natriumpyruvat (Cytion artikelnummer 820300a)

Inkubationsatmosfär	37°C, 5%CO2, befuktad atmosfär.

Kosttillskott

Komplettera mediet med 10% FBS

Dissociationsmedel	Accutase

Vidareodling

Ta bort det gamla mediet från de adherenta cellerna och tvätta dem med PBS som saknar kalcium och magnesium. Använd 3-5 ml PBS för T25-kolvar och 5-10 ml för T75-kolvar. Täck sedan cellerna helt med Accutase, använd 1-2 ml för T25-kolvar och 2,5 ml för T75-kolvar. Låt cellerna inkubera i rumstemperatur i 8-10 minuter så att de lossnar. Efter inkubationen, blanda cellerna försiktigt med 10 ml medium för att resuspendera dem och centrifugera sedan vid 300xg i 3 minuter. Kassera supernatanten, resuspendera cellerna i färskt medium och överför dem till nya kolvar som redan innehåller färskt medium.

Upptining och odling

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROLL OCH KRYOKONSERVERING

Sterilitet

Mykoplasmakontaminering utesluts med hjälp av både PCR-baserade analyser och luminiscensbaserade metoder för mykoplasmadiagnostik. För att säkerställa att det inte finns någon kontaminering av bakterier, svamp eller jäst utsätts cellkulturerna för dagliga visuella inspektioner.

Frysmedel	Som kryokonserveringsmedium använder vi komplett tillväxtmedium (inklusive FBS) + 10% DMSO för adekvat viabilitet efter upptining, eller CM-1 (Cytion katalognummer 800100), som innehåller optimerade osmoprotektanter och metaboliska stabilisatorer för att förbättra återhämtningen och minska kryoinducerad stress.

Förvaringsförhållanden

För långtidsförvaring, placera flaskorna i flytande kväve i ångfas vid ca -150 till -196 °C. Förvaring vid -80 °C är acceptabelt endast som ett kort mellanliggande steg innan överföring till flytande kväve.

Leveransvillkor

Kryopreserverade cellinjer skickas på torris i validerade, isolerade förpackningar med tillräckligt med kylmedel för att hålla cirka -78 °C under hela transporten. Vid mottagandet ska behållaren omedelbart inspekteras och flaskorna utan dröjsmål överföras till lämplig förvaring.

DONATOR

Donatorns ålder	Foster

JURIDISKA FRÅGOR OCH SÄKERHET

Säkerhetsföreskrifter

När man planerar att förvara en kryovial i flytande kväve för framtida upptining är det obligatoriskt att följa strikta säkerhetsåtgärder. Lämpliga skyddshandskar och skyddskläder är nödvändiga, och ansiktsmask eller skyddsglasögon måste användas vid överföring av frysta prover till eller från tanken med flytande kväve. Detta för att minska risken för skador på grund av eventuella explosioner i frysbehållaren vid borttagning, vilket kan leda till att vassa fragment projiceras.

Garanti

På Cytion står vi bakom våra produkters kvalitet och livskraft.
Vi garanterar att våra celler är livsdugliga vid odlingens början i 60 dagar efter leverans från våra anläggningar.
Vi försäkrar att allt material överensstämmer med de specifikationer som beskrivs i analyscertifikatet och/eller produktbladet
För fullständig information, se vår <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantiförklaring

Avtal om materialöverföring krävs	Yes