LNCaP rakud

300265

LNCaP-rakud, mis on saadud eesnäärmevähi patsiendi lümfisõlme metastaatilisest kahjustusest, on eesnäärmevähi uurimisel kriitiline vahend, eriti androgeenide ja androgeeni retseptori (AR) dünaamika rolli uurimiseks vähi progresseerumisel. LNCaP rakuliini iseloomustab androgeenitundlik kasv ja see annab ülevaate mehhanismidest, mis on aluseks eesnäärmevähi reaktsioonile hormonaalsele manipuleerimisele.

Metastaatilise eesnäärmevähi mudelina pakuvad LNCaP vanemrakud ja nende alamliinid, nagu LNCaP kloon FGC, kliiniliselt asjakohast teavet haiguse progresseerumise kohta, eriti seoses metastaaside tekkimisega luudesse, moodustades osteoblastilisi kahjustusi, mis sarnanevad inimese eesnäärmevähi puhul täheldatud kahjustustega.

Inimese eesnäärmevähi LNCaP rakuliin ekspresseerib AR-geeni mutatsioonivormi, millel on laiem steroidide sidumise spetsiifilisus, ja seetõttu on see AR-aktiivsuse ja eesnäärmevähi progresseerumise vahelise keerulise koostoime mõistmisel keskse tähtsusega. See hõlmab AR-i allavoolu sihtmärkide, nagu PSA ja NKx3.1, uurimist, mis on olulised eesnäärme epiteelirakkude toimimiseks. LNCaP rakke kasutatakse ka tsütotoksilisuse uuringutes, näiteks ripl'i poolt indutseeritud uuringutes või selliste ühendite nagu amügdaliin potentsiaalsete terapeutiliste mõjude uurimisel rakusiseste ravimite manustamisstrateegiate raames.

Kokkuvõttes on inimese eesnäärmekartsinoomi rakuliin LNCaP nurgakivi androgeenide rolli mõistmisel vähi progresseerumises ja eesnäärmevähis, pakkudes teadmisi hormoonidele reageerivate vähivormide, resistentse eesnäärmevähi probleemide ja terapeutiliste sekkumiste võimaluste kohta. LNCaP rakuliini peetakse DU145 ja PC3 rakkude kõrval üheks klassikaliseks ja kõige laialdasemalt kasutatavaks inimese eesnäärmevähi rakuliiniks.

ÜLDINE TEAVE

Kirjeldus

LNCaP-rakud, mis on saadud eesnäärmevähi patsiendi lümfisõlme metastaatilisest kahjustusest, on eesnäärmevähi uurimisel kriitiline vahend, eriti androgeenide ja androgeeni retseptori (AR) dünaamika rolli uurimiseks vähi progresseerumisel. LNCaP rakuliini iseloomustab androgeenitundlik kasv ja see annab ülevaate mehhanismidest, mis on aluseks eesnäärmevähi reaktsioonile hormonaalsele manipuleerimisele.

Metastaatilise eesnäärmevähi mudelina pakuvad LNCaP vanemrakud ja nende alamliinid, nagu LNCaP kloon FGC, kliiniliselt asjakohast teavet haiguse progresseerumise kohta, eriti seoses metastaaside tekkimisega luudesse, moodustades osteoblastilisi kahjustusi, mis sarnanevad inimese eesnäärmevähi puhul täheldatud kahjustustega.

Inimese eesnäärmevähi LNCaP rakuliin ekspresseerib AR-geeni mutatsioonivormi, millel on laiem steroidide sidumise spetsiifilisus, ja seetõttu on see AR-aktiivsuse ja eesnäärmevähi progresseerumise vahelise keerulise koostoime mõistmisel keskse tähtsusega. See hõlmab AR-i allavoolu sihtmärkide, nagu PSA ja NKx3.1, uurimist, mis on olulised eesnäärme epiteelirakkude toimimiseks. LNCaP rakke kasutatakse ka tsütotoksilisuse uuringutes, näiteks ripl'i poolt indutseeritud uuringutes või selliste ühendite nagu amügdaliin potentsiaalsete terapeutiliste mõjude uurimisel rakusiseste ravimite manustamisstrateegiate raames.

Kokkuvõttes on inimese eesnäärmekartsinoomi rakuliin LNCaP nurgakivi androgeenide rolli mõistmisel vähi progresseerumises ja eesnäärmevähis, pakkudes teadmisi hormoonidele reageerivate vähivormide, resistentse eesnäärmevähi probleemide ja terapeutiliste sekkumiste võimaluste kohta. LNCaP rakuliini peetakse DU145 ja PC3 rakkude kõrval üheks klassikaliseks ja kõige laialdasemalt kasutatavaks inimese eesnäärmevähi rakuliiniks.

Kude	Eesnäärme
Haigus	Kartsinoom
Metastaaside asukoht	Vasakpoolne supraklavikulaarne lümfisõlm

Sünonüümid

- LNCAP
- LNCap
- Ln-Cap
- Lymph Node Carcinoma of the prostate

KLASSIFIKATSIOON

Organism	Inimene

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Sugu	Mees
Kasvuvõime	Järgija
Bioloogilise ohutuse tase	1

OMADUSED

Morfoloogia	Epiteelilaadsed
Tuumorigeenne	Jah, alasti hiirtel

Karyotüüp

Pseudodiploidne isasloom, seitse markerkromosoomi, modaalne arv = 46, vahemik = 33 kuni 91

Kahekordistumisaeg	60 tundi

TUNNUSED

Viide

LNCaP (Cytioni kataloginumber 300265)

NCBI maksukood	9606
Cellosaurus	CVCL_0395

AVALDUMINE JA VASTUVÕTLIKKUS

Ekspresseeritud retseptorid

Androgeen, östrogeen

Valgu ekspressioon

P53 positiivne

Tooted

Inimese eesnäärme happeline fosfataas, eesnäärme spetsiifiline antigeen

KÄSITLEMINE JA KASVATAMINE

Kasvatuskeskkond

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabiilne glutamiin, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytioni artikli number 820700a)

Inkubatsiooni keskkond	37°C, 5%CO2, niisutatud atmosfäär.

Toidulisandid

Täiendatakse keskkonda kuumuseliselt inaktiveeritud 10% FBS-iga

Dissotsiatsioonireaktiiv	Accutase

Kultuuri edasikasvatamine

Eemaldage kleepunud rakkudelt vana söötme ja peske neid PBS-ga, milles puudub kaltsium ja magneesium. T25 kolbide puhul kasutage 3-5 ml PBS-i ja T75 kolbide puhul 5-10 ml. Seejärel katke rakud täielikult Accutase'iga, kasutades 1-2 ml T25 kolbide puhul ja 2,5 ml T75 kolbide puhul. Laske rakkudel inkubeerida 8-10 minutit toatemperatuuril, et need eralduksid. Pärast inkubeerimist segage rakud ettevaatlikult 10 ml söötmega, et neid resuspenseerida, seejärel tsentrifuugige 3 minutit 300xg juures. Visake supernatant ära, suspenseerige rakud uuesti värskes keskkonnas ja viige need uutesse kolvidesse, mis sisaldavad juba värsket keskkonda.

Külvitihedus	1 kuni 2 x 10^4 rakku/cm^2
Vedeliku vahetus	Iga 3 päeva tagant

Taastumine pärast sulamist	Pärast sulatamist asetage rakud plaadile tihedusega 5 x 10^4 rakku/cm^2 ja laske rakkudel külmutamisprotsessist taastuda ja kinnituda vähemalt 24 tunni jooksul.

Sulatamine ja kasvatamine

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITEEDIKONTROLL JA KRÜOKONSERVEERIMINE

Viljatus

Mükoplasmakontaminatsioon on välistatud nii PCR-põhiste analüüside kui ka luminestsentsil põhinevate mükoplasma tuvastamise meetodite abil.
Bakteriaalse, seene- või pärmsaaste puudumise tagamiseks kontrollitakse rakukultuure iga päev visuaalselt.

Külmutuskeskkond	Krüosäilitusvedelikusena kasutame täielikku kasvukeskkonda (sh FBS) + 10% DMSO, et tagada piisav elujõulisus pärast sulatamist, või CM-1 (Cytioni kataloginumber 800100), mis sisaldab optimeeritud osmoprotektante ja metaboolseid stabilisaatoreid, et parandada taastumist ja vähendada krüostressi.

Säilitamistingimused

Pikaajaliseks säilitamiseks asetage viaalid aurufaasis vedela lämmastikuga umbes -150 kuni -196 °C juures. Säilitamine temperatuuril -80 °C on vastuvõetav ainult lühikese vaheetapina enne vedela lämmastikuga üleviimist.

Tarne- ja kohaletoimetamistingimused

Krüokonserveeritud rakuliinid transporditakse kuiva jääga valideeritud, isoleeritud pakendis, milles on piisavalt külmutusainet, et säilitada kogu transpordi jooksul ligikaudu -78 °C. Vastuvõtmisel kontrollige konteinerit kohe ja viige viaalid viivitamatult sobivasse hoiuruumi.

ANNETAJA

Doonori vanus	50 aastat
Etniline kuuluvus	Kaukaasia

ÕIGUSLIKUD JA OHUTUSALASED KÜSIMUSED

Ohutusnõuded

Kui plaanitakse krüoviaalide säilitamist vedelas lämmastikus tulevase sulatamise eesmärgil, on kohustuslik järgida rangeid ohutusmeetmeid. Asjakohased kaitsekindad ja -riietus on hädavajalikud ning külmutatud proovide vedela lämmastiku mahutisse või mahutist väljaviimisel tuleb kasutada näomaski või kaitseprille. See on vajalik selleks, et vähendada vigastuste ohtu, mis tuleneb võimalikest krüoviaalide plahvatustest eemaldamisel, mille tagajärjel võivad välja paiskuda teravad killud.

Garantii

Cytion seisab oma toodete kvaliteedi ja elujõulisuse eest.
Me garanteerime, et meie rakud on elujõulised kasvatamise alguses 60 päeva jooksul pärast meie rajatistest saatmist.
Tagame, et kõik materjalid vastavad analüüsisertifikaadis ja/või tootelehel kirjeldatud spetsifikatsioonidele
Täielikke üksikasju leiate meie <a href="""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang="""x-default"">Tagatise avaldusest

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Vajalik on materjalide üleandmise leping	Yes