"LoVo" ląstelių linija

300266

LOVO ląstelių linijai, gautai iš IV laipsnio Dukes C tipo gaubtinės žarnos adenokarcinomos, būdingos adenomatozinės polipozės Coli (APC) geno, Kirsteno žiurkių sarkomos viruso onkogeno homologo (KRAS) ir navikinio baltymo p53 (TP53) mutacijos. Šios genetinės savybės yra labai svarbios tiriant storosios žarnos vėžio progresavimo, metastazių ir atsparumo vaistams mechanizmų molekulinius pagrindus.
LoVo ląstelės yra labai svarbus priešvėžinių junginių atrankos modelis, o suprasdami, kaip vėžio ląstelės, tokios kaip LoVo, įgyja atsparumą, mokslininkai gali sukurti veiksmingesnius gydymo būdus. LoVo ląstelės taip pat naudojamos molekulinės biologijos tyrimuose, siekiant ištirti signalinius kelius, reguliuojančius vėžio ląstelių augimą, išlikimą ir metastazavimą.
Žmogaus storosios žarnos vėžio ir storosios žarnos vėžio ląstelių linijų kontekste "LoVo" ląstelės leidžia suprasti naviko augimo mechanizmus ir metastazių, ypač mazgų metastazių, procesą bei vėžio mikroaplinką, lemiančią vėžio progresavimą. LoVo storosios žarnos vėžio ląstelių naudojimas, ypač lovo ksenograftų modeliuose, leidžia mokslininkams tirti vėžio ląstelių dinamiką ir metastazavimo potencialą.
Nuodugnus sekos nustatymas ir genų raiškos analizė LoVo ląstelėse atskleidė specifinius genus ir jų vaidmenį storosios žarnos vėžio ląstelėse. Šie tyrimai išryškino integrinų, tokių kaip integrinas β1, svarbą vėžio ląstelių migracijai ir invazijai bei pagrindinių molekulių, tokių kaip MMP2, reguliavimą signaliniuose keliuose, padedančiuose suprasti vėžio ląstelių linijų invazines savybes.
LoVo ląstelės, kaip storosios žarnos vėžio ląstelių linijų modelinė sistema, vaidina svarbų vaidmenį gerinant mūsų supratimą apie molekulinius vėžio aspektus, pradedant genų ir baltymų raiška ir baigiant naviko augimo ir metastazių subtilybėmis.

BENDRA INFORMACIJA

Aprašymas

LOVO ląstelių linijai, gautai iš IV laipsnio Dukes C tipo gaubtinės žarnos adenokarcinomos, būdingos adenomatozinės polipozės Coli (APC) geno, Kirsteno žiurkių sarkomos viruso onkogeno homologo (KRAS) ir navikinio baltymo p53 (TP53) mutacijos. Šios genetinės savybės yra labai svarbios tiriant storosios žarnos vėžio progresavimo, metastazių ir atsparumo vaistams mechanizmų molekulinius pagrindus.
LoVo ląstelės yra labai svarbus priešvėžinių junginių atrankos modelis, o suprasdami, kaip vėžio ląstelės, tokios kaip LoVo, įgyja atsparumą, mokslininkai gali sukurti veiksmingesnius gydymo būdus. LoVo ląstelės taip pat naudojamos molekulinės biologijos tyrimuose, siekiant ištirti signalinius kelius, reguliuojančius vėžio ląstelių augimą, išlikimą ir metastazavimą.
Žmogaus storosios žarnos vėžio ir storosios žarnos vėžio ląstelių linijų kontekste "LoVo" ląstelės leidžia suprasti naviko augimo mechanizmus ir metastazių, ypač mazgų metastazių, procesą bei vėžio mikroaplinką, lemiančią vėžio progresavimą. LoVo storosios žarnos vėžio ląstelių naudojimas, ypač lovo ksenograftų modeliuose, leidžia mokslininkams tirti vėžio ląstelių dinamiką ir metastazavimo potencialą.
Nuodugnus sekos nustatymas ir genų raiškos analizė LoVo ląstelėse atskleidė specifinius genus ir jų vaidmenį storosios žarnos vėžio ląstelėse. Šie tyrimai išryškino integrinų, tokių kaip integrinas β1, svarbą vėžio ląstelių migracijai ir invazijai bei pagrindinių molekulių, tokių kaip MMP2, reguliavimą signaliniuose keliuose, padedančiuose suprasti vėžio ląstelių linijų invazines savybes.
LoVo ląstelės, kaip storosios žarnos vėžio ląstelių linijų modelinė sistema, vaidina svarbų vaidmenį gerinant mūsų supratimą apie molekulinius vėžio aspektus, pradedant genų ir baltymų raiška ir baigiant naviko augimo ir metastazių subtilybėmis.

Audinys	Storoji žarna, IV laipsnio, Dukes'o C tipo
Liga	Adenokarcinoma
Metastazių vieta	Kairysis viršraktikaulinis limfmazgis

Sinonimai

- LOVO

KLASIFIKACIJA

Organizmas	Žmogus
Seksas	Vyras
Augimo savybės	Prisijungęs
Biologinio saugumo lygis	1

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

CHARAKTERISTIKOS

Morfologija	Į epitelį panašus
Tumorogeninis	Taip, su nuogomis pelėmis

IDENTIFIKATORIAI

Nuoroda

LoVo (Cytion katalogo numeris 300266)

NCBI mokesčių identifikavimo kodas	9606
Cellosaurus	CVCL_0399

IŠRAIŠKA IR JAUTRUMAS

Antigeno ekspresija

HLA A11, B15, B17, Cw1, Cw3, B kraujo grupė

Izofermentai

G6PD, B, PGM1, 2, PGM3, 1-2, 6PGD, A, ES-D, 1

Onkogenai

Myc +, myb + , ras +, fos +, p53 +, sis -, abl -, ros -, src -

Mutacijų profilis

LOVO ląstelės turi Kras geno 13 kodono mutaciją: GGC(Wt Gly) >GAC(Asp)

Atvirkštinė transkriptazė	Neigiamas

Produktai

Karcinoembrioninis antigenas (CEA) 908 ng/106 ląstelių/10 dienų

LAIKYMAS IR AUGINIMAS

Maitinamoji terpė

Ham's F12K terpė, w: 2,0 mM L-Glutaminas, w: 2,0 mM natrio piruvatas, w: 2,5 g/L NaHCO3 (Cytion gaminio numeris 820608a)

Inkubacijos aplinka	37 °C, 5 %CO2, drėkintoje atmosferoje.

Maisto papildai

Papildykite terpę 10 % FBS

Disociacijos reagentas	Accutase

Subkultūrinis auginimas

Pašalinkite seną terpę nuo prilipusių ląstelių ir nuplaukite jas PBS, kuriame nėra kalcio ir magnio. T25 kolboms naudokite 3-5 ml PBS, o T75 kolboms - 5-10 ml. Tuomet visiškai užpilkite ląsteles "Accutase", naudodami 1-2 ml T25 kolboms ir 2,5 ml T75 kolboms. Leiskite ląstelėms inkubuotis kambario temperatūroje 8-10 minučių, kad jos atsiskirtų. Po inkubacijos atsargiai sumaišykite ląsteles su 10 ml terpės, kad jos vėl suspenduotų, tada 3 minutes centrifuguokite 300xg greičiu. Išmeskite supernatantą, vėl sutirpinkite ląsteles šviežioje terpėje ir perkelkite jas į naujas kolbas, kuriose jau yra šviežia terpė.

Sėjos tankis	1 x 10^4 ląstelės/cm^2
Skysčių atnaujinimas	2-3 kartus per savaitę
Atkūrimas po atšilimo	Atšildžius, išdėliokite ląsteles 5 x 10^4 ląstelių/cm^2 tankumu ir leiskite ląstelėms atsigauti po užšaldymo proceso ir prisitvirtinti bent 24 valandas.

Atšildymas ir auginimas

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KOKYBĖS KONTROLĖ IR KRIOKONSERVAVIMAS

Sterilumas

Mikoplazmos užterštumas atmetamas taikant PGR pagrįstus tyrimus ir liuminescencinius mikoplazmos aptikimo metodus.
Siekiant užtikrinti, kad nebūtų užteršimo bakterijomis, grybeliais ar mielėmis, ląstelių kultūros kasdien vizualiai tikrinamos.

Šaldymo terpė	Kaip kriokonservavimo terpę naudojame visišką augimo terpę (įskaitant FBS) + 10 % DMSO, kad būtų užtikrintas tinkamas gyvybingumas po atšildymo, arba CM-1 (Cytion katalogo numeris 800100), kurioje yra optimizuotų osmoprotektorių ir medžiagų apykaitos stabilizatorių, kad būtų pagerintas atsigavimas ir sumažintas kriokonservavimo sukeltas stresas.

Laikymo sąlygos

Norėdami ilgai saugoti, įdėkite buteliukus į garų fazės skystą azotą maždaug -150-196 °C temperatūroje. Laikymas -80 °C temperatūroje yra priimtinas tik kaip trumpas tarpinis etapas prieš perkeliant į skystąjį azotą.

Pristatymo sąlygos

Kriokonservuotos ląstelių linijos gabenamos ant sauso ledo patvirtintoje, izoliuotoje pakuotėje su pakankamu kiekiu šaldymo skysčio, kad pervežimo metu būtų palaikoma maždaug -78 °C temperatūra. Gavę pakuotę, nedelsdami ją apžiūrėkite ir nedelsdami perkelkite mėgintuvėlius į tinkamą saugyklą.

DONORAS

Donoro amžius	56 metai

TEISINIAI IR SAUGOS KLAUSIMAI

Saugos priemonės

Planuojant saugoti kriovaistinę skystame azote, kad ateityje ją būtų galima atšildyti, būtina laikytis griežtų saugos priemonių. Būtina mūvėti tinkamas apsaugines pirštines ir drabužius, o perkeliant užšaldytus mėginius į skystojo azoto talpyklą arba iš jos būtina naudoti veido kaukę arba apsauginius akinius. Taip siekiama sumažinti sužeidimų riziką dėl galimo kriokomponentų sprogimo išėmimo metu, kai gali išsiveržti aštrūs fragmentai.

Garantija

" Cytion" garantuoja savo produktų kokybę ir gyvybingumą.
Garantuojame, kad mūsų ląstelės bus gyvybingos kultūrų auginimo pradžioje 60 dienų po išsiuntimo iš mūsų gamyklos.
Užtikriname, kad visos medžiagos atitinka analizės sertifikate ir (arba) gaminio lape aprašytas specifikacijas
Išsamią informaciją rasite mūsų <a href=""/Kas mes esame/garantijos/" hreflang=""x-default"">Garantijos pareiškime

Reikalinga medžiagų perdavimo sutartis	Yes