LoVo-cellelinjen

300266

LOVO-cellelinjen, som stammer fra et grad IV Dukes' type C tykktarmskreftadenokarsinom, er karakterisert av mutasjoner i APC-genet (adenomatøs polyposis coli), KRAS (Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog) og TP53 (tumorprotein p53). Disse genetiske egenskapene er viktige for å studere det molekylære grunnlaget for progresjon, metastasering og resistensmekanismer ved kolorektal kreft. LoVo-celler er en viktig modell for screening av kreftmedisiner, og ved å forstå hvordan kreftceller som LoVo utvikler resistens, kan forskerne utvikle mer effektive behandlingsmetoder. LoVo-celler brukes også i molekylærbiologiske studier for å utforske signalveier som regulerer kreftcellers vekst, overlevelse og metastasering.

Når det gjelder cellelinjer for tykktarmskreft og kolorektal kreft hos mennesker, gir LoVo-celler innsikt i mekanismene for tumorvekst og metastasering, særlig knutepunktsmetastase, og mikromiljøet i svulsten som driver kreftutviklingen. Bruken av LoVo-tykktarmskreftceller, spesielt i lovo-xenograftmodeller, gjør det mulig for forskere å studere kreftcelledynamikk og metastatisk potensial.

Dypsekvensering og genuttrykksanalyse i LoVo-celler har kastet lys over de spesifikke genene og deres roller i kolorektale kreftceller. Denne forskningen har belyst betydningen av integriner, som integrin β1, for kreftcellenes migrasjon og invasjon, og reguleringen av nøkkelmolekyler som MMP2 i signalveier som bidrar til forståelsen av kreftcellelinjenes invasive egenskaper.

LoVo-celler, som et modellsystem for cellelinjer for kolorektal kreft, spiller en sentral rolle i vår forståelse av de molekylære aspektene ved kreft, fra gen- og proteinuttrykk til komplikasjonene ved tumorvekst og metastase.

GENERELL INFORMASJON

Beskrivelse

LOVO-cellelinjen, som stammer fra et grad IV Dukes' type C tykktarmskreftadenokarsinom, er karakterisert av mutasjoner i APC-genet (adenomatøs polyposis coli), KRAS (Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog) og TP53 (tumorprotein p53). Disse genetiske egenskapene er viktige for å studere det molekylære grunnlaget for progresjon, metastasering og resistensmekanismer ved kolorektal kreft. LoVo-celler er en viktig modell for screening av kreftmedisiner, og ved å forstå hvordan kreftceller som LoVo utvikler resistens, kan forskerne utvikle mer effektive behandlingsmetoder. LoVo-celler brukes også i molekylærbiologiske studier for å utforske signalveier som regulerer kreftcellers vekst, overlevelse og metastasering.

Når det gjelder cellelinjer for tykktarmskreft og kolorektal kreft hos mennesker, gir LoVo-celler innsikt i mekanismene for tumorvekst og metastasering, særlig knutepunktsmetastase, og mikromiljøet i svulsten som driver kreftutviklingen. Bruken av LoVo-tykktarmskreftceller, spesielt i lovo-xenograftmodeller, gjør det mulig for forskere å studere kreftcelledynamikk og metastatisk potensial.

Dypsekvensering og genuttrykksanalyse i LoVo-celler har kastet lys over de spesifikke genene og deres roller i kolorektale kreftceller. Denne forskningen har belyst betydningen av integriner, som integrin β1, for kreftcellenes migrasjon og invasjon, og reguleringen av nøkkelmolekyler som MMP2 i signalveier som bidrar til forståelsen av kreftcellelinjenes invasive egenskaper.

LoVo-celler, som et modellsystem for cellelinjer for kolorektal kreft, spiller en sentral rolle i vår forståelse av de molekylære aspektene ved kreft, fra gen- og proteinuttrykk til komplikasjonene ved tumorvekst og metastase.

Vev	Tykktarm, grad IV, Dukes' type C
Sykdom	Adenokarsinom
Metastaseområde	Venstre supraklavikulære lymfeknute

Synonymer

- LOVO

KLASSIFISERING

Organisme	Menneske
Sex	Mann
Vekstegenskaper	Tilhenger
Biosikkerhetsnivå	1

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

EGENSKAPER

Morfologi	Epitel-lignende
Tumorinduserende	Ja, i nakne mus

IDENTIFIKATORER

Kildehenvisning

LoVo (Cytion katalognummer 300266)

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_0399

UTTRYKK OG MOTTAKELIGHET

Antigenuttrykk

HLA A11, B15, B17, Cw1, Cw3, blodtype B

Isoenzymer

G6PD, B, PGM1, 2, PGM3, 1-2, 6PGD, A, ES-D, 1

Onkogener

Myc +, myb +, ras +, fos +, p53 +, sis -, abl -, ros -, src -

Mutasjonsprofil

LOVO-celler har en mutasjon i kodon 13 i Kras-genet: GGC(Wt Gly) >GAC(Asp)

Revers transkriptase	Negativ

Produkter

Karsinoembryonalt antigen (CEA) 908 ng/106 celler/10 dager

HÅNDTERING OG KULTUR

Næringsmedium

Ham's F12K Medium, m: 2,0 mM L-Glutamin, m: 2,0 mM Natriumpyruvat, m: 2,5 g/L NaHCO3 (Cytion artikkelnummer 820608a)

Inkubasjonsatmosfære	37 °C, 5 %CO2, befuktet atmosfære.

Kosttilskudd

Suppler mediet med 10 % FBS

Dissosiasjonsmiddel	Accutase

Subkultivering

Fjern det gamle mediet fra de adherente cellene, og vask dem med PBS uten kalsium og magnesium. Bruk 3-5 ml PBS for T25-kolber og 5-10 ml for T75-kolber. Dekk deretter cellene helt med Accutase, med 1-2 ml for T25-kolber og 2,5 ml for T75-kolber. La cellene inkubere i romtemperatur i 8-10 minutter for å løsne dem. Etter inkubasjon blandes cellene forsiktig med 10 ml medium for å resuspendere dem, og sentrifuger deretter ved 300xg i 3 minutter. Kast supernatanten, resuspender cellene i nytt medium, og overfør dem til nye kolber som allerede inneholder nytt medium.

Såtetthet	1 x 10^4 celler/cm^2
Væskefornyelse	2 til 3 ganger per uke
Gjenoppretting etter tining	Etter tining, plasser cellene på 5 x 10^4 celler/cm^2 og la cellene komme seg etter fryseprosessen og feste seg i minst 24 timer.

Tining og dyrking

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROLL OG KRYOKONSERVERING

Sterilitet

Mykoplasma-kontaminering utelukkes ved hjelp av både PCR-baserte analyser og luminescensbaserte metoder for påvisning av mykoplasma.
For å sikre at det ikke finnes bakterie-, sopp- eller gjærkontaminering, blir cellekulturene inspisert visuelt hver dag.

Frysemedium	Som kryopreserveringsmedium bruker vi komplett vekstmedium (inkludert FBS) + 10 % DMSO for tilstrekkelig levedyktighet etter opptining, eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som inneholder optimaliserte osmobeskyttende midler og metabolske stabilisatorer for å øke utvinningen og redusere kryoindusert stress.

Oppbevaringsbetingelser

For langtidsoppbevaring plasseres hetteglassene i flytende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Lagring ved -80 °C er kun akseptabelt som et kort mellomtrinn før overføring til flytende nitrogen.

Fraktvilkår

Kryopreserverte cellelinjer sendes på tørris i validert, isolert emballasje med tilstrekkelig kjølemiddel til å opprettholde en temperatur på ca. -78 °C under hele transporten. Ved mottak skal beholderen inspiseres umiddelbart, og hetteglassene skal straks overføres til egnet lagringsplass.

DONOR

Donorens alder	56 år

JURIDISK OG SIKKERHET

Sikkerhetsregler

Når du planlegger å oppbevare et kryovial i flytende nitrogen for senere tining, er det obligatorisk å følge strenge sikkerhetstiltak. Det er viktig å bruke egnede vernehansker og -klær, og det er påbudt å bruke ansiktsmaske eller vernebriller under overføring av frosne prøver til eller fra tanken med flytende nitrogen. Dette er for å redusere risikoen for skader som følge av potensielle kryovæskeeksplosjoner ved fjerning, noe som kan føre til at skarpe fragmenter slynges ut.

Garanti

Hos Cytion står vi bak kvaliteten og levedyktigheten til produktene våre.
Vi garanterer at cellene våre vil være levedyktige ved starten av dyrkingen i 60 dager etter at de er sendt fra våre anlegg.
Vi forsikrer at alle materialer er i samsvar med spesifikasjonene som er beskrevet i analysesertifikatet og/eller produktarket
For fullstendig informasjon, se vår <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantierklæring

Avtale om materialoverføring kreves	Yes