Κύτταρα LXF-289

300269

Η κυτταρική σειρά LxF-289 είναι μια ανθρώπινη κυτταρική σειρά αδενοκαρκινώματος του πνεύμονα που δημιουργήθηκε από έναν άνδρα ασθενή 63 ετών. Αυτή η κυτταρική σειρά έχει χρόνο διπλασιασμού περίπου 50 ώρες, γεγονός που την καθιστά κατάλληλη για μελέτες που απαιτούν σταθερό κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Η LxF-289 είναι ιδιαίτερα πολύτιμη στην έρευνα που επικεντρώνεται στον καρκίνο του πνεύμονα, ιδίως στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC), καθώς παρέχει ένα ισχυρό in vitro μοντέλο για τη μελέτη των μοριακών μηχανισμών που διέπουν την εξέλιξη του καρκίνου, την ανθεκτικότητα στη θεραπεία και τις επιδράσεις των θεραπευτικών παρεμβάσεων.

Μελέτες στην LxF-289 έχουν καταδείξει ότι αυτή η κυτταρική σειρά παρουσιάζει χαρακτηριστικά που την καθιστούν ευαίσθητη σε συγκεκριμένους γενετικούς και θεραπευτικούς χειρισμούς. Για παράδειγμα, η έρευνα έδειξε ότι η LxF-289, μαζί με άλλες κυτταρικές σειρές καρκίνου του πνεύμονα, μπορεί να υποστεί σημαντικό κυτταρικό θάνατο όταν αντιμετωπίζεται με αδενοϊό που εκφράζει αντισηπτική πρωτεΐνη θερμικού σοκ 70 (Hsp70). Αυτός ο κυτταρικός θάνατος είναι ανεξάρτητος από την p53 και δεν απαιτεί διάσπαση του DNA, γεγονός που υποδηλώνει ότι η Hsp70 διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην επιβίωση των καρκινικών κυττάρων του πνεύμονα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόκριση αυτή είναι επιλεκτική για τα καρκινικά κύτταρα, καθώς οι φυσιολογικοί ινοβλάστες του πνεύμονα και τα βρογχικά επιθηλιακά κύτταρα δεν εμφανίζουν παρόμοια επίπεδα κυτταροτοξικότητας όταν η Hsp70 ρυθμίζεται προς τα κάτω, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα στόχευσης της Hsp70 στη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα.

Επιπλέον, το LxF-289 έχει χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη των επιδράσεων της ακτινοβολίας στις πρωτεΐνες που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα στα φάρμακα. Η κυτταρική σειρά παρουσίασε υπερέκφραση της τρανσφεράσης της γλουταθειόνης S (GSTπ) τόσο σε επίπεδο mRNA όσο και σε επίπεδο πρωτεΐνης μετά από ακτινοβόληση. Αυτή η υπερέκφραση σχετίζεται με την ανάπτυξη πολυφαρμακευτικής αντοχής, η οποία αποτελεί σημαντική πρόκληση στην κλινική αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα. Τα ευρήματα αυτά υπογραμμίζουν τη χρησιμότητα του LxF-289 στη διερεύνηση των μηχανισμών αντίστασης και στη δοκιμή νέων στρατηγικών για την αντιμετώπισή της.

ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Περιγραφή

Η κυτταρική σειρά LxF-289 είναι μια ανθρώπινη κυτταρική σειρά αδενοκαρκινώματος του πνεύμονα που δημιουργήθηκε από έναν άνδρα ασθενή 63 ετών. Αυτή η κυτταρική σειρά έχει χρόνο διπλασιασμού περίπου 50 ώρες, γεγονός που την καθιστά κατάλληλη για μελέτες που απαιτούν σταθερό κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Η LxF-289 είναι ιδιαίτερα πολύτιμη στην έρευνα που επικεντρώνεται στον καρκίνο του πνεύμονα, ιδίως στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC), καθώς παρέχει ένα ισχυρό in vitro μοντέλο για τη μελέτη των μοριακών μηχανισμών που διέπουν την εξέλιξη του καρκίνου, την ανθεκτικότητα στη θεραπεία και τις επιδράσεις των θεραπευτικών παρεμβάσεων.

Μελέτες στην LxF-289 έχουν καταδείξει ότι αυτή η κυτταρική σειρά παρουσιάζει χαρακτηριστικά που την καθιστούν ευαίσθητη σε συγκεκριμένους γενετικούς και θεραπευτικούς χειρισμούς. Για παράδειγμα, η έρευνα έδειξε ότι η LxF-289, μαζί με άλλες κυτταρικές σειρές καρκίνου του πνεύμονα, μπορεί να υποστεί σημαντικό κυτταρικό θάνατο όταν αντιμετωπίζεται με αδενοϊό που εκφράζει αντισηπτική πρωτεΐνη θερμικού σοκ 70 (Hsp70). Αυτός ο κυτταρικός θάνατος είναι ανεξάρτητος από την p53 και δεν απαιτεί διάσπαση του DNA, γεγονός που υποδηλώνει ότι η Hsp70 διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην επιβίωση των καρκινικών κυττάρων του πνεύμονα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόκριση αυτή είναι επιλεκτική για τα καρκινικά κύτταρα, καθώς οι φυσιολογικοί ινοβλάστες του πνεύμονα και τα βρογχικά επιθηλιακά κύτταρα δεν εμφανίζουν παρόμοια επίπεδα κυτταροτοξικότητας όταν η Hsp70 ρυθμίζεται προς τα κάτω, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα στόχευσης της Hsp70 στη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα.

Επιπλέον, το LxF-289 έχει χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη των επιδράσεων της ακτινοβολίας στις πρωτεΐνες που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα στα φάρμακα. Η κυτταρική σειρά παρουσίασε υπερέκφραση της τρανσφεράσης της γλουταθειόνης S (GSTπ) τόσο σε επίπεδο mRNA όσο και σε επίπεδο πρωτεΐνης μετά από ακτινοβόληση. Αυτή η υπερέκφραση σχετίζεται με την ανάπτυξη πολυφαρμακευτικής αντοχής, η οποία αποτελεί σημαντική πρόκληση στην κλινική αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα. Τα ευρήματα αυτά υπογραμμίζουν τη χρησιμότητα του LxF-289 στη διερεύνηση των μηχανισμών αντίστασης και στη δοκιμή νέων στρατηγικών για την αντιμετώπισή της.

Ιστός	Πνεύμονας
Ασθένεια	Αδενοκαρκίνωμα

Συνώνυμα

- LxF289
- LxF 289
- LxF 289L

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

ΤΑΞΙΝΌΜΗΣΗ

Οργανισμός	Άνθρωπος
Σεξ	Άνδρας
Ιδιότητες ανάπτυξης	Πιστός
Επίπεδο βιοασφάλειας	1

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Μορφολογία	Επιθηλιοειδής
Ογκογόνος	Ναι, σε γυμνά ποντίκια

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΆ

Παραπομπή

LxF-289 (αριθμός καταλόγου Cytion 300269)

Αριθμός φορολογικού μητρώου NCBI	9606
Κελλοσαύρος	CVCL_1394

ΈΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑ

Αντίστροφη μεταγραφάση	Αρνητικό

ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΑ

Θρεπτικό μέσο

RPMI 1640, w: 2,0 mM σταθερής γλουταμίνης, w: 2,0 g/L NaHCO3 (αριθμός άρθρου Cytion 820700a)

Ατμόσφαιρα επώασης	37°C, 5%CO2, υγροποιημένη ατμόσφαιρα.

Συμπληρώματα

Συμπληρώστε το μέσο με 10% FBS

Αντιδραστήριο αποσύνδεσης	Accutase

Αναπαραγωγή σε υποκαλλιέργεια

Αφαιρέστε το παλιό μέσο από τα προσκολλημένα κύτταρα και πλύντε τα με PBS που δεν περιέχει ασβέστιο και μαγνήσιο. Για φιάλες T25, χρησιμοποιήστε 3-5 ml PBS και για φιάλες T75, χρησιμοποιήστε 5-10 ml. Στη συνέχεια, καλύψτε πλήρως τα κύτταρα με Accutase, χρησιμοποιώντας 1-2 ml για φιάλες T25 και 2,5 ml για φιάλες T75. Αφήστε τα κύτταρα να επωαστούν σε θερμοκρασία δωματίου για 8-10 λεπτά για να αποκολληθούν. Μετά την επώαση, αναμείξτε απαλά τα κύτταρα με 10 ml μέσου για να ανασυσταθούν και, στη συνέχεια, φυγοκεντρίστε στα 300xg για 3 λεπτά. Απορρίψτε το υπερκείμενο υγρό, ανασυστάστε τα κύτταρα σε φρέσκο μέσο και μεταφέρετέ τα σε νέες φιάλες που περιέχουν ήδη φρέσκο μέσο.

Πυκνότητα σποράς	1 x 10^4 κύτταρα/ml
Ανανέωση υγρών	Κάθε 3 έως 5 ημέρες
Ανάκαμψη μετά την απόψυξη	24 έως 48 ώρες

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Απόψυξη και καλλιέργεια

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΡΥΟΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

Στειρότητα

Η μόλυνση από μυκόπλασμα αποκλείεται με τη χρήση τόσο των δοκιμασιών που βασίζονται στην PCR όσο και των μεθόδων ανίχνευσης μυκοπλάσματος με βάση τη φωταύγεια.
Για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει μόλυνση από βακτήρια, μύκητες ή ζύμες, οι κυτταροκαλλιέργειες υποβάλλονται σε καθημερινές οπτικές επιθεωρήσεις.

Μέσο κατάψυξης	Ως μέσο κρυοσυντήρησης, χρησιμοποιούμε πλήρες μέσο ανάπτυξης (συμπεριλαμβανομένου του FBS) + 10% DMSO για επαρκή βιωσιμότητα μετά την απόψυξη, ή CM-1 (αριθμός καταλόγου Cytion 800100), το οποίο περιλαμβάνει βελτιστοποιημένα ωσμοπροστατευτικά και μεταβολικούς σταθεροποιητές για την ενίσχυση της ανάκαμψης και τη μείωση του στρες που προκαλείται από την κρυοσυντήρηση.

Συνθήκες αποθήκευσης

Για μακροχρόνια συντήρηση, τοποθετήστε τα φιαλίδια σε υγρό άζωτο σε φάση ατμών σε θερμοκρασία περίπου -150 έως -196 °C. Η αποθήκευση στους -80 °C είναι αποδεκτή μόνο ως σύντομο ενδιάμεσο βήμα πριν από τη μεταφορά σε υγρό άζωτο.

Όροι αποστολής

Οι κρυοσυντηρημένες κυτταρικές σειρές αποστέλλονται σε ξηρό πάγο σε επικυρωμένη, μονωμένη συσκευασία με επαρκές ψυκτικό μέσο για τη διατήρηση περίπου των -78 °C καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς. Κατά την παραλαβή, επιθεωρήστε αμέσως τον περιέκτη και μεταφέρετε τα φιαλίδια χωρίς καθυστέρηση στην κατάλληλη αποθήκη.

ΔΩΡΗΤΉΣ

Ηλικία δωρητή	62 χρόνια
Εθνικότητα	Καυκάσιος

ΝΟΜΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

Μέτρα ασφαλείας

Όταν σχεδιάζετε να αποθηκεύσετε ένα κρυοφιαλίδιο σε υγρό άζωτο για μελλοντική απόψυξη, είναι υποχρεωτικό να τηρείτε αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Τα κατάλληλα προστατευτικά γάντια και ο κατάλληλος προστατευτικός ρουχισμός είναι απαραίτητα, ενώ απαιτείται η χρήση μάσκας προσώπου ή γυαλιών ασφαλείας κατά τη μεταφορά κατεψυγμένων δειγμάτων προς ή από τη δεξαμενή υγρού αζώτου. Αυτό γίνεται για να μετριαστεί ο κίνδυνος τραυματισμού από πιθανές εκρήξεις κρυοσωλήνων κατά την απομάκρυνση, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην προβολή αιχμηρών θραυσμάτων.

Εγγύηση

Στην Cytion, υποστηρίζουμε την ποιότητα και τη βιωσιμότητα των προϊόντων μας.
Εγγυόμαστε ότι τα κύτταρά μας θα είναι βιώσιμα κατά την έναρξη της καλλιέργειας για 60 ημέρες μετά την αποστολή από τις εγκαταστάσεις μας.
Διαβεβαιώνουμε ότι όλα τα υλικά συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο Πιστοποιητικό Ανάλυσης ή/και στο Φύλλο Προϊόντος
Για πλήρεις λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"">Δήλωση εγγύησης

Απαιτείται συμφωνία μεταφοράς υλικού	Yes