خلايا HK-ZFN-ZFN-AURKB-mEGFP/ZFN-INCENP-mCherry

300270

يعتبر خط خلايا HK-ZFN-AURKB-mEGFP/ZFN-INCENP-mCherry، المشتق من خلايا هيلا كيوتو، نموذجاً متخصصاً يستخدم في أبحاث البيولوجيا الخلوية. وقد تمت هندسته وراثياً للتعبير عن أورورا كيناز ب (AURKB) الموسوم بالبروتين الفلوري الأخضر المعزز الأحادي الموحّد (mEGFFP) وبروتين السنترومير الداخلي (INCENP) الموسوم بـ mCherry. تمكن هذه التعديلات الباحثين من تتبع ديناميكيات وتفاعلات هذه البروتينات أثناء انقسام الخلية. ويُعدّ بروتين أورورا ب كيناز ضرورياً لفصل الكروموسومات والانقسام الخلوي، في حين أن بروتين إنسينب هو عنصر حاسم في مجمع الكروموسومات الناقل (CPC)، الذي ينسق التقدم الانقسامي، وهو ما يتيح للباحثين تتبع ديناميكيات هذه البروتينات أثناء الانقسام.

يوفر هذا الوسم الفلوري المزدوج أداة قوية لتصوير الخلايا الحية، مما يسمح بدراسة مفصلة لتوزيع البروتين أثناء دورة الخلية. ويُعد خط خلايا HK-ZFN-AURKB-mEGFP/ZFN-INCENP-mCherry ذا قيمة في البحث في التنظيم الانقسامي واستقرار الكروموسومات ونقطة التفتيش الانقسامي. تضمن دقة نوكليازات إصبع الزنك (ZFNs) المستخدمة في التعديلات الجينية دقة هذا النموذج، مما يجعله مثالياً للدراسات عالية الدقة في بيولوجيا السرطان والتطوير العلاجي.

معلومات عامة

الوصف

يعتبر خط خلايا HK-ZFN-AURKB-mEGFP/ZFN-INCENP-mCherry، المشتق من خلايا هيلا كيوتو، نموذجاً متخصصاً يستخدم في أبحاث البيولوجيا الخلوية. وقد تمت هندسته وراثياً للتعبير عن أورورا كيناز ب (AURKB) الموسوم بالبروتين الفلوري الأخضر المعزز الأحادي الموحّد (mEGFFP) وبروتين السنترومير الداخلي (INCENP) الموسوم بـ mCherry. تمكن هذه التعديلات الباحثين من تتبع ديناميكيات وتفاعلات هذه البروتينات أثناء انقسام الخلية. ويُعدّ بروتين أورورا ب كيناز ضرورياً لفصل الكروموسومات والانقسام الخلوي، في حين أن بروتين إنسينب هو عنصر حاسم في مجمع الكروموسومات الناقل (CPC)، الذي ينسق التقدم الانقسامي، وهو ما يتيح للباحثين تتبع ديناميكيات هذه البروتينات أثناء الانقسام.

يوفر هذا الوسم الفلوري المزدوج أداة قوية لتصوير الخلايا الحية، مما يسمح بدراسة مفصلة لتوزيع البروتين أثناء دورة الخلية. ويُعد خط خلايا HK-ZFN-AURKB-mEGFP/ZFN-INCENP-mCherry ذا قيمة في البحث في التنظيم الانقسامي واستقرار الكروموسومات ونقطة التفتيش الانقسامي. تضمن دقة نوكليازات إصبع الزنك (ZFNs) المستخدمة في التعديلات الجينية دقة هذا النموذج، مما يجعله مثالياً للدراسات عالية الدقة في بيولوجيا السرطان والتطوير العلاجي.

الأنسجة	باطن عنق الرحم
المرض	السرطان الغدي
موقع الانتشار	موقع الورم الأساسي (داخل عنق الرحم)

التطبيقات

بيولوجيا مركب «الراكب الكروموسومي» (CPC) وINCENP ثنائي؛ ديناميكيات كيناز أورورا ب؛ تتبع الفلوري الخلوي في الخلايا الحية؛ تصوير الانقسام اللون؛ فصل الكروموسومات؛ الانقسام الخلوي؛ نقطة تفتيش الانقسام؛ التحقق من صحة تعديل الجينوم باستخدام ZFN

المرادفات

- HK-ZFN-AURKB-mEGFP
- ZFN-INCENP-mCherry

التصنيف

كائن حي	إنسان
الجنس	أنثى
خصائص النمو	الملتزم
حالة الكائنات المعدلة وراثيًا	GMO-S1

تفاصيل حالة الكائنات المعدلة وراثيًا

GMO-S1: This HeLa Kyoto dual-color line contains ZFN-engineered AURKB-mEGFP and INCENP-mCherry constructs for chromosome passenger complex studies. This classification applies only within Germany and may differ elsewhere.

مستوى السلامة البيولوجية	1

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

الخصائص

المورفولوجيا	خلايا تشبه الخلايا الظهارية ذات الشكل الحجري الفسيفسائي
نوع الخلية	الخلايا الظهارية

المعرّفات

المرجع

HK-ZFN-ZFN-AURKB-mEGFP/ZFN-INCENP-mCherry (كتالوج سيتيون رقم 300270)

NCBI رقم التعريف الضريبي لدى	9606
سيلوصور	CVCL_VL14
المودع	مختبر إلينبرغ (EMBL)

التعبير والقابلية للإصابة

المنتجات

EGFP (بروتين الفلورسنت الأخضر المحسن)

التعامل مع النباتات وزراعتها

وسط الاستزراع

DMEM، ث: 3.7 جم/لتر جلوتامين، ث: 4 مليمتر جلوكوز، ث: 4.5 جم/لتر NaHCO3، ث: 1.0 مليمتر بيروفات الصوديوم (من سايتيون aرقم المادة 820300)

بيئة الحضانة	37 درجة مئوية، و5% من ثاني أكسيد الكربون في جو مرطب.

المكملات الغذائية

قم بتزويد الوسط ب 10٪ من ال FBS

كاشف التفكك	أكوتاس

إعادة الاستنبات

استخدم 3-5 مل من T25، الذي يفتقر إلى الكالسيوم والمغنيسيوم. بالنسبة لقوارير PBS قم بإزالة الوسط القديم من الخلايا الملتصقة واغسلها باستخدام PBS، وبالنسبة لقوارير T75، دع T75. و2.5 مل لقوارير T25 استخدم 5-10 مل. ثم، قم بتغطية الخلايا بالكامل باستخدام أكوتاز، باستخدام 1-2 مل لقوارير T75، الخلايا تحتضن في درجة حرارة الغرفة لمدة 8-10 دقائق لفصلها. بعد الحضانة، اخلط الخلايا برفق مع 10 مل من الوسط لإعادة ترسيبها، ثم اطردها مركزيًا بسرعة 300 xg لمدة 3 دقائق. تخلص من المادة الطافية، وأعد غمر الخلايا في وسط جديد وانقلها إلى قوارير جديدة تحتوي بالفعل على وسط جديد.

تجديد السوائل	إلى 3 مرات في الأسبوع 2

إذابة الثلج والزراعة

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

مراقبة الجودة والحفظ بالتبريد

العقم

وطرق الكشف عن الميكوبلازما القائمة على (PCR) يُستبعد التلوث بالميكوبلازما باستخدام كل من المقايسات القائمة على تفاعل البوليميراز المتسلسل التألق.
ولضمان عدم وجود تلوث بكتيري أو فطري أو خميرة يتم إخضاع مزارع الخلايا للفحص البصري اليومي.

وسط التجميد	من أجل الحفاظ DMSO 10% + (FBS بما في ذلك) كوسيط للحفظ بالتبريد، نستخدم وسط نمو كامل والذي يتضمن مواد حماية ،(رقم Cytion 800100 كتالوج) CM-1 على حيوية كافية بعد ذوبان الجليد أو أسموزموبيروتيكتية ومثبتات أيضية مُحسّنة لتعزيز التعافي وتقليل الإجهاد الناجم عن التبريد.

شروط التخزين

للحفظ طويل الأمد، ضع القوارير في نيتروجين سائل في طور البخار عند درجة حرارة تتراوح بين -150 و -196 درجة مئوية تقريباً. يُقبل التخزين عند درجة حرارة -80 درجة مئوية فقط كخطوة مؤقتة قصيرة قبل النقل إلى النيتروجين السائل.

شروط الشحن

تُشحن خطوط الخلايا المحفوظة بالتبريد على ثلج جاف في عبوات معزولة وموثوقة مع مبرد كافٍ للحفاظ على درجة حرارة -78 درجة مئوية تقريبًا طوال فترة النقل. عند الاستلام، افحص الحاوية على الفور وانقل القوارير دون تأخير إلى المخزن المناسب.

المانح

عمر المتبرع	30 سنة
الأصل العرقي	أمريكي من أصل أفريقي

الشؤون القانونية والسلامة

احتياطات السلامة

عند التخطيط لتخزين القارورة المبردة في النيتروجين السائل لإذابتها في المستقبل، من الضروري الالتزام بتدابير السلامة الصارمة. من الضروري ارتداء قفازات وملابس واقية مناسبة، كما يلزم استخدام قناع الوجه أو نظارات السلامة أثناء نقل العينات المجمدة من خزان النيتروجين السائل أو إليه. وذلك للتخفيف من خطر الإصابة من الانفجارات المحتملة للنيتروجين المبرد عند الإزالة، والتي يمكن أن تؤدي إلى قذف شظايا حادة.

الضمان

في Cytion، نلتزم في Cytion بجودة منتجاتنا وحيويتها.
نحن نضمن أن تكون خلايانا قابلة للحياة في بداية الاستزراع لمدة 60 يومًا بعد الشحن من منشآتنا.
نؤكد أن جميع المواد مطابقة للمواصفات الموضحة في شهادة التحليل و/أو ورقة المنتج
بيان الضمان<a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">للحصول على التفاصيل الكاملة، يُرجى الرجوع إلى

تسري اتفاقيات الأطراف الثالثة	Yes