Клетки HK-ZFN-AURKB-mEGFP/ZFN-INCENP-mCherry

300270

Клетъчната линия HK-ZFN-AURKB-mEGFP/ZFN-INCENP-mCherry, получена от клетките HeLa Kyoto, е специализиран модел, използван в изследванията в областта на клетъчната биология. Тя е генетично разработена да експресира киназа на Aurora B (AURKB), маркирана с мономерен подобрен зелен флуоресцентен протеин (mEGFP), и вътрешен центромерен протеин (INCENP), маркиран с mCherry. Тези модификации позволяват на изследователите да проследяват динамиката и взаимодействията на тези протеини по време на клетъчното делене. Киназата Aurora B е от съществено значение за сегрегацията на хромозомите и цитокинезата, докато INCENP е критичен компонент на комплекса Chromosomal Passenger Complex (CPC), координиращ митотичния прогрес.
Това двойно флуоресцентно маркиране осигурява мощен инструмент за изобразяване на живи клетки, позволяващ подробно изследване на разпределението на протеините по време на клетъчния цикъл. Клетъчната линия HK-ZFN-AURKB-mEGFP/ZFN-INCENP-mCherry е ценна за изследване на митотичната регулация, хромозомната стабилност и митотичната контролна точка. Прецизността на цинковите пръстови нуклеази (ZFN), използвани за генетични модификации, гарантира точността на този модел, което го прави идеален за високото качество на изследванията в областта на биологията на рака и терапевтичните разработки.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Описание

Клетъчната линия HK-ZFN-AURKB-mEGFP/ZFN-INCENP-mCherry, получена от клетките HeLa Kyoto, е специализиран модел, използван в изследванията в областта на клетъчната биология. Тя е генетично разработена да експресира киназа на Aurora B (AURKB), маркирана с мономерен подобрен зелен флуоресцентен протеин (mEGFP), и вътрешен центромерен протеин (INCENP), маркиран с mCherry. Тези модификации позволяват на изследователите да проследяват динамиката и взаимодействията на тези протеини по време на клетъчното делене. Киназата Aurora B е от съществено значение за сегрегацията на хромозомите и цитокинезата, докато INCENP е критичен компонент на комплекса Chromosomal Passenger Complex (CPC), координиращ митотичния прогрес.
Това двойно флуоресцентно маркиране осигурява мощен инструмент за изобразяване на живи клетки, позволяващ подробно изследване на разпределението на протеините по време на клетъчния цикъл. Клетъчната линия HK-ZFN-AURKB-mEGFP/ZFN-INCENP-mCherry е ценна за изследване на митотичната регулация, хромозомната стабилност и митотичната контролна точка. Прецизността на цинковите пръстови нуклеази (ZFN), използвани за генетични модификации, гарантира точността на този модел, което го прави идеален за високото качество на изследванията в областта на биологията на рака и терапевтичните разработки.

Тъкан	Ендоцервикс
Заболяване	Аденокарцином
Място на метастазите	Място на първичния тумор (ендоцервикс)

Приложения

Биология на хромозомния пассажерски комплекс (CPC); динамика на киназата Aurora B и INCENP; визуализация на митозата в живи клетки; двуцветно флуоресцентно проследяване; хромозомна сегрегация; цитокинеза; митотичен контролен пункт; валидиране на редактирането на генома чрез ZFN

Синоними

- HK-ZFN-AURKB-mEGFP
- ZFN-INCENP-mCherry

КЛАСИФИКАЦИЯ

Организъм	Човек
Секс	Женски
Свойства, свързани с растежа	Привърженик
Статус на ГМО	GMO-S1

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Подробности относно статуса на ГМО

GMO-S1: This HeLa Kyoto dual-color line contains ZFN-engineered AURKB-mEGFP and INCENP-mCherry constructs for chromosome passenger complex studies. This classification applies only within Germany and may differ elsewhere.

Ниво на биологична безопасност	1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Морфология	Епителиални клетки с форма на мозаечно камъче
Тип клетка	Епителни клетки

ИДЕНТИФИКАТОРИ

Източник

HK-ZFN-AURKB-mEGFP/ZFN-INCENP-mCherry (каталожен номер 300270 на Cytion)

Данъчен идентификационен номер в NCBI	9606
Целозавър	CVCL_VL14
Вложител	Лабораторията на Елънбърг (EMBL)

ПРОЯВА И ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНОСТ

Продукти

EGFP (подобрен зелен флуоресцентен протеин)

ОБРАБОТКА И ОТГЛЕЖДАНЕ

Хранителна среда

DMEM, w: 4,5 g/L глюкоза, w: 4 mM L-глутамин, w: 3,7 g/L NaHCO3, w: 1,0 mM натриев пируват (номер на изделието на Cytion 820300a)

Атмосфера за инкубация	37°C, 5%CO2, овлажнена атмосфера.

Добавки

Допълнете средата с 10% FBS

Реагент за дисоциация	Accutase

Пресаждане

Отстранете старата среда от адхезивните клетки и ги промийте с PBS, която не съдържа калций и магнезий. За колби T25 използвайте 3-5 ml PBS, а за колби T75 - 5-10 ml. След това покрийте клетките изцяло с Accutase, като използвате 1-2 ml за колби T25 и 2,5 ml за колби T75. Оставете клетките да се инкубират на стайна температура за 8-10 минути, за да се отделят. След инкубацията внимателно разбъркайте клетките с 10 ml среда, за да ги ресуспендирате, след което центрофугирайте при 300xg за 3 минути. Изхвърлете супернатантата, ресуспендирайте клетките в прясна среда и ги прехвърлете в нови колби, които вече съдържат прясна среда.

Обновяване на течността	2 до 3 пъти седмично

Размразяване и култивиране

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И КРИОКОНСЕРВАЦИЯ

Стерилност

Замърсяването с микоплазма се изключва както чрез PCR-базирани анализи, така и чрез луминесцентни методи за откриване на микоплазма.
За да се гарантира, че няма бактериално, гъбично или дрождево замърсяване, клетъчните култури се подлагат на ежедневни визуални проверки.

Среда за замразяване	Като среда за криоконсервация използваме пълна среда за растеж (включително FBS) + 10% DMSO за адекватна жизнеспособност след размразяване или CM-1 (каталожен номер 800100 на Cytion), която включва оптимизирани осмопротектори и метаболитни стабилизатори за подобряване на възстановяването и намаляване на криоиндуцирания стрес.

Условия за съхранение

За дълготрайно съхранение поставете флаконите в течен азот в парна фаза при температура около -150 до -196 °C. Съхранението при -80 °C е приемливо само като кратък междинен етап преди прехвърлянето в течен азот.

Условия за доставка

Криоконсервираните клетъчни линии се транспортират върху сух лед в утвърдени, изолирани опаковки с достатъчно хладилен агент, за да се поддържа приблизително -78 °C по време на транспортирането. При получаването незабавно прегледайте опаковката и незабавно прехвърлете флаконите за подходящо съхранение.

ДАРИТЕЛ

Възраст на донора	30 години
Етническа принадлежност	Афроамериканец

ПРАВНИ ВЪПРОСИ И БЕЗОПАСНОСТ

Мерки за безопасност

Когато планирате да съхранявате криопрепарат в течен азот за бъдещо размразяване, е задължително да спазвате строги мерки за безопасност. Подходящите защитни ръкавици и облекло са от съществено значение, а по време на прехвърлянето на замразени проби към или от резервоара с течен азот е необходимо да се използва маска за лице или предпазни очила. Това се прави, за да се намали рискът от нараняване от потенциални експлозии на криовиолите при изваждането им, които могат да доведат до изхвърляне на остри фрагменти.

Гаранция

Ние в Cytion заставаме зад качеството и жизнеспособността на нашите продукти.
Гарантираме, че нашите клетки ще бъдат жизнеспособни в началото на култивирането в продължение на 60 дни след изпращането им от нашите съоръжения.
Гарантираме, че всички материали отговарят на спецификациите, описани в сертификата за анализ и/или продуктовата листа
За пълни подробности, моля, направете справка с нашата <a href=""/Кои сме ние/Гаранция/"" hreflang=""x-default"">Гаранционна декларация

Прилагат се споразумения с трети страни	Yes