Cellule HK-ZFN-AURKB-mEGFP/ZFN-INCENP-mCherry

300270

La linea cellulare HK-ZFN-AURKB-mEGFP/ZFN-INCENP-mCherry, derivata dalle cellule HeLa di Kyoto, è un modello specializzato utilizzato nella ricerca in biologia cellulare. È stata geneticamente modificata per esprimere la chinasi Aurora B (AURKB) marcata con la proteina fluorescente verde potenziata monomerica (mEGFP) e la proteina del centromero interno (INCENP) marcata con mCherry. Queste modifiche consentono ai ricercatori di seguire le dinamiche e le interazioni di queste proteine durante la divisione cellulare. L'Aurora B chinasi è essenziale per la segregazione dei cromosomi e la citocinesi, mentre l'INCENP è un componente critico del Chromosomal Passenger Complex (CPC), che coordina la progressione mitotica.
Questa doppia marcatura fluorescente fornisce un potente strumento per l'imaging delle cellule vive, consentendo uno studio dettagliato della distribuzione delle proteine durante il ciclo cellulare. La linea cellulare HK-ZFN-AURKB-mEGFP/ZFN-INCENP-mCherry è preziosa per la ricerca sulla regolazione mitotica, la stabilità cromosomica e il checkpoint mitotico. La precisione delle nucleasi a dito di zinco (ZFN) utilizzate per le modifiche genetiche garantisce l'accuratezza di questo modello, rendendolo ideale per studi ad alta fedeltà nella biologia del cancro e nello sviluppo terapeutico.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrizione

La linea cellulare HK-ZFN-AURKB-mEGFP/ZFN-INCENP-mCherry, derivata dalle cellule HeLa di Kyoto, è un modello specializzato utilizzato nella ricerca in biologia cellulare. È stata geneticamente modificata per esprimere la chinasi Aurora B (AURKB) marcata con la proteina fluorescente verde potenziata monomerica (mEGFP) e la proteina del centromero interno (INCENP) marcata con mCherry. Queste modifiche consentono ai ricercatori di seguire le dinamiche e le interazioni di queste proteine durante la divisione cellulare. L'Aurora B chinasi è essenziale per la segregazione dei cromosomi e la citocinesi, mentre l'INCENP è un componente critico del Chromosomal Passenger Complex (CPC), che coordina la progressione mitotica.
Questa doppia marcatura fluorescente fornisce un potente strumento per l'imaging delle cellule vive, consentendo uno studio dettagliato della distribuzione delle proteine durante il ciclo cellulare. La linea cellulare HK-ZFN-AURKB-mEGFP/ZFN-INCENP-mCherry è preziosa per la ricerca sulla regolazione mitotica, la stabilità cromosomica e il checkpoint mitotico. La precisione delle nucleasi a dito di zinco (ZFN) utilizzate per le modifiche genetiche garantisce l'accuratezza di questo modello, rendendolo ideale per studi ad alta fedeltà nella biologia del cancro e nello sviluppo terapeutico.

Tessuto	Endocervice
Malattia	Adenocarcinoma
Sito metastatico	Sede del tumore primario (endocervice)

Applicazioni

Biologia del Complesso Cromosomico Passeggero (CPC); dinamiche della chinasi Aurora B e della proteina INCENP; imaging della mitosi su cellule vive; tracciamento fluorescente a doppio colore; segregazione cromosomica; citochinesi; checkpoint mitotico; validazione dell’editing genomico con ZFN

Sinonimi

- HK-ZFN-AURKB-mEGFP
- ZFN-INCENP-mCherry

CLASSIFICAZIONE

Organismo	Umano
Sesso	Donna
Proprietà di crescita	Aderente
Presenza di OGM	GMO-S1

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Dettagli sullo stato degli OGM

GMO-S1: This HeLa Kyoto dual-color line contains ZFN-engineered AURKB-mEGFP and INCENP-mCherry constructs for chromosome passenger complex studies. This classification applies only within Germany and may differ elsewhere.

Livello di biosicurezza	1

CARATTERISTICHE

Morfologia	Cellule simili a quelle epiteliali con forma di pietra a mosaico
Tipo di cellula	Cellule epiteliali

IDENTIFICATORI

Riferimento bibliografico

HK-ZFN-AURKB-mEGFP/ZFN-INCENP-mCherry (numero di catalogo Cytion 300270)

Codice fiscale NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_VL14
Depositario	Il laboratorio Ellenberg (EMBL)

ESPRESSIONE E SUSCETTIBILITÀ

Prodotti

EGFP (proteina verde fluorescente potenziata)

MANIPOLAZIONE E COLTURA

Terreno di coltura

DMEM, w: 4,5 g/L di glucosio, w: 4 mM di L-Glutammina, w: 3,7 g/L di NaHCO3, w: 1,0 mM di piruvato di sodio (articolo Cytion numero 820300a)

Atmosfera di incubazione	37°C, 5%CO2, atmosfera umidificata.

Integratori

Integrare il terreno di coltura con il 10% di FBS

Reagente di dissociazione	Accutase

Subcoltura

Rimuovere il vecchio terreno dalle cellule aderenti e lavarle con PBS privo di calcio e magnesio. Per le fiasche T25, utilizzare 3-5 ml di PBS e per le fiasche T75, 5-10 ml. Quindi, coprire completamente le cellule con Accutase, utilizzando 1-2 ml per le fiasche T25 e 2,5 ml per le fiasche T75. Lasciare incubare le cellule a temperatura ambiente per 8-10 minuti per staccarle. Dopo l'incubazione, mescolare delicatamente le cellule con 10 ml di terreno per risospenderle, quindi centrifugare a 300xg per 3 minuti. Scartare il surnatante, risospendere le cellule in terreno fresco e trasferirle in nuove fiasche contenenti terreno fresco.

Rinnovo dei fluidi	da 2 a 3 volte alla settimana

Scongelamento e coltura

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTROLLO DI QUALITÀ E CRIOCONSERVAZIONE

Sterilità

La contaminazione da micoplasma viene esclusa utilizzando sia saggi basati sulla PCR sia metodi di rilevamento del micoplasma basati sulla luminescenza.
Per garantire l'assenza di contaminazione batterica, fungina o da lieviti, le colture cellulari sono sottoposte a ispezioni visive quotidiane.

Terreno di coltura congelato	Come terreno di crioconservazione, utilizziamo un terreno di crescita completo (incluso FBS) + 10% DMSO per un'adeguata vitalità post-scongelamento, o CM-1 (numero di catalogo Cytion 800100), che include osmoprotettori e stabilizzatori metabolici ottimizzati per migliorare il recupero e ridurre lo stress crio-indotto.

Condizioni di conservazione

Per la conservazione a lungo termine, porre le fiale in azoto liquido in fase vapore a una temperatura compresa tra -150 e -196 °C circa. La conservazione a -80 °C è accettabile solo come breve fase intermedia prima del trasferimento in azoto liquido.

Condizioni di spedizione

Le linee cellulari crioconservate vengono spedite su ghiaccio secco in confezioni isolate e convalidate, con una quantità di refrigerante sufficiente a mantenere circa -78 °C durante il trasporto. Al ricevimento, ispezionare immediatamente il contenitore e trasferire immediatamente le fiale in un luogo di conservazione appropriato.

DONATORE

Età dei donatori	30 anni
Etnia	Afroamericano

ASPETTI LEGALI E DI SICUREZZA

Misure di sicurezza

Quando si prevede di conservare una crioviale in azoto liquido per un futuro scongelamento, è obbligatorio attenersi a rigorose misure di sicurezza. Guanti e indumenti protettivi appropriati sono essenziali e l'uso di una maschera facciale o di occhiali di sicurezza è richiesto durante il trasferimento dei campioni congelati da o verso il serbatoio di azoto liquido. Questo per ridurre il rischio di lesioni dovute a potenziali esplosioni di crioviali al momento della rimozione, che possono provocare la proiezione di frammenti taglienti.

Garanzia

Noi di Cytion garantiamo la qualità e la vitalità dei nostri prodotti.
Garantiamo che le nostre cellule saranno vitali all'inizio della coltura per 60 giorni dopo la spedizione dai nostri stabilimenti.
Assicuriamo che tutti i materiali sono conformi alle specifiche descritte nel Certificato di Analisi e/o nella Scheda Prodotto
Per tutti i dettagli, consultare la nostra <a href=""/Chi-siamo/Garanzia/"" hreflang=""x-default"">Dichiarazione di Garanzia

Si applicano gli accordi con terze parti	Yes