Cellules MA-CLS-2

300271

La lignée cellulaire MA-CLS-2 a été établie à partir de l'épanchement pleural d'une patiente chez qui un carcinome canalaire du sein avait été diagnostiqué. Cette lignée cellulaire provient d'une tumeur mammaire humaine et représente spécifiquement une métastase pleurale, souvent associée à des stades avancés du cancer. La tumeur d'origine a été classée pT1 NO GII, ce qui indique une tumeur primaire de taille limitée (T1), sans métastase ganglionnaire régionale (N0), et de grade modérément différencié (GII). Ces caractéristiques suggèrent que la tumeur en était à un stade relativement précoce, mais qu'elle s'était déjà propagée à la cavité pleurale, une complication qui a une incidence significative sur le pronostic de la patiente.
La lignée MA-CLS-2 est particulièrement utile pour étudier les processus métastatiques du cancer du sein, notamment ceux impliquant un épanchement pleural, ce qui peut fournir des informations sur les mécanismes de propagation tumorale et les cibles thérapeutiques potentielles. Cette lignée cellulaire offre un modèle permettant d'étudier les interactions entre les cellules cancéreuses mammaires métastatiques et l'environnement pleural, facilitant ainsi la recherche sur de nouvelles interventions visant à prévenir ou à traiter la maladie métastatique. En tant que modèle de métastase pleurale dérivée d'un carcinome canalaire, MA-CLS-2 permet également d'étudier les réponses aux médicaments dans le contexte du cancer du sein métastatique.

GENERAL INFORMATION

Description

La lignée cellulaire MA-CLS-2 a été établie à partir de l'épanchement pleural d'une patiente chez qui un carcinome canalaire du sein avait été diagnostiqué. Cette lignée cellulaire provient d'une tumeur mammaire humaine et représente spécifiquement une métastase pleurale, souvent associée à des stades avancés du cancer. La tumeur d'origine a été classée pT1 NO GII, ce qui indique une tumeur primaire de taille limitée (T1), sans métastase ganglionnaire régionale (N0), et de grade modérément différencié (GII). Ces caractéristiques suggèrent que la tumeur en était à un stade relativement précoce, mais qu'elle s'était déjà propagée à la cavité pleurale, une complication qui a une incidence significative sur le pronostic de la patiente.
La lignée MA-CLS-2 est particulièrement utile pour étudier les processus métastatiques du cancer du sein, notamment ceux impliquant un épanchement pleural, ce qui peut fournir des informations sur les mécanismes de propagation tumorale et les cibles thérapeutiques potentielles. Cette lignée cellulaire offre un modèle permettant d'étudier les interactions entre les cellules cancéreuses mammaires métastatiques et l'environnement pleural, facilitant ainsi la recherche sur de nouvelles interventions visant à prévenir ou à traiter la maladie métastatique. En tant que modèle de métastase pleurale dérivée d'un carcinome canalaire, MA-CLS-2 permet également d'étudier les réponses aux médicaments dans le contexte du cancer du sein métastatique.

Tissue	Sein
Disease	Carcinome canalaire
Metastatic site	Épanchement pleural

Synonyms

- MACLS-2
- MACLS2

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Female
Growth properties	Adherent
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	De type épithélial

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Tumourigenic	Oui, chez les souris nues
Ploidy status	Aneuploïde

IDENTIFIERS

Citation

MA-CLS-2 (numéro de catalogue Cytion 300271)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_4571

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

RPMI 1640, contenant 2,0 mM de glutamine stable et 2,0 g/L de $NaHCO_3$ (numéro d'article Cytion 820700a)

Incubation atmosphere	37 °C, 5 % de CO_2, atmosphère humidifiée.

Supplements

Ajouter 10 % de FBS au milieu de culture

Dissociation reagent	Accutase

Subculturing

Retirez l'ancien milieu des cellules adhérentes et lavez-les avec du PBS sans calcium ni magnésium. Pour les flacons T25, utilisez 3 à 5 ml de PBS, et pour les flacons T75, utilisez 5 à 10 ml. Ensuite, recouvrez complètement les cellules d'Accutase, en utilisant 1 à 2 ml pour les flacons T25 et 2,5 ml pour les flacons T75. Laissez les cellules incuber à température ambiante pendant 8 à 10 minutes afin de les détacher. Après l'incubation, mélangez délicatement les cellules avec 10 ml de milieu pour les remettre en suspension, puis centrifugez à 300 x g pendant 3 minutes. Éliminez le surnageant, remettez les cellules en suspension dans du milieu frais, puis transférez-les dans de nouveaux flacons contenant déjà du milieu frais.

Seeding density	2×10^4 cellules/cm^2
Fluid renewal	2 à 3 fois par semaine
Post-thaw recovery	Rapide

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

La contamination par les mycoplasmes est exclue à l'aide de tests basés sur la PCR et de méthodes de détection des mycoplasmes par luminescence.
Afin de s’assurer qu’il n’y a aucune contamination bactérienne, fongique ou par des levures, les cultures cellulaires font l’objet d’inspections visuelles quotidiennes.

Freeze medium	Comme milieu de cryoconservation, nous utilisons un milieu de croissance complet (contenant du sérum fœtal bovin) + 10 % de DMSO pour assurer une viabilité adéquate après décongélation, ou du CM-1 (référence Cytion 800100), qui contient des osmoprotecteurs et des stabilisateurs métaboliques optimisés pour améliorer la récupération et réduire le stress induit par la cryoconservation.

Storage conditions

Pour une conservation à long terme, placez les flacons dans de l’azote liquide en phase vapeur à une température comprise entre environ −150 et −196 °C. L’entreposage à −80 °C n’est acceptable qu’à titre d’étape intermédiaire de courte durée avant le transfert dans l’azote liquide.

Shipping conditions

Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées dans de la glace sèche, dans un emballage isotherme validé contenant suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d’environ −78 °C pendant tout le transport. À la réception, inspectez immédiatement le conteneur et transférez sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié.

DONOR

Donor age	47 ans
Ethnicity	caucasien

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

Lorsqu’on prévoit entreposer un cryotube dans de l’azote liquide en vue d’une décongélation ultérieure, il est impératif de respecter des mesures de sécurité rigoureuses. Le port de gants et de vêtements de protection appropriés est essentiel, et l’utilisation d’un masque facial ou de lunettes de protection est obligatoire lors du transfert d’échantillons congelés vers ou depuis le réservoir d’azote liquide. Cette précaution vise à réduire le risque de blessure causé par d’éventuelles explosions de cryotubes lors de leur retrait, pouvant entraîner la projection de fragments coupants.

Warranty

Chez Cytion, nous garantissons la qualité et la viabilité de nos produits.
Nous garantissons que nos cellules seront viables au début de la culture pendant
60 jours à compter de leur expédition depuis nos installations.
Nous assurons que tous les matériaux sont conformes aux spécifications décrites dans le
certificat d’analyse et/ou la fiche technique du produit.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre
déclaration de garantie.

Material Transfer Agreement required	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB