Cellules MDA-MB-435S

300277

Avertissement : La lignée cellulaire en question a été identifiée comme problématique en raison de problèmes de contamination. Plus précisément, il a été démontré que la lignée cellulaire parentale (MDA-MB-435) est un dérivé de la lignée cellulaire M14.
La lignée cellulaire MDA-MB-435S est un modèle largement utilisé dans la recherche sur le cancer, que l'on pensait à l'origine dérivé d'une métastase de cancer du sein. Ces cellules présentent des caractéristiques typiques des cellules cancéreuses très agressives, notamment un taux de prolifération rapide, une résistance à l'apoptose et la capacité d'envahir les tissus environnants. En raison de ces caractéristiques, les cellules MDA-MB-435S sont fréquemment utilisées dans les études portant sur les métastases du cancer, les mécanismes de résistance aux médicaments et les fondements moléculaires du comportement agressif des tumeurs.
Il est intéressant de noter que des analyses moléculaires et génétiques ultérieures ont révélé que les cellules MDA-MB-435S ont un profil génétique plus proche du mélanome que du cancer du sein, ce qui a des conséquences importantes sur leur utilisation dans la recherche. Malgré cette controverse, les cellules MDA-MB-435S restent un modèle précieux pour étudier les processus métastatiques et tester des agents thérapeutiques potentiels, en particulier ceux qui ciblent des mécanismes communs au cancer du sein et au mélanome. Il est conseillé aux chercheurs de tenir compte de ces résultats génétiques lorsqu'ils interprètent les résultats obtenus dans le cadre d'études portant sur les cellules MDA-MB-435S.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Description

Avertissement : La lignée cellulaire en question a été identifiée comme problématique en raison de problèmes de contamination. Plus précisément, il a été démontré que la lignée cellulaire parentale (MDA-MB-435) est un dérivé de la lignée cellulaire M14.
La lignée cellulaire MDA-MB-435S est un modèle largement utilisé dans la recherche sur le cancer, que l'on pensait à l'origine dérivé d'une métastase de cancer du sein. Ces cellules présentent des caractéristiques typiques des cellules cancéreuses très agressives, notamment un taux de prolifération rapide, une résistance à l'apoptose et la capacité d'envahir les tissus environnants. En raison de ces caractéristiques, les cellules MDA-MB-435S sont fréquemment utilisées dans les études portant sur les métastases du cancer, les mécanismes de résistance aux médicaments et les fondements moléculaires du comportement agressif des tumeurs.
Il est intéressant de noter que des analyses moléculaires et génétiques ultérieures ont révélé que les cellules MDA-MB-435S ont un profil génétique plus proche du mélanome que du cancer du sein, ce qui a des conséquences importantes sur leur utilisation dans la recherche. Malgré cette controverse, les cellules MDA-MB-435S restent un modèle précieux pour étudier les processus métastatiques et tester des agents thérapeutiques potentiels, en particulier ceux qui ciblent des mécanismes communs au cancer du sein et au mélanome. Il est conseillé aux chercheurs de tenir compte de ces résultats génétiques lorsqu'ils interprètent les résultats obtenus dans le cadre d'études portant sur les cellules MDA-MB-435S.

Tissu	Peau
Maladie	Mélanome amélanotique
Site métastatique	Fesse droite, hypoderme (mélanome primaire / d'origine M14)

Applications

Recherche sur les métastases et l'invasion ; modèle de controverse entre le mélanome et le cancer du sein ; mécanismes de résistance aux médicaments ; biologie tumorale ; criblage pharmacologique préclinique

Synonymes

- MDA-MB-435s
- MDA-MB-435 S
- MDA-MB-435-S
- MDAMB435S
- BrCL15

CLASSIFICATION

Organisme	Humain

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Sexe	Homme
Propriétés de croissance	Adepte
Statut OGM	Sans OGM

Informations détaillées sur le statut OGM

No genetic modification; problematic line — parental MDA-MB-435 identified as M14 melanoma derivative; use with appropriate caution and cite genetic identity

Niveau de biosécurité	1

CARACTÉRISTIQUES

Morphologie	De type épithélial
Type de cellule	Cellules épithéliales

IDENTIFIANTS

Référence

MDA-MB-435S (numéro de catalogue Cytion 300277)

Numéro d'identification fiscale NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_0622

MANIPULATION ET CULTURE

Milieu de culture

DMEM:Ham's F12 (1:1), w : 3.1 g/L Glucose, w : 2.5 mM L-Glutamine, w : 15 mM HEPES, w : 0.5 mM Sodium pyruvate, w : 1.2 g/L NaHCO3 (numéro d'article Cytion 820400a)

Atmosphère d'incubation	37°C, 5%CO2, atmosphère humidifiée.

Compléments alimentaires

Compléter le milieu avec 5% de FBS

Réactif de dissociation	Accutase

Repiquage

Retirer l'ancien milieu des cellules adhérentes et les laver avec du PBS dépourvu de calcium et de magnésium. Pour les flacons T25, utiliser 3-5 ml de PBS, et pour les flacons T75, 5-10 ml. Ensuite, recouvrir complètement les cellules avec Accutase, en utilisant 1 à 2 ml pour les flacons T25 et 2,5 ml pour les flacons T75. Laisser les cellules incuber à température ambiante pendant 8-10 minutes pour les détacher. Après incubation, mélanger délicatement les cellules avec 10 ml de milieu pour les remettre en suspension, puis centrifuger à 300xg pendant 3 minutes. Jeter le surnageant, remettre les cellules en suspension dans du milieu frais et les transférer dans de nouveaux flacons contenant déjà du milieu frais.

Rapport de fractionnement	1 à 5
Densité de semis	1 à 3 × 10^4 cellules/cm^2
Renouvellement des fluides	2 à 3 fois par semaine

Décongélation et mise en culture

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTRÔLE QUALITÉ ET CRYOCONSERVATION

Stérilité

La contamination par les mycoplasmes est exclue à l'aide de tests basés sur la PCR et de méthodes de détection des mycoplasmes basées sur la luminescence.
Pour s'assurer de l'absence de contamination bactérienne, fongique ou levurienne, les cultures cellulaires font l'objet d'inspections visuelles quotidiennes.

Milieu de congélation	Comme milieu de cryoconservation, nous utilisons un milieu de croissance complet (comprenant du FBS) + 10 % de DMSO pour une viabilité adéquate après décongélation, ou CM-1 (numéro de catalogue 800100 de Cytion), qui comprend des osmoprotectants et des stabilisateurs métaboliques optimisés pour améliorer la récupération et réduire le stress induit par la cryogénisation.

Conditions de stockage

Pour une conservation à long terme, placer les flacons dans de l'azote liquide en phase vapeur à une température comprise entre -150 et -196 °C environ. Le stockage à -80 °C n'est acceptable qu'en tant qu'étape intermédiaire de courte durée avant le transfert dans l'azote liquide.

Conditions de livraison

Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées sur glace sèche dans des emballages isolés et validés, avec suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d'environ -78 °C tout au long du transport. À la réception, inspecter immédiatement le conteneur et transférer sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié.

DONATEUR

Âge du donneur	33 ans
Origine ethnique	Européen

ASPECTS JURIDIQUES ET SÉCURITÉ

Consignes de sécurité

Lorsque l'on envisage de stocker un cryovial dans l'azote liquide en vue d'une décongélation ultérieure, il est obligatoire de respecter des mesures de sécurité rigoureuses. Des gants et des vêtements de protection appropriés sont indispensables, et l'utilisation d'un masque facial ou de lunettes de sécurité est requise pendant le transfert des échantillons congelés vers ou depuis le réservoir d'azote liquide. Ceci afin de réduire le risque de blessures dues à l'explosion potentielle des cryoviaux lors de leur retrait, qui peut entraîner la projection de fragments tranchants.

Garantie

Chez Cytion, nous nous portons garants de la qualité et de la viabilité de nos produits.
Nous garantissons que nos cellules seront viables au début de la culture pendant 60 jours après l'expédition de nos installations.
Nous assurons que tous les matériaux sont conformes aux spécifications décrites dans le certificat d'analyse et/ou la fiche produit
Pour plus de détails, veuillez consulter notre <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default""> Déclaration de garantie

Un accord de transfert de matériel est requis	Yes