Cellule MDA-MB-435S

300277

Disclaimer: la linea cellulare in questione è stata identificata come problematica a causa di problemi di contaminazione. In particolare, la linea cellulare madre (MDA-MB-435) è risultata essere un derivato della linea cellulare M14.
La linea cellulare MDA-MB-435S è un modello ampiamente utilizzato nella ricerca sul cancro, originariamente ritenuto derivato da una metastasi di cancro al seno. Queste cellule presentano caratteristiche tipiche delle cellule tumorali altamente aggressive, tra cui un rapido tasso di proliferazione, resistenza all'apoptosi e capacità di invadere i tessuti circostanti. Grazie a queste caratteristiche, le cellule MDA-MB-435S sono spesso utilizzate negli studi che indagano sulle metastasi tumorali, sui meccanismi di resistenza ai farmaci e sulle basi molecolari del comportamento aggressivo dei tumori.
È interessante notare che successive analisi molecolari e genetiche hanno rivelato che le cellule MDA-MB-435S condividono un profilo genetico più simile a quello del melanoma che a quello del cancro al seno, sollevando implicazioni significative per il loro uso nella ricerca. Nonostante questa controversia, le cellule MDA-MB-435S rimangono un modello prezioso per lo studio dei processi metastatici e per la sperimentazione di potenziali agenti terapeutici, in particolare quelli che mirano a meccanismi comuni sia al cancro al seno che al melanoma. Si consiglia ai ricercatori di considerare queste scoperte genetiche quando interpretano i risultati ottenuti da studi che coinvolgono cellule MDA-MB-435S.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrizione

Disclaimer: la linea cellulare in questione è stata identificata come problematica a causa di problemi di contaminazione. In particolare, la linea cellulare madre (MDA-MB-435) è risultata essere un derivato della linea cellulare M14.
La linea cellulare MDA-MB-435S è un modello ampiamente utilizzato nella ricerca sul cancro, originariamente ritenuto derivato da una metastasi di cancro al seno. Queste cellule presentano caratteristiche tipiche delle cellule tumorali altamente aggressive, tra cui un rapido tasso di proliferazione, resistenza all'apoptosi e capacità di invadere i tessuti circostanti. Grazie a queste caratteristiche, le cellule MDA-MB-435S sono spesso utilizzate negli studi che indagano sulle metastasi tumorali, sui meccanismi di resistenza ai farmaci e sulle basi molecolari del comportamento aggressivo dei tumori.
È interessante notare che successive analisi molecolari e genetiche hanno rivelato che le cellule MDA-MB-435S condividono un profilo genetico più simile a quello del melanoma che a quello del cancro al seno, sollevando implicazioni significative per il loro uso nella ricerca. Nonostante questa controversia, le cellule MDA-MB-435S rimangono un modello prezioso per lo studio dei processi metastatici e per la sperimentazione di potenziali agenti terapeutici, in particolare quelli che mirano a meccanismi comuni sia al cancro al seno che al melanoma. Si consiglia ai ricercatori di considerare queste scoperte genetiche quando interpretano i risultati ottenuti da studi che coinvolgono cellule MDA-MB-435S.

Tessuto	La pelle
Malattia	Melanoma amelanotico
Sito metastatico	Gluteo destro, ipoderma (melanoma primario/origine M14)

Applicazioni

Ricerca sulle metastasi e sull'invasività; modello di controversia tra melanoma e carcinoma mammario; meccanismi di resistenza ai farmaci; biologia tumorale; screening farmacologico preclinico

Sinonimi

- MDA-MB-435s
- MDA-MB-435 S
- MDA-MB-435-S
- MDAMB435S
- BrCL15

CLASSIFICAZIONE

Organismo	Umano

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Sesso	Maschio
Proprietà di crescita	Aderente
Presenza di OGM	Senza OGM

Dettagli sullo stato degli OGM

No genetic modification; problematic line — parental MDA-MB-435 identified as M14 melanoma derivative; use with appropriate caution and cite genetic identity

Livello di biosicurezza	1

CARATTERISTICHE

Morfologia	Simile all'epitelio
Tipo di cellula	Cellule epiteliali

IDENTIFICATORI

Riferimento bibliografico

MDA-MB-435S (catalogo Cytion numero 300277)

Codice fiscale NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_0622

MANIPOLAZIONE E COLTURA

Terreno di coltura

DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3,1 g/L di glucosio, w: 2,5 mM di L-Glutammina, w: 15 mM di HEPES, w: 0,5 mM di Sodio piruvato, w: 1,2 g/L di NaHCO3 (articolo Cytion numero 820400a)

Atmosfera di incubazione	37°C, 5%CO2, atmosfera umidificata.

Integratori

Integrare il terreno di coltura con il 5% di FBS

Reagente di dissociazione	Accutase

Subcoltura

Rimuovere il vecchio terreno dalle cellule aderenti e lavarle con PBS privo di calcio e magnesio. Per le fiasche T25, utilizzare 3-5 ml di PBS e per le fiasche T75, 5-10 ml. Quindi, coprire completamente le cellule con Accutase, utilizzando 1-2 ml per le fiasche T25 e 2,5 ml per le fiasche T75. Lasciare incubare le cellule a temperatura ambiente per 8-10 minuti per staccarle. Dopo l'incubazione, mescolare delicatamente le cellule con 10 ml di terreno per risospenderle, quindi centrifugare a 300xg per 3 minuti. Scartare il surnatante, risospendere le cellule in terreno fresco e trasferirle in nuove fiasche contenenti terreno fresco.

Rapporto di frazionamento	Da 1 a 5
Densità di semina	da 1 a 3 × 10^4 cellule/cm^2
Rinnovo dei fluidi	da 2 a 3 volte alla settimana

Scongelamento e coltura

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTROLLO DI QUALITÀ E CRIOCONSERVAZIONE

Sterilità

La contaminazione da micoplasma viene esclusa utilizzando sia saggi basati sulla PCR sia metodi di rilevamento del micoplasma basati sulla luminescenza.
Per garantire l'assenza di contaminazione batterica, fungina o da lieviti, le colture cellulari sono sottoposte a ispezioni visive quotidiane.

Terreno di coltura congelato	Come terreno di crioconservazione, utilizziamo un terreno di crescita completo (incluso FBS) + 10% DMSO per un'adeguata vitalità post-scongelamento, o CM-1 (numero di catalogo Cytion 800100), che include osmoprotettori e stabilizzatori metabolici ottimizzati per migliorare il recupero e ridurre lo stress crio-indotto.

Condizioni di conservazione

Per la conservazione a lungo termine, porre le fiale in azoto liquido in fase vapore a una temperatura compresa tra -150 e -196 °C circa. La conservazione a -80 °C è accettabile solo come breve fase intermedia prima del trasferimento in azoto liquido.

Condizioni di spedizione

Le linee cellulari crioconservate vengono spedite su ghiaccio secco in confezioni isolate e convalidate, con una quantità di refrigerante sufficiente a mantenere circa -78 °C durante il trasporto. Al ricevimento, ispezionare immediatamente il contenitore e trasferire immediatamente le fiale in un luogo di conservazione appropriato.

DONATORE

Età dei donatori	33 anni
Etnia	Europeo

ASPETTI LEGALI E DI SICUREZZA

Misure di sicurezza

Quando si prevede di conservare una crioviale in azoto liquido per un futuro scongelamento, è obbligatorio attenersi a rigorose misure di sicurezza. Guanti e indumenti protettivi appropriati sono essenziali e l'uso di una maschera facciale o di occhiali di sicurezza è richiesto durante il trasferimento dei campioni congelati da o verso il serbatoio di azoto liquido. Questo per ridurre il rischio di lesioni dovute a potenziali esplosioni di crioviali al momento della rimozione, che possono provocare la proiezione di frammenti taglienti.

Garanzia

Noi di Cytion garantiamo la qualità e la vitalità dei nostri prodotti.
Garantiamo che le nostre cellule saranno vitali all'inizio della coltura per 60 giorni dopo la spedizione dai nostri stabilimenti.
Assicuriamo che tutti i materiali sono conformi alle specifiche descritte nel Certificato di Analisi e/o nella Scheda Prodotto
Per tutti i dettagli, consultare la nostra <a href=""/Chi-siamo/Garanzia/"" hreflang=""x-default"">Dichiarazione di Garanzia

È richiesto un accordo di trasferimento di materiale	Yes