MDA-MB-468 Hücreleri

300279

MDA-MB-468 hücre hattı, metastatik adenokarsinomlu yetişkin bir hastanın plevral efüzyonundan elde edilen köklü bir insan meme kanseri hücre hattıdır. Bu hücreler epitelyal morfolojileri ile karakterize edilir ve yüksek derecede anöploidi ile bilinirler. MDA-MB-468 hücreleri östrojen reseptörü negatiftir (ER-) ve genellikle östrojen reseptörü (ER), progesteron reseptörü (PR) ve HER2/neu ekspresyonu olmayan bir meme kanseri alt tipi olan üçlü negatif meme kanserini (TNBC) incelemek için bir model olarak kullanılır. Bu da MDA-MB-468'i hormonal terapiye veya HER2 hedefli tedavilere yanıt vermeyen kanserlere yönelik araştırmalar için kritik bir araç haline getirmektedir.
Genetik olarak MDA-MB-468 hücreleri, çeşitli kanser türlerinde yaygın olarak görülen ve hücre döngüsü düzenlemesi ve apoptozda önemli bir rol oynayan TP53 geninde mutasyonlar sergiler. Hücre hattı ayrıca epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) geninin amplifikasyonunu göstererek EGFR sinyal yolunun ve bunun kanser ilerlemesi ve tedavi direncindeki etkilerinin incelenmesindeki faydasına katkıda bulunur. Araştırmacılar ilaç direnci mekanizmalarını araştırmak, yeni terapötik ajanları test etmek ve agresif meme kanserlerinin moleküler biyolojisini keşfetmek için sıklıkla MDA-MB-468 hücrelerini kullanmaktadır.
Genetik ve fenotipik özelliklerine ek olarak, MDA-MB-468 hücreleri bağışıklık sistemi baskılanmış farelerde ksenograft oluşturma yetenekleriyle bilinir ve bu da onları tümör büyümesi ve metastazının in vivo çalışmaları için değerli bir model haline getirir. Bu hücre hattının çeşitli kemoterapötik ajanlara ve hedefe yönelik tedavilere duyarlılığı, TNBC için etkili tedavi stratejileri geliştirmek amacıyla kapsamlı bir şekilde incelenmektedir. Genel olarak, MDA-MB-468 hücre hattı, özellikle üçlü-negatif ve EGFR-pozitif maligniteler bağlamında meme kanseri araştırmalarını ilerletmek için çok önemli bir kaynaktır.

GENEL BILGILER

Açıklama

MDA-MB-468 hücre hattı, metastatik adenokarsinomlu yetişkin bir hastanın plevral efüzyonundan elde edilen köklü bir insan meme kanseri hücre hattıdır. Bu hücreler epitelyal morfolojileri ile karakterize edilir ve yüksek derecede anöploidi ile bilinirler. MDA-MB-468 hücreleri östrojen reseptörü negatiftir (ER-) ve genellikle östrojen reseptörü (ER), progesteron reseptörü (PR) ve HER2/neu ekspresyonu olmayan bir meme kanseri alt tipi olan üçlü negatif meme kanserini (TNBC) incelemek için bir model olarak kullanılır. Bu da MDA-MB-468'i hormonal terapiye veya HER2 hedefli tedavilere yanıt vermeyen kanserlere yönelik araştırmalar için kritik bir araç haline getirmektedir.
Genetik olarak MDA-MB-468 hücreleri, çeşitli kanser türlerinde yaygın olarak görülen ve hücre döngüsü düzenlemesi ve apoptozda önemli bir rol oynayan TP53 geninde mutasyonlar sergiler. Hücre hattı ayrıca epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) geninin amplifikasyonunu göstererek EGFR sinyal yolunun ve bunun kanser ilerlemesi ve tedavi direncindeki etkilerinin incelenmesindeki faydasına katkıda bulunur. Araştırmacılar ilaç direnci mekanizmalarını araştırmak, yeni terapötik ajanları test etmek ve agresif meme kanserlerinin moleküler biyolojisini keşfetmek için sıklıkla MDA-MB-468 hücrelerini kullanmaktadır.
Genetik ve fenotipik özelliklerine ek olarak, MDA-MB-468 hücreleri bağışıklık sistemi baskılanmış farelerde ksenograft oluşturma yetenekleriyle bilinir ve bu da onları tümör büyümesi ve metastazının in vivo çalışmaları için değerli bir model haline getirir. Bu hücre hattının çeşitli kemoterapötik ajanlara ve hedefe yönelik tedavilere duyarlılığı, TNBC için etkili tedavi stratejileri geliştirmek amacıyla kapsamlı bir şekilde incelenmektedir. Genel olarak, MDA-MB-468 hücre hattı, özellikle üçlü-negatif ve EGFR-pozitif maligniteler bağlamında meme kanseri araştırmalarını ilerletmek için çok önemli bir kaynaktır.

Doku	Meme
Hastalık	Adenokarsinom
Metastaz yeri	Plevral efüzyon

Eş anlamlılar

- MDA-MB 468
- MDA-MB468
- MDAMB468
- MDA-468
- MDA468
- MB468
- MD Anderson-Metastatic Breast-468

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

SINIFLANDIRMA

Canlı	İnsan
Cinsiyet	Kadın
Büyüme özellikleri	Bağlı
Biyogüvenlik seviyesi	1

ÖZELLIKLER

Morfoloji	Epitelyal

TANIMLAYICILAR

Kaynak gösterimi

MDA-MB-468 (Cytion katalog numarası 300279)

NCBI Vergi Kimlik Numarası	9606
Cellosaurus	CVCL_0419

İŞLEME VE YETIŞTIRME

Besiyeri

DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3.1 g/L Glukoz, w: 2.5 mM L-Glutamin, w: 15 mM HEPES, w: 0.5 mM Sodyum piruvat, w: 1.2 g/L NaHCO3 (Cytion makale numarası 820400a)

Kuluçka ortamı	37°C, %5CO2, nemlendirilmiş atmosfer.

Takviyeler

Ortamı %10 FBS ile takviye edin

Ayrıştırma reaktifi	Accutase

Alt kültür oluşturma

Yapışık hücrelerden eski ortamı çıkarın ve kalsiyum ve magnezyum içermeyen PBS ile yıkayın. T25 şişeleri için 3-5 ml PBS ve T75 şişeleri için 5-10 ml kullanın. Ardından, T25 flasklar için 1-2 ml ve T75 flasklar için 2,5 ml kullanarak hücreleri Accutase ile tamamen kaplayın. Hücreleri ayırmak için oda sıcaklığında 8-10 dakika inkübasyona bırakın. İnkübasyondan sonra, hücreleri yeniden süspanse etmek için 10 ml besiyeriyle hafifçe karıştırın, ardından 300xg'de 3 dakika santrifüjleyin. Süpernatantı atın, hücreleri taze besiyerinde yeniden süspanse edin ve zaten taze besiyeri içeren yeni şişelere aktarın.

Sıvı değişimi	haftada 2 ila 3 kez

Çözme ve kültürleme

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KALITE KONTROL VE KRIYOPREZERVASYON

Kısırlık

Mikoplazma kontaminasyonu hem PCR tabanlı tahliller hem de lüminesans tabanlı mikoplazma tespit yöntemleri kullanılarak dışlanır. Bakteriyel, fungal veya maya kontaminasyonu olmadığından emin olmak için hücre kültürleri günlük görsel incelemelere tabi tutulur.

Dondurma ortamı	Kriyoprezervasyon ortamı olarak, yeterli çözülme sonrası canlılık için tam büyüme ortamı (FBS dahil) + %10 DMSO veya iyileşmeyi artırmak ve kriyo-indüklenmiş stresi azaltmak için optimize edilmiş ozmoprotektanlar ve metabolik stabilizatörler içeren CM-1 (Cytion katalog numarası 800100) kullanıyoruz.

Saklama koşulları

Uzun süreli muhafaza için flakonları yaklaşık -150 ila -196 °C'de buhar fazlı sıvı nitrojen içine yerleştirin. 80 °C'de saklama yalnızca sıvı nitrojene aktarılmadan önce kısa bir ara adım olarak kabul edilebilir.

Nakliye koşulları

Kriyoprezerve edilmiş hücre hatları, nakliye boyunca yaklaşık -78 °C'yi korumak için yeterli soğutucu akışkan içeren, onaylanmış, yalıtılmış ambalajlarda kuru buz üzerinde gönderilir. Teslim aldığınızda, kabı hemen inceleyin ve flakonları gecikmeden uygun depoya aktarın.

BAĞIŞÇI

Bağışçının yaşı	51 yıl
Etnik köken	Afrika

YASAL VE GÜVENLIK

Güvenlik önlemleri

İleride çözdürmek üzere sıvı nitrojen içinde bir kriyoviyal saklamayı planlarken, sıkı güvenlik önlemlerine uymak zorunludur. Uygun koruyucu eldivenler ve giysiler şarttır ve dondurulmuş numunelerin sıvı nitrojen tankına veya tanktan transferi sırasında yüz maskesi veya koruyucu gözlük kullanılması gerekir. Bu, çıkarma sırasında keskin parçaların fırlamasına neden olabilecek potansiyel kriyoviyal patlamalardan kaynaklanan yaralanma riskini azaltmak içindir.

Garanti

Cytion olarak ürünlerimizin kalitesinin ve canlılığının arkasındayız.
Hücrelerimizin, tesislerimizden sevkiyattan sonra 60 gün boyunca kültürün başlangıcında canlı olacağını garanti ediyoruz.
Tüm malzemelerin Analiz Sertifikası ve/veya Ürün Sayfasında açıklanan özelliklere uygun olduğunu garanti ediyoruz
Tüm ayrıntılar için lütfen <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garanti Beyanımıza bakın

Malzeme Transfer Anlaşması gereklidir	Yes