Alab Cells

300280

Buněčná linie ALAB je buněčná linie lidského adenokarcinomu prsu odvozená z nádoru prsu. Byla přizpůsobena k růstu in vitro, zejména na kolagenových substrátech, což usnadňuje studium chování nádorových buněk v mamárních karcinomech. Buňky ALAB se používají zejména ve výzkumu zaměřeném na proteiny vázající vápník a kolagen (CaBP, resp. CBP). V těchto buňkách byly izolovány a analyzovány proteiny vázající vápník, přičemž byl odhalen významný protein o velikosti 38 kDa, který je úzce spojen s anexiny, rodinou proteinů zapojených do buněčných procesů, jako je membránové obchodování a přenos signálu.
Jedním z klíčových proteinů identifikovaných v buňkách ALAB je annexin II, protein závislý na vápníku, který se váže na kolagen a hraje roli v různých buněčných funkcích, včetně exocytózy a organizace cytoskeletu. Imunofluorescenční studie buněk ALAB odhalují perinukleární granulární vzorec exprese annexinu II, což naznačuje jeho zapojení do sekrece proteinů a buněčné diferenciace. Protein annexin II o velikosti 38 kDa detekovaný v těchto buňkách je také spojen s vazbou kolagenu, která může být klíčová pro progresi nádoru a metastazování, což z ALAB činí cenný model pro studium biologie nádorů prsu a interakcí proteinů.

OBECNÉ INFORMACE

Popis

Buněčná linie ALAB je buněčná linie lidského adenokarcinomu prsu odvozená z nádoru prsu. Byla přizpůsobena k růstu in vitro, zejména na kolagenových substrátech, což usnadňuje studium chování nádorových buněk v mamárních karcinomech. Buňky ALAB se používají zejména ve výzkumu zaměřeném na proteiny vázající vápník a kolagen (CaBP, resp. CBP). V těchto buňkách byly izolovány a analyzovány proteiny vázající vápník, přičemž byl odhalen významný protein o velikosti 38 kDa, který je úzce spojen s anexiny, rodinou proteinů zapojených do buněčných procesů, jako je membránové obchodování a přenos signálu.
Jedním z klíčových proteinů identifikovaných v buňkách ALAB je annexin II, protein závislý na vápníku, který se váže na kolagen a hraje roli v různých buněčných funkcích, včetně exocytózy a organizace cytoskeletu. Imunofluorescenční studie buněk ALAB odhalují perinukleární granulární vzorec exprese annexinu II, což naznačuje jeho zapojení do sekrece proteinů a buněčné diferenciace. Protein annexin II o velikosti 38 kDa detekovaný v těchto buňkách je také spojen s vazbou kolagenu, která může být klíčová pro progresi nádoru a metastazování, což z ALAB činí cenný model pro studium biologie nádorů prsu a interakcí proteinů.

Tkáň	Prsa
Nemoc	Adenokarcinom
Místo metastázy	Místo primárního nádoru (prsa)

Aplikace

Výzkum adenokarcinomu prsu; biologie annexinu II a proteinů vázajících vápník; studie vazby na kolagen; invaze nádorových buněk a interakce s extracelulární matricí; sekrece proteinů; exocytóza; biologie karcinomu prsu

Synonyma

- AlAb
- ALAB
- A1Ab
- AlAB

KLASIFIKACE

Organismus	Člověk
Sex	Muž
Růstové vlastnosti	Přívrženec
Stav GMO	Bez GMO

Podrobnosti o statusu GMO

No genetic modification; wildtype human breast adenocarcinoma cell line

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Úroveň biologické bezpečnosti	1

CHARAKTERISTIKA

Morfologie	Epitelu podobné
Typ buňky	Epitelové buňky

IDENTIFIKÁTORY

Citace

Alab (katalogové číslo Cytion 300280)

Daňové identifikační číslo NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_U957

MANIPULACE A CHOV

Pěstovací médium

DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3,1 g/l glukózy, w: 2,5 mM L-Glutaminu, w: 15 mM HEPES, w: 0,5 mM pyruvátu sodného, w: 1,2 g/l NaHCO3 (číslo výrobku Cytion 820400a)

Inkubační atmosféra	37 °C, 5 %CO2, zvlhčená atmosféra.

Doplňky stravy

Doplňte médium o 5 % FBS

Disociační činidlo	Accutase

Subkultivace

Shromážděte suspenzi buněk do 15 ml zkumavky a jemně promyjte adherentní buňky PBS bez vápníku a hořčíku (použijte 3-5 ml pro baňky T25 a 5-10 ml pro baňky T75). Aplikujte Accutase (1-2 ml pro baňky T25, 2,5 ml pro baňky T75), abyste zajistili úplné pokrytí buněčné vrstvy. Nechte buňky inkubovat při pokojové teplotě po dobu 10 minut. Po inkubaci spojte a odstřeďte suspenzi i adherované buňky. Po odstředění opatrně resuspendujte buněčnou peletu a přeneste buněčnou suspenzi do nových baněk obsahujících čerstvé médium.

Rozmrazování a kultivace

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KVALITY A KRYOKONZERVACE

Sterilita

Kontaminace mykoplazmaty je vyloučena jak pomocí testů založených na PCR, tak pomocí luminiscenčních metod detekce mykoplazmy. Aby se zajistilo, že nedojde ke kontaminaci bakteriemi, plísněmi nebo kvasinkami, jsou buněčné kultury denně podrobovány vizuálním kontrolám.

Mrazicí médium	Jako kryokonzervační médium používáme kompletní růstové médium (včetně FBS) + 10 % DMSO pro zajištění dostatečné životaschopnosti po rozmrazení nebo CM-1 (katalogové číslo 800100 společnosti Cytion), které obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory pro zlepšení regenerace a snížení stresu způsobeného kryo.

Podmínky skladování

Pro dlouhodobé uchování umístěte lahvičky do kapalného dusíku v plynné fázi při teplotě přibližně -150 až -196 °C. Skladování při -80 °C je přijatelné pouze jako krátký přechodný krok před přemístěním do kapalného dusíku.

Dopravní podmínky

Kryokonzervované buněčné linie se přepravují na suchém ledu v ověřených, izolovaných obalech s dostatečným množstvím chladiva, aby se po celou dobu přepravy udržovala teplota přibližně -78 °C. Po obdržení ihned zkontrolujte obal a neprodleně přeneste lahvičky do vhodného skladu.

DÁRCE

Věk dárce	54 let
Etnická příslušnost	Etnická příslušnost neuvedena

PRÁVNÍ INFORMACE A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Bezpečnostní opatření

Při plánování uložení kryovialu v kapalném dusíku pro budoucí rozmrazení je nutné dodržovat přísná bezpečnostní opatření. Nezbytné jsou vhodné ochranné rukavice a oděv a při přenášení zmrazených vzorků do nádrže s kapalným dusíkem nebo z ní je nutné používat obličejovou masku nebo ochranné brýle. To proto, aby se snížilo riziko zranění v důsledku možných výbuchů kryovialů při jejich vyjímání, které mohou mít za následek vystřelování ostrých úlomků.

Záruka

Ve společnosti Cytion si stojíme za kvalitou a životaschopností našich produktů.
Zaručujeme, že naše buňky budou životaschopné na začátku kultivace po dobu 60 dnů po odeslání z našich zařízení.
Zaručujeme, že všechny materiály odpovídají specifikacím popsaným v certifikátu analýzy a/nebo v produktovém listu
Úplné informace naleznete v našem <a href=""/Kdo-jsme/Záruka/"" hreflang=""x-default"">Záručním prohlášení

Je nutná smlouva o převodu materiálu	Yes