MeWo

300285

GENERELL INFORMASJON

Beskrivelse

MeWo-cellelinjen er en fibroblastlignende melanomcellelinje isolert fra huden til en 78 år gammel hvit mannlig pasient med malignt melanom. Disse cellene har en karakteristisk morfologi som gjenspeiler deres fibroblastiske opprinnelse. MeWo-celler er verdifulle i kreftforskning, særlig for å studere melanomets biologiske egenskaper og immuninteraksjoner. I likhet med andre melanomcellelinjer har MeWo-celler vært viktige i studier av tumorantigener og deres immunogenisitet. I flere studier har MeWo-celler blitt brukt til å identifisere spesifikke overflateantigener, som er avgjørende for å forstå hvordan melanomceller interagerer med immunsystemet.
En av de bemerkelsesverdige egenskapene til MeWo-celler er deres evne til å støtte vekst av varicella-zoster-virus (VZV)-isolater, med optimale vekstbetingelser ved 32 °C, selv om de fortsatt kan opprettholde VZV-vekst ved 36 °C. Dette gjør MeWo-cellelinjen spesielt nyttig i virologisk forskning, særlig i forbindelse med studier av virusreplikasjon og patogenese under varierende temperaturforhold. I tillegg er MeWo-celler tumorogene, ettersom de kan danne svulster når de injiseres i nakne mus, en egenskap som understreker deres nytteverdi i in vivo-studier av tumorigenisitet. Denne egenskapen, kombinert med at de reagerer på virusinfeksjon, gjør MeWo-cellene til en allsidig modell for forskning på både kreft og infeksjonssykdommer.
Studier som involverer MeWo-cellelinjen, har også utforsket uttrykket av melanom-assosierte antigener, der MeWo har blitt brukt som en referansecellelinje i absorpsjonsanalyser for å identifisere unike og felles antigener på tvers av ulike melanomprøver. Den antigene profilen til MeWo-celler, slik den er identifisert i disse studiene, omfatter antigener som deles med andre melanomcellelinjer, samt antigener som kan være unike for denne cellelinjen, og som bidrar til en bredere forståelse av melanomimmunologi.

Vev	Hud
Sykdom	Kutant melanom
Metastaseområde	Lymfeknute

Søknader

Virusstudier

Synonymer

- MEWO
- Mewo
- Me Wo
- Me-Wo
- Mevo
- SK-MEL-MeWo
- Mel-MeWo
- BI-Mel
- EST50

KLASSIFISERING

Organisme	Menneske
Sex	Mann
Vekstegenskaper	Tilhenger
Biosikkerhetsnivå	1

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

EGENSKAPER

Morfologi	Fibroblastlignende
Tumorinduserende	Danner malignt melanom
MSI-status	Stabil (MSS)

IDENTIFIKATORER

Kildehenvisning

MeWo (Cytion-katalognummer 300285)

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_0445

UTTRYKK OG MOTTAKELIGHET

Mutasjonsprofil

BRAF V600E wt

Produkter

Melanin

HÅNDTERING OG KULTUR

Næringsmedium

EMEM (MEM Eagle), m: 2 mM L-Glutamin, m: 2,2 g/L NaHCO3, m: EBSS (Cytion artikkelnummer 820100a)

Inkubasjonsatmosfære	37 °C, 5 %CO2, befuktet atmosfære.

Kosttilskudd

Suppler mediet med 10 % FBS og 1 % NEAA

Dissosiasjonsmiddel	Accutase

Subkultivering

Fjern det gamle mediet fra de adherente cellene, og vask dem med PBS uten kalsium og magnesium. Bruk 3-5 ml PBS for T25-kolber og 5-10 ml for T75-kolber. Dekk deretter cellene helt med Accutase, med 1-2 ml for T25-kolber og 2,5 ml for T75-kolber. La cellene inkubere i romtemperatur i 8-10 minutter for å løsne dem. Etter inkubasjon blandes cellene forsiktig med 10 ml medium for å resuspendere dem, og sentrifuger deretter ved 300xg i 3 minutter. Kast supernatanten, resuspender cellene i nytt medium, og overfør dem til nye kolber som allerede inneholder nytt medium.

Væskefornyelse	2 til 3 ganger per uke

Tining og dyrking

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROLL OG KRYOKONSERVERING

Sterilitet

Mykoplasma-kontaminering utelukkes ved hjelp av både PCR-baserte analyser og luminescensbaserte metoder for påvisning av mykoplasma.
For å sikre at det ikke finnes bakterie-, sopp- eller gjærkontaminering, blir cellekulturene inspisert visuelt hver dag.

Frysemedium	Som kryopreserveringsmedium bruker vi komplett vekstmedium (inkludert FBS) + 10 % DMSO for tilstrekkelig levedyktighet etter opptining, eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som inneholder optimaliserte osmobeskyttende midler og metabolske stabilisatorer for å øke utvinningen og redusere kryoindusert stress.

Oppbevaringsbetingelser

For langtidsoppbevaring plasseres hetteglassene i flytende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Lagring ved -80 °C er kun akseptabelt som et kort mellomtrinn før overføring til flytende nitrogen.

Fraktvilkår

Kryopreserverte cellelinjer sendes på tørris i validert, isolert emballasje med tilstrekkelig kjølemiddel til å opprettholde en temperatur på ca. -78 °C under hele transporten. Ved mottak skal beholderen inspiseres umiddelbart, og hetteglassene skal straks overføres til egnet lagringsplass.

DONOR

Donorens alder	78 år
Etnisitet	Kaukasisk

JURIDISK OG SIKKERHET

Sikkerhetsregler

Når du planlegger å oppbevare et kryovial i flytende nitrogen for senere tining, er det obligatorisk å følge strenge sikkerhetstiltak. Det er viktig å bruke egnede vernehansker og -klær, og det er påbudt å bruke ansiktsmaske eller vernebriller under overføring av frosne prøver til eller fra tanken med flytende nitrogen. Dette er for å redusere risikoen for skader som følge av potensielle kryovæskeeksplosjoner ved fjerning, noe som kan føre til at skarpe fragmenter slynges ut.

Garanti

Hos Cytion står vi bak kvaliteten og levedyktigheten til produktene våre.
Vi garanterer at cellene våre vil være levedyktige ved starten av dyrkingen i 60 dager etter at de er sendt fra våre anlegg.
Vi forsikrer at alle materialer er i samsvar med spesifikasjonene som er beskrevet i analysesertifikatet og/eller produktarket
For fullstendig informasjon, se vår <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantierklæring

Avtale om materialoverføring kreves	Yes