U-2 OS-ZFN-SNAP-Nup107

300294

GENERAL INFORMATION

Description

U-2 OS-ZFN-SNAP-Nup107 □□□□□□□□□□□□□□□□□□ U-2 OS □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ SNAP □□□□□□□ Nup107□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ SNAP □□□□□□□□□□□□□□□□□ Nup107 □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

U-2 OS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

□□□ 5a □□□□□□3.0 g/L □□□□□□□□□□□□□□□□□2.0 mM □□□□□□□2.2 g/L $NaHCO_3$□Cytion □□□□ 820200a□

Incubation atmosphere	37°C□5% CO_2□□□□□□

Supplements

□□□□□□□ 10% FBS□3.0 g/L □□□□□□□□□□□□□2.0 mM □□□□□2.2 g/L $NaHCO_3$ □□ 1% NEAA

Dissociation reagent	Accutase

Subculturing

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□PBS□□□□□T25□□□□□3-5□□PBS□T75□□□□□□5-10□□□ □□□□ Accutase □□□□□□□T25 □□□□□ 1–2 □□□T75 □□□□□□ 2.5 □□□□□□□□□□□□ 8–10 □□□□□□□□ □□□□□□□□ 10 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 300xg □□ 3 □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

□□□