MV4-11

300295

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Leírás

Az MV-4-11 sejtvonal, amelyet egy bifenotípusos B-mielomonocita leukémiában szenvedő gyermek blaszt sejtjeiből izoláltak, kritikus erőforrásként szolgál az akut leukémiák, különösen az akut myeloid leukémia (AML) tanulmányozásában. Az MV4-11 sejteket magas proliferációs rátájuk és bizonyos genetikai rendellenességek jelenléte jellemzi. A 4. és 11. kromoszóma közötti transzlokáció az MLL-AF4 fúziós gén létrejöttéhez vezet, amely döntő szerepet játszik a leukémiaképződésben, és hozzájárul a leukémia agresszív jellegéhez. Az MLL-AF4 fúziós gén jelenléte különösen fontossá teszi ezeket a sejteket a leukémogenezis alapjául szolgáló molekuláris mechanizmusok megértése és az olyan célzott terápiákkal kapcsolatos vizsgálatok szempontjából, amelyek célja ezen onkogén fúziós fehérje működésének megzavarása.
Az MV4-11 sejtek továbbá felhasználhatók a leukémiás őssejtek biológiájának, a gyógyszerrezisztencia mechanizmusainak és a csontvelő mikrokörnyezet leukémia progressziójában játszott szerepének tanulmányozására. A sejtvonal további segítséget nyújt a metabolizmus és a transzkriptomikai profilok kutatásában, átfogó képet nyújtva a leukémiában bekövetkező metabolikus változásokról és a redox adaptációról. Az MV-4-11 sejtek képessége, hogy reagáljanak a különböző rákkutatási vegyi anyagokra, beleértve az olyan inhibitorokat, mint a venetoklax, és a rezisztens sejtek tanulmányozásában betöltött szerepük.
Összefoglalva, az MV-4-11 sejtvonal kulcsfontosságú eszköz a leukémiakutatásban, sokoldalú platformot kínál az akut mieloid leukémia komplex biológiájának vizsgálatához, a terápiás szerek hatékonyságának teszteléséhez és a célzott kezelések gyógyszerrezisztencia leküzdésében rejlő lehetőségek feltárásához.

Szövet	Vér
Betegség	Akut monocitás leukémia

Szinonimák

- MV-4-11
- MV-4:11
- MV4:11
- MV 4
- 11
- MV4
- 11
- MV411
- MV(4
- 11)

OSZTÁLYOZÁS

Organizmus	Ember
Szex	Férfi
Növekedési tulajdonságok	Felfüggesztés
Biológiai biztonsági szint	1

JELLEMZŐK

Morfológia	Kerek cellák
Sejttípus	Myelomonocytás, bifenotípusos

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Kariotípus

48, xY, t(4,11)(q21,q23), +8, +19

AZONOSÍTÓK

Hivatkozás

MV4-11 (Cytion katalógusszám: 300295)

NCBI adóazonosító szám	9606
Cellosaurus	CVCL_0064

KIFEJEZŐDÉS ÉS FOGÉKONYSÁG

Antigén-expresszió

CD4 (40-96%), CD10 (4-11%), CD15 (96-99%)

Mutációs profil

FLT3mut (az FLT3 belső tandemduplikációját PCR-rel igazolták)

KEZELÉS ÉS TENYÉSZTÉS

Táptalaj

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabil glutamin, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion 820700a cikkszám)

Inkubációs környezet	37°C, 5%CO2, párásított légkör.

Kiegészítők

A táptalajt egészítsük ki 10% FBS-szel

Átültetés

A tenyészeteket a táptalaj rendszeres hozzáadásával vagy cseréjével tartsa fenn. A tenyészeteket 5 x 10^5 sejt/ml sűrűséggel indítsa el, és az optimális növekedés érdekében tartsa a sejtkoncentrációt 3 x 10^5 és 1 x 10^6 sejt/ml közötti tartományban.

Ültetési sűrűség	5 x 10^5 sejt/ml
Az olvadás utáni helyreállás	Kérjük, hagyja, hogy a sejtek legalább 48 órán át regenerálódjanak a fagyasztás után.

Felolvasztás és tenyésztés

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

MINŐSÉGELLENŐRZÉS ÉS KRIOKONZERVÁLÁS

Meddőség

A mikoplazma-szennyeződést mind a PCR-alapú vizsgálatokkal, mind a lumineszcencia-alapú mikoplazma-kimutatási módszerekkel kizárják. A bakteriális, gombás vagy élesztőgombás szennyeződés elkerülése érdekében a sejtkultúrákat napi vizuális ellenőrzésnek vetik alá.

Fagyasztóközeg	Krioprezerváló táptalajként teljes növekedési táptalajt (beleértve az FBS-t) + 10% DMSO-t használunk a megfelelő kiolvasztás utáni életképesség érdekében, vagy CM-1-et (Cytion katalógusszám: 800100), amely optimalizált ozmoprotektánsokat és metabolikus stabilizátorokat tartalmaz a regenerálódás fokozása és a krio-indukált stressz csökkentése érdekében.

Tárolási feltételek

Hosszú távú tartósítás céljából helyezze az üvegeket gőzfázisú folyékony nitrogénbe, körülbelül -150 és -196 °C közötti hőmérsékleten. A -80 °C-on történő tárolás csak rövid átmeneti lépésként fogadható el a folyékony nitrogénbe való átvitel előtt.

Szállítási feltételek

A kriokonzervált sejtvonalakat szárazjégen, validált, szigetelt csomagolásban szállítják, elegendő hűtőközeggel, hogy a szállítás során a hőmérsékletet körülbelül -78 °C-on tartsák. Átvételkor azonnal vizsgálja meg a tárolóedényt, és haladéktalanul helyezze át az injekciós üvegeket a megfelelő tárolóhelyre.

ADOMÁNYOZÓ

Az adományozó életkora	10 év
Etnikai hovatartozás	Kaukázusi

JOGI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Biztonsági óvintézkedések

Ha egy kriovialitást folyékony nitrogénben tervezünk tárolni a későbbi kiolvasztás céljából, akkor kötelező betartani a szigorú biztonsági intézkedéseket. A megfelelő védőkesztyű és védőruházat elengedhetetlen, és a fagyasztott minták folyékony nitrogéntartályba vagy a folyékony nitrogéntartályból történő átvitele során arcmaszk vagy védőszemüveg használata szükséges. Ez azért van, hogy csökkentsék a kriovialis anyagok eltávolításakor bekövetkező esetleges robbanásból eredő sérülésveszélyt, amely éles szilánkok kilövellését eredményezheti.

Garancia

A Cytionnál kiállunk termékeink minősége és életképessége mellett.
Garantáljuk, hogy sejtjeink a tenyésztés megkezdésekor életképesek lesznek, a létesítményünkből történő kiszállítás után 60 napig.
Biztosítjuk, hogy minden anyag megfelel az analitikai tanúsítványban és/vagy a terméklapon leírt specifikációknak
A teljes részleteket lásd <a href="""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang="""x-default"">Garancia nyilatkozatunkban

Anyagátadási megállapodás szükséges	Yes