MV4-11

300295

INFORMAZIONI GENERALI

Descrizione

La linea cellulare MV-4-11, isolata dalle cellule blastiche di un bambino con leucemia mielomonocitica B bifenotipica, rappresenta una risorsa fondamentale nello studio delle leucemie acute, in particolare della leucemia mieloide acuta (AML). Le cellule MV4-11 sono caratterizzate da un alto tasso di proliferazione e dalla presenza di alcune anomalie genetiche. Una traslocazione tra i cromosomi 4 e 11 porta alla creazione del gene di fusione MLL-AF4, che svolge un ruolo cruciale nella leucemogenesi e contribuisce alla natura aggressiva della leucemia. La presenza del gene di fusione MLL-AF4 rende queste cellule particolarmente importanti per la comprensione dei meccanismi molecolari alla base della leucemogenesi e per gli studi sulle terapie mirate che mirano a interrompere la funzione di questa proteina di fusione oncogena. Inoltre, le cellule MV4-11 possono essere utilizzate per studiare la biologia delle cellule staminali della leucemia, i meccanismi di resistenza ai farmaci e il ruolo del microambiente del midollo osseo nella progressione della leucemia. La linea cellulare è inoltre fondamentale per la ricerca sui profili metabolomici e trascrittomici, fornendo una comprensione completa delle alterazioni metaboliche e dell'adattamento redox nella leucemia. La capacità delle cellule MV-4-11 di rispondere a varie sostanze chimiche per la ricerca sul cancro, compresi gli inibitori come il venetoclax, e il loro ruolo nello studio delle cellule resistenti.
In conclusione, la linea cellulare MV-4-11 è uno strumento cruciale nella ricerca sulle leucemie, in quanto offre una piattaforma versatile per studiare la complessa biologia della leucemia mieloide acuta, testare l'efficacia degli agenti terapeutici ed esplorare il potenziale dei trattamenti mirati nel superare la resistenza ai farmaci.

Tessuto	Sangue
Malattia	Leucemia monocitica acuta

Sinonimi

- MV-4-11
- MV-4:11
- MV4:11
- MV 4
- 11
- MV4
- 11
- MV411
- MV(4
- 11)

CLASSIFICAZIONE

Organismo	Umano
Sesso	Maschio
Proprietà di crescita	Sospensione
Livello di biosicurezza	1

CARATTERISTICHE

Morfologia	Celle rotonde
Tipo di cellula	Mielomonocitica, bifenotipica

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Cariotipo

48, xY, t(4,11)(q21,q23), +8, +19

IDENTIFICATORI

Riferimento bibliografico

MV4-11 (numero di catalogo Cytion 300295)

Codice fiscale NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_0064

ESPRESSIONE E SUSCETTIBILITÀ

Espressione dell'antigene

CD4 (40-96%), CD10 (4-11%), CD15 (96-99%)

Profilo mutazionale

FLT3mut (una duplicazione interna in tandem di FLT3 è stata verificata mediante PCR)

MANIPOLAZIONE E COLTURA

Terreno di coltura

RPMI 1640, w: 2,0 mM di glutammina stabile, w: 2,0 g/L di NaHCO3 (articolo Cytion numero 820700a)

Atmosfera di incubazione	37°C, 5%CO2, atmosfera umidificata.

Integratori

Integrare il terreno di coltura con il 10% di FBS

Subcoltura

Mantenere le colture aggiungendo o sostituendo periodicamente il terreno. Avviare le colture con una densità di 5 x 10^5 cellule/ml e mantenere la concentrazione cellulare compresa tra 3 x 10^5 e 1 x 10^6 cellule/ml per una crescita ottimale.

Densità di semina	5 x 10^5 cellule/mL
Recupero post-scongelamento	Lasciare che le cellule si riprendano dal processo di congelamento per almeno 48 ore.

Scongelamento e coltura

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTROLLO DI QUALITÀ E CRIOCONSERVAZIONE

Sterilità

La contaminazione da micoplasma viene esclusa utilizzando sia saggi basati sulla PCR sia metodi di rilevamento del micoplasma basati sulla luminescenza.
Per garantire l'assenza di contaminazione batterica, fungina o da lieviti, le colture cellulari sono sottoposte a ispezioni visive quotidiane.

Terreno di coltura congelato	Come terreno di crioconservazione, utilizziamo un terreno di crescita completo (incluso FBS) + 10% DMSO per un'adeguata vitalità post-scongelamento, o CM-1 (numero di catalogo Cytion 800100), che include osmoprotettori e stabilizzatori metabolici ottimizzati per migliorare il recupero e ridurre lo stress crio-indotto.

Condizioni di conservazione

Per la conservazione a lungo termine, porre le fiale in azoto liquido in fase vapore a una temperatura compresa tra -150 e -196 °C circa. La conservazione a -80 °C è accettabile solo come breve fase intermedia prima del trasferimento in azoto liquido.

Condizioni di spedizione

Le linee cellulari crioconservate vengono spedite su ghiaccio secco in confezioni isolate e convalidate, con una quantità di refrigerante sufficiente a mantenere circa -78 °C durante il trasporto. Al ricevimento, ispezionare immediatamente il contenitore e trasferire immediatamente le fiale in un luogo di conservazione appropriato.

DONATORE

Età dei donatori	10 anni
Etnia	Caucasico

ASPETTI LEGALI E DI SICUREZZA

Misure di sicurezza

Quando si prevede di conservare una crioviale in azoto liquido per un futuro scongelamento, è obbligatorio attenersi a rigorose misure di sicurezza. Guanti e indumenti protettivi appropriati sono essenziali e l'uso di una maschera facciale o di occhiali di sicurezza è richiesto durante il trasferimento dei campioni congelati da o verso il serbatoio di azoto liquido. Questo per ridurre il rischio di lesioni dovute a potenziali esplosioni di crioviali al momento della rimozione, che possono provocare la proiezione di frammenti taglienti.

Garanzia

Noi di Cytion garantiamo la qualità e la vitalità dei nostri prodotti.
Garantiamo che le nostre cellule saranno vitali all'inizio della coltura per 60 giorni dopo la spedizione dai nostri stabilimenti.
Assicuriamo che tutti i materiali sono conformi alle specifiche descritte nel Certificato di Analisi e/o nella Scheda Prodotto
Per tutti i dettagli, consultare la nostra <a href=""/Chi-siamo/Garanzia/"" hreflang=""x-default"">Dichiarazione di Garanzia

È richiesto un accordo di trasferimento di materiale	Yes