Nalm-6

300297

GENERELL INFORMASJON

Beskrivelse

Nalm-6-cellelinjen, som stammer fra perifert blod fra en pasient med akutt lymfoblastisk leukemi (ALL), er blitt et viktig verktøy i leukemiforskningen. Den humane cellelinjen Nalm 6 innkapsler de biologiske egenskapene til B-celle ALL, og gir et unikt innblikk i sykdommens genomiske landskap, inkludert genomisk ustabilitet og DNA-reparasjonsmekanismer.
Nalm-6-cellene kan også brukes til å studere effekten av tilgjengelige behandlingsmål og eksisterende resistensmekanismer. Cellelinjens følsomhet for cytotoksiske midler og dens rolle i å belyse reparasjonsfunksjonene ved homolog rekombinasjon (HDR) er av spesiell interesse, særlig når det gjelder HDR-cellenes evne til å korrigere DNA-skader.
Nalm6-cellelinjen er en pålitelig modell for å studere den komplekse karakteren av akutt leukemi. Den gjør det mulig å forske på genuttrykksprofilene som er involvert i glykolyse, lipid- og karbohydratmetabolisme og mTORC1-veien, noe som belyser den metabolske omprogrammeringen i leukemiceller. Videre bidrar cellelinjens anvendelse i omvendt genetikk og analyse av hele transkriptomet til å dissekere de intrikate molekylære nettverkene som driver leukemiprogresjon og -resistens.
Forskning på Nalm-6-cellelinjen, inkludert studier av klonale varianter som klon G5 og resistente cellelinjer som de med høy HPRT-mutasjonsfrekvens eller C9 med resistensindeks, gir innsikt i leukemiens heterogenitet. Utforskningen av leukemidynamikken, spesielt i sammenheng med glukokortikoidresistens og MSH2-uttrykk, understreker potensialet for å utvikle mer målrettede og effektive behandlinger for ALL.
Nalm-6-cellelinjen er en sentral ressurs i leukemiforskningen, og den gir dyp innsikt i B-celle ALL ved at den kan brukes til å studere genomisk ustabilitet, DNA-reparasjonsmekanismer, effekt av terapeutiske mål, resistensmekanismer og de underliggende molekylære veiene som påvirker leukemiens komplekse biologi og heterogenitet.

Vev	Blod
Sykdom	Akutt lymfoblastisk leukemi B hos voksne

Synonymer

- NALM-6
- NALM 6
- Nalm 6
- NALM6
- Nalm6
- NALM-6-M1

KLASSIFISERING

Organisme	Menneske
Sex	Mann
Vekstegenskaper	Oppheng
Biosikkerhetsnivå	1

EGENSKAPER

Morfologi	Runde celler
Celletype	Forløper for B-celler
Fordoblingstid	35 til 40 timer

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IDENTIFIKATORER

Kildehenvisning

Nalm-6 (Cytion katalognummer 300297)

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_0092

UTTRYKK OG MOTTAKELIGHET

Revers transkriptase	Negativ

HÅNDTERING OG KULTUR

Næringsmedium

RPMI 1640, m: 2,0 mM stabil glutamin, m: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion artikkelnummer 820700a)

Inkubasjonsatmosfære	37 °C, 5 %CO2, befuktet atmosfære.

Kosttilskudd

Suppler mediet med 10 % FBS

Subkultivering

Oppretthold kulturene ved å tilsette eller skifte ut mediet med jevne mellomrom. Start kulturene med en tetthet på 5 x 10^5 celler/ml og hold cellekonsentrasjonen innenfor området 3 x 10^5 til 1 x 10^6 celler/ml for optimal vekst.

Tining og dyrking

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROLL OG KRYOKONSERVERING

Sterilitet

Mykoplasma-kontaminering utelukkes ved hjelp av både PCR-baserte analyser og luminescensbaserte metoder for påvisning av mykoplasma.
For å sikre at det ikke finnes bakterie-, sopp- eller gjærkontaminering, blir cellekulturene inspisert visuelt hver dag.

Frysemedium	Som kryopreserveringsmedium bruker vi komplett vekstmedium (inkludert FBS) + 10 % DMSO for tilstrekkelig levedyktighet etter opptining, eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som inneholder optimaliserte osmobeskyttende midler og metabolske stabilisatorer for å øke utvinningen og redusere kryoindusert stress.

Oppbevaringsbetingelser

For langtidsoppbevaring plasseres hetteglassene i flytende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Lagring ved -80 °C er kun akseptabelt som et kort mellomtrinn før overføring til flytende nitrogen.

Fraktvilkår

Kryopreserverte cellelinjer sendes på tørris i validert, isolert emballasje med tilstrekkelig kjølemiddel til å opprettholde en temperatur på ca. -78 °C under hele transporten. Ved mottak skal beholderen inspiseres umiddelbart, og hetteglassene skal straks overføres til egnet lagringsplass.

DONOR

Donorens alder	19 år

JURIDISK OG SIKKERHET

Sikkerhetsregler

Når du planlegger å oppbevare et kryovial i flytende nitrogen for senere tining, er det obligatorisk å følge strenge sikkerhetstiltak. Det er viktig å bruke egnede vernehansker og -klær, og det er påbudt å bruke ansiktsmaske eller vernebriller under overføring av frosne prøver til eller fra tanken med flytende nitrogen. Dette er for å redusere risikoen for skader som følge av potensielle kryovæskeeksplosjoner ved fjerning, noe som kan føre til at skarpe fragmenter slynges ut.

Garanti

Hos Cytion står vi bak kvaliteten og levedyktigheten til produktene våre.
Vi garanterer at cellene våre vil være levedyktige ved starten av dyrkingen i 60 dager etter at de er sendt fra våre anlegg.
Vi forsikrer at alle materialer er i samsvar med spesifikasjonene som er beskrevet i analysesertifikatet og/eller produktarket
For fullstendig informasjon, se vår <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantierklæring

Avtale om materialoverføring kreves	Yes