# B16-F0

300308

## ALGEMENE INFORMATIE

### Beschrijving

De B16-F0 cellijn is een melanoomcellijn afgeleid van het B16 muismelanoom. Deze cellijn wordt veel gebruikt in kankeronderzoek vanwege het hoge metastase-potentieel en het vermogen om tumoren te vormen bij injectie in syngene muizen. B16-F0 cellen zijn vooral nuttig voor het bestuderen van de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan melanoomprogressie en metastase, maar ook voor het testen van de werkzaamheid van medicijnen tegen kanker en therapeutische interventies in preklinische modellen. Met name de B16-F0 cellijn is de oudercellijn waarvan andere varianten, zoals B16-F1, B16-F10 en B16-BL6, zijn afgeleid door middel van selectieve procedures gericht op het verbeteren van specifieke metastatische eigenschappen.
B16-F0 cellen vertonen een typische epitheliale morfologie en groeien adherent in cultuur. Het is bekend dat ze verschillende melanoom-geassocieerde antigenen tot expressie brengen, waardoor ze een waardevol hulpmiddel zijn voor immunologisch onderzoek en voor de ontwikkeling van melanoomvaccins. Daarnaast worden deze cellen vaak gebruikt in onderzoeken naar genexpressie, signaalwegen en de tumormicro-omgeving. Onderzoekers gebruiken B16-F0 cellen om de interacties tussen melanoomcellen en het immuunsysteem te onderzoeken, waarbij ze zich met name richten op mechanismen om het immuunsysteem te omzeilen en te onderdrukken. De karakterisering van B16-F0 en de daarvan afgeleide lijnen biedt een uitgebreid kader voor het begrijpen van het invasieve en metastatische gedrag van melanoom, waarbij B16-F1, B16-F10 en B16-BL6 elk staan voor stadia van toenemende metastatische en invasieve activiteit, waardoor ze dienen als cruciale modellen in de studie van kankerprogressie en therapeutische respons.

| | |
|---|---|
| **Weefsel** | Huid |
| **Ziekte** | Muis melanoom |

### Synoniemen

- B16/F0
- B16F0

## CLASSIFICATIE

| | |
|---|---|
| **Organisme** | Muis |
| **Seks** | Man |
| **Groei-eigenschappen** | Aanhanger |
| **Bioveiligheidsniveau** | 1 |

## KENMERKEN

| | |
|---|---|
| **Morfologie** | Mengsel van spoelvormige en epitheelachtige cellen |
| **Celtype** | Epitheel |
| **Tumorverwekkend** | Ja, in syngene muizen |

## IDENTIFICATIEGEGEVENS

### Bronvermelding

B16-F0 (Cytion catalogusnummer 300308)

| | |
|---|---|
| **NCBI-belastingnummer** | 10090 |
| **Cellosaurus** | CVCL_0604 |

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

## EXPRESSIE EN VATBAARHEID

**Producten**

Melanine

## BEHANDELING EN KWEEK

**Kweekmedium**

DMEM, w: 4,5 g/L Glucose, w: 4 mM L-Glutamine, w: 3,7 g/L NaHCO3, w: 1,0 mM Natriumpyruvaat (Cytion artikelnummer 820300a)

| | |
|---|---|
| **Incubatieomgeving** | 37°C, 5%CO2, bevochtigde atmosfeer. |

**Supplementen**

Vul het medium aan met 10% FBS

| | |
|---|---|
| **Dissociatiereagens** | Accutase |

**Heruitplanten**

Verwijder het oude medium van de adherente cellen en was ze met PBS zonder calcium en magnesium. Gebruik voor T25-flesjes 3-5 ml PBS en voor T75-flesjes 5-10 ml. Bedek de cellen vervolgens volledig met Accutase, met 1-2 ml voor T25-flesjes en 2,5 ml voor T75-flesjes. Laat de cellen gedurende 8-10 minuten bij kamertemperatuur incuberen om ze los te maken. Na incubatie de cellen voorzichtig mengen met 10 ml medium om ze te resuspenderen en vervolgens centrifugeren bij 300xg gedurende 3 minuten. Gooi het supernatant weg, resuspendeer de cellen in vers medium en breng ze over in nieuwe kolven die al vers medium bevatten.

**Ontdooien en kweken**

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

## KWALITEITSCONTROLE EN CRYOPRESERVATIE

**Onvruchtbaarheid**

Mycoplasmaverontreiniging wordt uitgesloten met zowel PCR-gebaseerde testen als op luminescentie gebaseerde mycoplasmadetectiemethoden.
Om er zeker van te zijn dat er geen besmetting is met bacteriën, schimmels of gisten, worden de celculturen dagelijks onderworpen aan visuele inspecties.

| | |
|---|---|
| **Kweekmedium invriezen** | Als cryoconserveringsmedium gebruiken we volledig groeimedium (inclusief FBS) + 10% DMSO voor voldoende levensvatbaarheid na het ontdooien, of CM-1 (Cytion catalogusnummer 800100), dat geoptimaliseerde osmoprotectanten en metabolische stabilisatoren bevat om het herstel te verbeteren en door cryo geïnduceerde stress te verminderen. |

**Opslagvoorwaarden**

Voor langdurige bewaring plaatst u flesjes in vloeibare stikstof in dampfase bij ongeveer -150 tot -196 °C. Opslag bij -80 °C is alleen aanvaardbaar als korte tussenstap vóór overbrenging naar vloeibare stikstof.

### Verzendvoorwaarden

Gecryopreserveerde cellijnen worden verzonden op droog ijs in gevalideerde, geïsoleerde verpakkingen met voldoende koelmiddel om gedurende het transport ongeveer -78 °C te handhaven. Inspecteer de verpakking onmiddellijk na ontvangst en breng de flacons onverwijld over naar de juiste opslagplaats.

## DONATEUR

| | |
|---|---|
| **Soort / ondersoort** | C57BL/6 |

## JURIDISCHE EN VEILIGHEIDSASPECTEN

### Veiligheidsmaatregelen

Wanneer men van plan is om een cryovial in vloeibare stikstof op te slaan om later te ontdooien, is het verplicht om strenge veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Passende beschermende handschoenen en kleding zijn essentieel en het gebruik van een gezichtsmasker of veiligheidsbril is vereist tijdens het overbrengen van bevroren monsters naar of uit de tank met vloeibare stikstof. Dit is om het risico op letsel door mogelijke cryoviale explosies bij het verwijderen te beperken, wat kan resulteren in de projectie van scherpe fragmenten.

### Garantie

Bij Cytion staan we achter de kwaliteit en levensvatbaarheid van onze producten.
We garanderen dat onze cellen levensvatbaar zijn bij het begin van de kweek gedurende 60 dagen na verzending vanuit onze faciliteiten.
We verzekeren dat alle materialen voldoen aan de specificaties beschreven in het analysecertificaat en/of productblad
Raadpleeg voor volledige informatie onze <a href=""/Wie-zijn-wij/Garantie/"" hreflang=""x-default"">Garantieverklaring

| | |
|---|---|
| **Er is een overeenkomst inzake materiaaloverdracht vereist** | Yes |