BEAS-2B

300311

ALGEMENE INFORMATIE

Beschrijving

BEAS-2B is een geïmmortaliseerde cellijn afkomstig van het bronchiale epitheel van een persoon zonder kanker. Deze cellijn werd gecreëerd door menselijke bronchiale epitheelcellen te transformeren met een adenovirus 12-SV40 hybride virus, waardoor de cellen een verlengde levensduur hebben met behoud van veel van de morfologische en functionele kenmerken die typisch zijn voor primaire bronchiale epitheelcellen. BEAS-2B cellen worden veel gebruikt in onderzoek naar ademhalingsaandoeningen, met name in studies naar de toxicologische en farmacologische effecten van inhaleerbare stoffen, omdat ze afkomstig zijn van het luchtwegepitheel.
De cellijn vertoont een keienmorfologie bij het kweken en behoudt bepaalde kritieke kenmerken, zoals het vermogen om xenobiotische verbindingen te metaboliseren, waardoor ze zeer relevant zijn voor onderzoeken naar het metabolisme van geneesmiddelen en respiratoire toxicologie. Ze zijn ook uitgebreid gebruikt in onderzoeken naar cellulaire mechanismen van astma, chronische obstructieve longziekte (COPD) en kanker. BEAS-2B cellen reageren voorspelbaar op cytokinen, oxidatieve stress en andere stimuli die typisch zijn voor blootstelling van de luchtwegen aan omgevingsstoffen. Dit maakt ze tot een waardevol model voor het bestuderen van ontstekings- en oxidatieve stressmechanismen in longcellen.
Als instrument in biomedisch onderzoek worden BEAS-2B cellen ook vaak gebruikt om het carcinogeen potentieel van zwevende deeltjes te beoordelen, waarbij ze dienen als model om de veranderingen in epitheelcellen van de luchtwegen na blootstelling aan carcinogenen te begrijpen. Hun genetische samenstelling en gevoeligheid voor genetische manipulatie vergroten hun nut in moleculair biologische experimenten die gericht zijn op het begrijpen van genexpressie en signaalroutes die betrokken zijn bij longziekten en de ontwikkeling van kanker.

Weefsel	Long, Bronchus

Synoniemen

- Beas-2B
- BEAS 2B
- BEAS2B
- Beas2B
- Bronchial Epithelium transformed with Ad12-SV40 2B

CLASSIFICATIE

Organisme	Mens
Seks	Man
Groei-eigenschappen	Aanhanger
GGO-status	GMO-S1

Details over de GGO-status

GMO-S1: This human bronchial epithelial cell line (BEAS-2B) contains an Ad12-SV40 hybrid construct introduced by transfection, enabling immortalization without viral particle release. The hybrid adenovirus/SV40 insert is stably integrated. This classification applies only within Germany and may differ elsewhere.

Bioveiligheidsniveau	1

KENMERKEN

Morfologie	Epitheelachtig

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IDENTIFICATIEGEGEVENS

Bronvermelding

BEAS-2B (Cytion catalogusnummer 300311)

NCBI-belastingnummer	9606
Cellosaurus	CVCL_0168

EXPRESSIE EN VATBAARHEID

Virussen

Ad12-SV40 hybride virus

Producten

Keratines, SV-40 T-antigeen

BEHANDELING EN KWEEK

Kweekmedium

Basaal medium voor luchtwegepitheelcellen (PromoCell GmbH)

Incubatieomgeving	37°C, 5%CO2, bevochtigde atmosfeer.

Supplementen

Vul het medium aan met Growth Medium Supplement Mix (PromoCell GmbH)

Dissociatiereagens	Accutase

Heruitplanten

Verwijder het oude medium van de adherente cellen en was ze met PBS zonder calcium en magnesium. Gebruik voor T25-flesjes 3-5 ml PBS en voor T75-flesjes 5-10 ml. Bedek de cellen vervolgens volledig met Accutase, met 1-2 ml voor T25-flesjes en 2,5 ml voor T75-flesjes. Laat de cellen gedurende 8-10 minuten bij kamertemperatuur incuberen om ze los te maken. Na incubatie de cellen voorzichtig mengen met 10 ml medium om ze te resuspenderen en vervolgens centrifugeren bij 300xg gedurende 3 minuten. Gooi het supernatant weg, resuspendeer de cellen in vers medium en breng ze over in nieuwe kolven die al vers medium bevatten.

Ontdooien en kweken

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KWALITEITSCONTROLE EN CRYOPRESERVATIE

Onvruchtbaarheid

Mycoplasmaverontreiniging wordt uitgesloten met zowel PCR-gebaseerde testen als op luminescentie gebaseerde mycoplasmadetectiemethoden.
Om er zeker van te zijn dat er geen besmetting is met bacteriën, schimmels of gisten, worden de celculturen dagelijks onderworpen aan visuele inspecties.

Kweekmedium invriezen	Als cryoconserveringsmedium gebruiken we volledig groeimedium (inclusief FBS) + 10% DMSO voor voldoende levensvatbaarheid na het ontdooien, of CM-1 (Cytion catalogusnummer 800100), dat geoptimaliseerde osmoprotectanten en metabolische stabilisatoren bevat om het herstel te verbeteren en door cryo geïnduceerde stress te verminderen.

Opslagvoorwaarden

Voor langdurige bewaring plaatst u flesjes in vloeibare stikstof in dampfase bij ongeveer -150 tot -196 °C. Opslag bij -80 °C is alleen aanvaardbaar als korte tussenstap vóór overbrenging naar vloeibare stikstof.

Verzendvoorwaarden

Gecryopreserveerde cellijnen worden verzonden op droog ijs in gevalideerde, geïsoleerde verpakkingen met voldoende koelmiddel om gedurende het transport ongeveer -78 °C te handhaven. Inspecteer de verpakking onmiddellijk na ontvangst en breng de flacons onverwijld over naar de juiste opslagplaats.

DONATEUR

Leeftijd van de donor	Leeftijd onbepaald

JURIDISCHE EN VEILIGHEIDSASPECTEN

Veiligheidsmaatregelen

Wanneer men van plan is om een cryovial in vloeibare stikstof op te slaan om later te ontdooien, is het verplicht om strenge veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Passende beschermende handschoenen en kleding zijn essentieel en het gebruik van een gezichtsmasker of veiligheidsbril is vereist tijdens het overbrengen van bevroren monsters naar of uit de tank met vloeibare stikstof. Dit is om het risico op letsel door mogelijke cryoviale explosies bij het verwijderen te beperken, wat kan resulteren in de projectie van scherpe fragmenten.

Garantie

Bij Cytion staan we achter de kwaliteit en levensvatbaarheid van onze producten.
We garanderen dat onze cellen levensvatbaar zijn bij het begin van de kweek gedurende 60 dagen na verzending vanuit onze faciliteiten.
We verzekeren dat alle materialen voldoen aan de specificaties beschreven in het analysecertificaat en/of productblad
Raadpleeg voor volledige informatie onze <a href=""/Wie-zijn-wij/Garantie/"" hreflang=""x-default"">Garantieverklaring

Er is een overeenkomst inzake materiaaloverdracht vereist	Yes