BEAS-2B

300311

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Popis

BEAS-2B je imortalizovaná bunková línia odvodená z bronchiálneho epitelu nenádorového jedinca. Táto bunková línia bola vytvorená transformáciou ľudských bronchiálnych epitelových buniek pomocou hybridného vírusu adenovírusu 12-SV40, ktorý bunkám poskytuje predĺženú životnosť pri zachovaní mnohých morfologických a funkčných charakteristík typických pre primárne bronchiálne epiteliálne bunky. Bunky BEAS-2B sa vďaka svojmu pôvodu z epitelu dýchacích ciest široko používajú vo výskume respiračných ochorení, najmä v štúdiách týkajúcich sa toxikologických a farmakologických účinkov vdychovaných látok.
Bunková línia vykazuje pri kultivácii morfológiu dlažobných kociek a zachováva si určité kritické vlastnosti, ako napríklad schopnosť metabolizovať xenobiotické zlúčeniny, vďaka čomu je veľmi dôležitá pre štúdie metabolizmu liečiv a respiračnej toxikológie. Takisto sa vo veľkej miere využívajú v štúdiách skúmajúcich bunkové mechanizmy astmy, chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP) a rakoviny. Bunky BEAS-2B predvídateľne reagujú na cytokíny, oxidačný stres a iné podnety typické pre vystavenie dýchacích ciest environmentálnym látkam. To z nich robí cenný model na štúdium mechanizmov zápalu a oxidačného stresu v pľúcnych bunkách.
Ako nástroj biomedicínskeho výskumu sa bunky BEAS-2B často používajú aj na hodnotenie karcinogénneho potenciálu častíc prenášaných vzduchom, kde slúžia ako model na pochopenie zmien v epitelových bunkách dýchacích ciest po vystavení karcinogénom. Ich genetické zloženie a náchylnosť na genetickú manipuláciu ďalej zvyšujú ich využiteľnosť v experimentoch molekulárnej biológie zameraných na pochopenie expresie génov a signálnych dráh, ktoré sa podieľajú na ochoreniach pľúc a vývoji rakoviny.

Tkanivo	Pľúca, bronchus

Synonymá

- Beas-2B
- BEAS 2B
- BEAS2B
- Beas2B
- Bronchial Epithelium transformed with Ad12-SV40 2B

KLASIFIKÁCIA

Organizmus	Človek
Sex	Muž
Rastové vlastnosti	Prívrženec
Stav GMO	GMO-S1

Podrobnosti o štatúte GMO

GMO-S1: This human bronchial epithelial cell line (BEAS-2B) contains an Ad12-SV40 hybrid construct introduced by transfection, enabling immortalization without viral particle release. The hybrid adenovirus/SV40 insert is stably integrated. This classification applies only within Germany and may differ elsewhere.

Úroveň biologickej bezpečnosti	1

CHARAKTERISTIKY

Morfológia	Epitelu podobné

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IDENTIFIKÁTORY

Citácia

BEAS-2B (katalógové číslo Cytion 300311)

Daňové identifikačné číslo NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_0168

PREJAV A NÁCHYLNOSŤ

Vírusy

Hybridný vírus Ad12-SV40

Produkty

Keratíny, SV-40 T antigén

MANIPULÁCIA A KULTIVÁCIA

Kultivačné médium

Základné médium pre epitelové bunky dýchacích ciest (PromoCell GmbH)

Inkubačná atmosféra	37 °C, 5 %CO2, zvlhčená atmosféra.

Doplnky stravy

Doplňte médium o rastové médium Growth Medium Supplement Mix (PromoCell GmbH)

Disociačné činidlo	Accutase

Rozmnožovanie kultúr

Odstráňte staré médium z adherovaných buniek a premyte ich PBS, ktorý neobsahuje vápnik a horčík. Pre banky T25 použite 3 - 5 ml PBS a pre banky T75 použite 5 - 10 ml. Potom bunky úplne pokryte Accutase, pričom použite 1 - 2 ml pre banky T25 a 2,5 ml pre banky T75. Nechajte bunky inkubovať pri izbovej teplote 8-10 minút, aby sa oddelili. Po inkubácii jemne premiešajte bunky s 10 ml média, aby boli znovu suspendované, a potom ich 3 minúty odstreďujte pri 300xg. Supernatant zlikvidujte, bunky znovu rozmiešajte v čerstvom médiu a preneste ich do nových fliaš, ktoré už obsahujú čerstvé médium.

Rozmrazovanie a kultivácia

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KVALITY A KRYOKONZERVÁCIA

Sterilita

Kontaminácia mykoplazmami sa vylučuje pomocou testov založených na PCR a metód detekcie mykoplaziem založených na luminiscencii. Aby sa zabezpečilo, že nedošlo ku kontaminácii baktériami, hubami alebo kvasinkami, bunkové kultúry sa denne vizuálne kontrolujú.

Mrazové médium	Ako kryokonzervačné médium používame kompletné rastové médium (vrátane FBS) + 10 % DMSO na zabezpečenie primeranej životaschopnosti po rozmrazení alebo CM-1 (katalógové číslo 800100 spoločnosti Cytion), ktoré obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory na zlepšenie obnovy a zníženie stresu spôsobeného kryo.

Podmienky skladovania

Na dlhodobé uchovávanie umiestnite injekčné liekovky do kvapalnej fázy dusíka v pare pri teplote približne -150 až -196 °C. Skladovanie pri teplote -80 °C je prijateľné len ako krátky prechodný krok pred presunom do tekutého dusíka.

Dopravné podmienky

Kryokonzervované bunkové línie sa prepravujú na suchom ľade v overených, izolovaných obaloch s dostatočným množstvom chladiva na udržanie teploty približne -78 °C počas celej prepravy. Po prijatí ihneď skontrolujte obal a bezodkladne premiestnite injekčné liekovky do vhodného skladu.

DARCA

Vek darcu	Vek nešpecifikovaný

PRÁVNE INFORMÁCIE A BEZPEČNOSŤ

Bezpečnostné opatrenia

Pri plánovaní uskladnenia kryovírusu v kvapalnom dusíku na budúce rozmrazenie je potrebné dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia. Vhodné ochranné rukavice a odev sú nevyhnutné a počas prenosu zmrazených vzoriek do nádrže s tekutým dusíkom alebo z nej sa vyžaduje používanie tvárovej masky alebo ochranných okuliarov. Je to z dôvodu zníženia rizika poranenia v dôsledku možnej explózie kryovírusu pri vyberaní, ktorá môže mať za následok vymrštenie ostrých úlomkov.

Záruka

V spoločnosti Cytion si stojíme za kvalitou a životaschopnosťou našich produktov.
Garantujeme, že naše bunky budú životaschopné na začiatku kultivácie počas 60 dní po odoslaní z našich zariadení.
Zaručujeme, že všetky materiály zodpovedajú špecifikáciám opísaným v certifikáte analýzy a/alebo v produktovom liste
Úplné informácie nájdete v našom <a href=""/Kto sme/záruka/"" hreflang=""x-default"">Vyhlásení o záruke

Je potrebná dohoda o prenose materiálu	Yes