PC3

300312

OBECNÉ INFORMACE

Popis

Buňky PC3, získané z kostní metastázy 62letého muže kavkazského původu s adenokarcinomem prostaty IV. stupně, jsou základním kamenem při studiu lidského karcinomu prostaty. Buněčná linie lidského karcinomu prostaty PC-3 je široce využívána pro studium molekulárních a buněčných aspektů karcinomu prostaty, zejména v souvislosti s metastatickým onemocněním. Jejich vysoký metastatický potenciál z nich činí cenný model pro pokročilý výzkum karcinomu prostaty.
Buňky PC3 jako epiteliální buňky nereagují na androgeny a jsou nezávislé na typických růstových faktorech, jako jsou glukokortikoidy nebo fibroblastové růstové faktory, což je mezi buňkami lidského karcinomu prostaty staví do jedinečné pozice pro studium vlivu koenimbinu a dalších potenciálních terapeutických látek.
Absence exprese prostatického specifického antigenu (PSA) a nízká aktivita testosteron-5-alfa reduktázy a kyselé fosfatázy odlišuje PC3 od jiných buněčných modelů karcinomu prostaty, jako jsou LNCaP a DU145, z nichž první je známý expresí luminálních diferenciačních markerů, jako jsou AR a PSA, a druhý představuje mírný metastatický potenciál karcinomu prostaty.
Úlohu buněčné linie karcinomu prostaty PC3 ve výzkumu kmenových buněk karcinomu prostaty navíc podtrhuje pozorování, že podskupina tvoří holokmeny kmenových buněk karcinomu. Tato vlastnost činí z buněčné linie PC3 kritický model pro studium nádorového prostředí, zejména prostřednictvím xenotransplantačních modelů, kdy se xenotransplantované nádory PC3 používají ke zkoumání růstu nádoru a odpovědi na terapii in vivo.
Souhrnně lze říci, že buňky PC3, pocházející z adenokarcinomu prostaty IV. stupně, slouží jako klíčový model ve výzkumu karcinomu prostaty díky svému vysokému metastatickému potenciálu, jedinečné nezávislosti na androgenech a odlišným buněčným vlastnostem. Jejich všestrannost sahá od molekulárních studií metastáz až po zkoumání terapeutických reakcí a výzkum kmenových buněk karcinomu prostaty, což z nich činí neocenitelný zdroj pro lepší pochopení složitosti karcinomu prostaty a potenciální léčby.

Tkáň	Prostata
Nemoc	Adenokarcinom
Místo metastázy	Kost

Aplikace

Transfekční hostitel

Synonyma

- PC-3
- PC.3

KLASIFIKACE

Organismus	Člověk
Sex	Muž
Růstové vlastnosti	Adhezivní a suspenzní
Úroveň biologické bezpečnosti	1

CHARAKTERISTIKA

Morfologie	Epitelu podobné
Tumorogenní	Ano, u nahých myší

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Karyotyp

Karyotyp buněk PC3 je pozoruhodný tím, že je triploidní a obsahuje mnoho chromozomálních abnormalit, které přispívají k jejich agresivní povaze.

Doba zdvojnásobení	40 hodin

IDENTIFIKÁTORY

Citace

PC3 (katalogové číslo Cytion 300312)

Daňové identifikační číslo NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_0035

EXPRESE A NÁCHYLNOST

Exprese antigenu

HLA A1, A9

MANIPULACE A CHOV

Pěstovací médium

DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3,1 g/l glukózy, w: 2,5 mM L-Glutaminu, w: 15 mM HEPES, w: 0,5 mM pyruvátu sodného, w: 1,2 g/l NaHCO3 (číslo výrobku Cytion 820400a)

Inkubační atmosféra	37 °C, 5 %CO2, zvlhčená atmosféra.

Doplňky stravy

Doplňte médium o 5 % FBS

Disociační činidlo	Accutase

Subkultivace

Odstraňte staré médium z adherovaných buněk a promyjte je PBS bez vápníku a hořčíku. Pro baňky T25 použijte 3-5 ml PBS a pro baňky T75 5-10 ml. Poté buňky zcela zakryjte přípravkem Accutase, přičemž použijte 1-2 ml pro baňky T25 a 2,5 ml pro baňky T75. Nechte buňky inkubovat při pokojové teplotě po dobu 8-10 minut, aby se oddělily. Po inkubaci jemně promíchejte buňky s 10 ml média, aby byly znovu suspendovány, a poté je odstřeďte při 300xg po dobu 3 minut. Supernatant vyhoďte, buňky znovu rozpusťte v čerstvém médiu a přeneste je do nových baněk, které již obsahují čerstvé médium.

Hustota výsevu	Začněte s 3 x 10^4 buňkami/cm^2. Po regeneraci buněk použijte pro následující kroky dělení hustotu osiva 1 x 10^4 buněk/cm^2.
Obnova tekutin	2 až 3krát týdně
Zotavení po rozmrazení	Po rozmrazení naneste buňky v množství 5 x 10^4 buněk/cm^2 a nechte je alespoň 24 hodin zotavit se z procesu zmrazení a přilnout.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Rozmrazování a kultivace

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KVALITY A KRYOKONZERVACE

Sterilita

Kontaminace mykoplazmaty je vyloučena jak pomocí testů založených na PCR, tak pomocí luminiscenčních metod detekce mykoplazmy. Aby se zajistilo, že nedojde ke kontaminaci bakteriemi, plísněmi nebo kvasinkami, jsou buněčné kultury denně podrobovány vizuálním kontrolám.

Mrazicí médium	Jako kryokonzervační médium používáme kompletní růstové médium (včetně FBS) + 10 % DMSO pro zajištění dostatečné životaschopnosti po rozmrazení nebo CM-1 (katalogové číslo 800100 společnosti Cytion), které obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory pro zlepšení regenerace a snížení stresu způsobeného kryo.

Podmínky skladování

Pro dlouhodobé uchování umístěte lahvičky do kapalného dusíku v plynné fázi při teplotě přibližně -150 až -196 °C. Skladování při -80 °C je přijatelné pouze jako krátký přechodný krok před přemístěním do kapalného dusíku.

Dopravní podmínky

Kryokonzervované buněčné linie se přepravují na suchém ledu v ověřených, izolovaných obalech s dostatečným množstvím chladiva, aby se po celou dobu přepravy udržovala teplota přibližně -78 °C. Po obdržení ihned zkontrolujte obal a neprodleně přeneste lahvičky do vhodného skladu.

DÁRCE

Věk dárce	62 let
Etnická příslušnost	Kavkazský

PRÁVNÍ INFORMACE A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Bezpečnostní opatření

Při plánování uložení kryovialu v kapalném dusíku pro budoucí rozmrazení je nutné dodržovat přísná bezpečnostní opatření. Nezbytné jsou vhodné ochranné rukavice a oděv a při přenášení zmrazených vzorků do nádrže s kapalným dusíkem nebo z ní je nutné používat obličejovou masku nebo ochranné brýle. To proto, aby se snížilo riziko zranění v důsledku možných výbuchů kryovialů při jejich vyjímání, které mohou mít za následek vystřelování ostrých úlomků.

Záruka

Ve společnosti Cytion si stojíme za kvalitou a životaschopností našich produktů.
Zaručujeme, že naše buňky budou životaschopné na začátku kultivace po dobu 60 dnů po odeslání z našich zařízení.
Zaručujeme, že všechny materiály odpovídají specifikacím popsaným v certifikátu analýzy a/nebo v produktovém listu
Úplné informace naleznete v našem <a href=""/Kdo-jsme/Záruka/"" hreflang=""x-default"">Záručním prohlášení

Je nutná smlouva o převodu materiálu	Yes