Caov-3

300319

INFORMASI UMUM

Deskripsi

Sel Caov-3 berasal dari ovarium seorang wanita Kaukasia berusia 54 tahun yang menderita adenokarsinoma, yang menyediakan model representatif bagi para peneliti untuk kanker ovarium tingkat tinggi. Garis sel ini didirikan pada tahun 1976 dan sejak saat itu telah digunakan dalam berbagai penelitian.
Dengan morfologi epitelnya, sel Caov-3 sangat mirip dengan karakteristik sel kanker ovarium primer. Ketika dikultur, sel-sel ini membentuk koloni padat yang meniru perilaku yang diamati dalam tubuh manusia. Sifat uniknya menjadikannya pilihan ideal bagi para peneliti yang mempelajari pertumbuhan, perilaku, dan respons sel kanker ovarium.
Temuan penting dalam bidang ini adalah efek asam retinoat all-trans pada sel Caov-3. Penelitian telah menunjukkan bahwa senyawa ini menekan pertumbuhan sel kanker ovarium ini secara in vitro. Selain itu, sel Caov-3 mengekspresikan berbagai antigen terkait tumor, termasuk NB/70K, CA-125, Ba-2, dan Ca-1, yang meningkatkan kegunaannya untuk penelitian terapi dan imunoterapi yang ditargetkan.
Genom sel Caov-3 menunjukkan kelainan yang signifikan yang menjelaskan sifat tumorigeniknya. Sebagai contoh, sel-sel ini memiliki mutasi yang tidak masuk akal pada gen penekan tumor p53 dan memiliki banyak salinan onkogen kanker ovarium PIK3CA, yang memainkan peran penting dalam perkembangan dan perkembangan kanker. Dalam hal sensitivitas obat, sel Caov-3 merespons beberapa agen kemoterapi yang umum digunakan.
Vinblastine, cisplatin dan adriamycin telah terbukti memiliki efek pada sel-sel ini. Karakteristik lain dari sel Caov-3 adalah perilakunya dalam kondisi kultur yang berbeda. Meskipun sel-sel ini tidak tumbuh dalam agar lunak, mereka menunjukkan sifat tumorigenik ketika disuntikkan ke tikus yang mengalami gangguan kekebalan. Oleh karena itu, di antara banyak aplikasinya dalam penelitian, sel Caov-3 sangat cocok untuk eksperimen kultur sel 3D.
Karena morfologi epitelnya dan kemampuannya untuk membentuk koloni yang padat, sel ini merupakan pilihan ideal untuk mempelajari interaksi sel-sel, organisasi jaringan, dan perilaku sel kanker ovarium dalam lingkungan yang lebih relevan secara fisiologis. Namun, waktu penggandaan yang lama, sekitar 78 jam, harus dipertimbangkan dalam desain eksperimental.

Tisu	Ovarium
Penyakit	Adenokarsinoma serosa ovarium tingkat tinggi

Sinonim

- CaOv-3
- CaOV-3
- CAOV-3
- CAOV3
- CaOV3
- CaOv3
- Caov3
- CA-OV-3

KLASIFIKASI

Organisme	Manusia
Seks	Perempuan
Sifat-sifat pertumbuhan	Pengikut
Tingkat keamanan hayati	1

KARAKTERISTIK

Morfologi	Seperti epitel

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

PENGIDENTIFIKASI

Referensi

Caov-3 (nomor katalog Cytion 300319)

Nomor Identifikasi Pajak NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_0201

EKSPRESI DAN KERENTANAN

Isoenzim

AK-1, 1, ES-D, 1, G6PD, B, GLO-I, 1-2, Me-2, 2, PGM1, 1, PGM3, 1

PENANGANAN DAN BUDIDAYA

Media kultur

DMEM, w: 4,5 g/L Glukosa, w: 4 mM L-Glutamin, w: 3,7 g/L NaHCO3, w: 1,0 mM Natrium piruvat (Nomor artikel Cytion 820300a)

Suasana inkubasi	37°C, 5%CO2, atmosfer yang dilembabkan.

Suplemen

Tambahkan media dengan 10% FBS

Reagen disosiasi	TrypLE Express 10 menit pada suhu 37°C

Perbanyakan sel

Buang media lama dari sel yang melekat dan cuci dengan PBS yang tidak mengandung kalsium dan magnesium. Untuk labu T25, gunakan 3-5 ml PBS, dan untuk labu T75, gunakan 5-10 ml. Kemudian, tutupi sel sepenuhnya dengan Accutase, menggunakan 1-2 ml untuk labu T25 dan 2,5 ml untuk labu T75. Biarkan sel diinkubasi pada suhu kamar selama 8-10 menit untuk melepaskannya. Setelah inkubasi, campurkan sel secara perlahan dengan 10 ml medium untuk meresuspensi sel, kemudian sentrifugasi pada 300xg selama 3 menit. Buang supernatan, resuspensi sel dalam medium segar, dan pindahkan ke dalam labu baru yang sudah berisi medium segar.

Pencairan dan pembiakan

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

PENGENDALIAN MUTU DAN KRIOPRESERVASI

Kemandulan

Kontaminasi mikoplasma disingkirkan dengan menggunakan tes berbasis PCR dan metode deteksi mikoplasma berbasis pendaran. Untuk memastikan tidak ada kontaminasi bakteri, jamur, atau ragi, kultur sel menjalani inspeksi visual setiap hari.

Media pembekuan	Sebagai media kriopreservasi, kami menggunakan media pertumbuhan lengkap (termasuk FBS) + 10% DMSO untuk viabilitas pasca-pencairan yang memadai, atau CM-1 (nomor katalog Cytion 800100), yang mencakup osmoprotektan yang dioptimalkan dan penstabil metabolisme untuk meningkatkan pemulihan dan mengurangi stres yang diinduksi kriopreservasi.

Kondisi penyimpanan

Untuk pengawetan jangka panjang, tempatkan botol dalam nitrogen cair fase uap pada suhu sekitar -150 hingga -196 °C. Penyimpanan pada suhu -80 °C hanya dapat diterima sebagai langkah sementara sebelum dipindahkan ke nitrogen cair.

Ketentuan pengiriman

Lini sel kriopreservasi dikirim di atas es kering dalam kemasan terisolasi yang divalidasi dengan refrigeran yang cukup untuk mempertahankan suhu sekitar -78 ° C selama perjalanan. Setelah diterima, segera periksa wadah dan pindahkan botol tanpa penundaan ke tempat penyimpanan yang sesuai.

DONATUR

Usia donor	54 tahun
Etnis	Eropa

HUKUM DAN KESELAMATAN

Tindakan pencegahan keselamatan

Ketika berencana menyimpan kriovial dalam nitrogen cair untuk pencairan di masa mendatang, Anda wajib mematuhi langkah-langkah keamanan yang ketat. Sarung tangan dan pakaian pelindung yang tepat sangat penting, dan penggunaan masker wajah atau kacamata pengaman diperlukan selama pemindahan sampel beku ke atau dari tangki nitrogen cair. Hal ini untuk mengurangi risiko cedera akibat potensi ledakan cryovial pada saat pemindahan, yang dapat mengakibatkan proyeksi fragmen tajam.

Garansi

Di Cytion, kami mendukung kualitas dan kelangsungan hidup produk kami.
Kami menjamin bahwa sel kami akan dapat bertahan hidup pada awal kultur selama 60 hari setelah pengiriman dari fasilitas kami.
Kami menjamin bahwa semua bahan sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan dalam Sertifikat Analisis dan / atau Lembar Produk
Untuk detail lengkap, silakan merujuk ke <a href=""/Siapa-kami-Garansi/Garansi/"" hreflang=""x-default"">Pernyataan Jaminan kami

Diperlukan Perjanjian Transfer Material	Yes