Caov-3

300319

SPLOŠNE INFORMACIJE

Opis

Celice Caov-3, pridobljene iz jajčnika 54-letne kavkaške ženske z adenokarcinomom, raziskovalcem zagotavljajo reprezentativen model raka jajčnikov visoke stopnje. Celična linija je bila vzpostavljena leta 1976 in je bila od takrat uporabljena v številnih študijah.
S svojo epitelijsko morfologijo so celice Caov-3 zelo podobne značilnostim primarnih celic raka jajčnikov. Pri gojenju te celice tvorijo goste kolonije, ki posnemajo obnašanje v človeškem telesu. Zaradi svojih edinstvenih lastnosti so idealna izbira za raziskovalce, ki preučujejo rast, obnašanje in odziv celic raka jajčnikov.
Pomembna ugotovitev na tem področju je učinek all-trans retinojske kisline na celice Caov-3. Študije so pokazale, da ta spojina zavira rast teh celic raka jajčnikov in vitro. Poleg tega celice Caov-3 izražajo različne s tumorjem povezane antigene, vključno z NB/70K, CA-125, Ba-2 in Ca-1, kar povečuje njihovo uporabnost za raziskave ciljanih terapij in imunoterapij.
Genom celic Caov-3 ima pomembne nepravilnosti, ki pojasnjujejo njihove tumorogene lastnosti. Te celice imajo na primer nesmiselno mutacijo v tumorskem supresorskem genu p53 in več kopij onkogena raka jajčnikov PIK3CA, ki ima ključno vlogo pri razvoju in napredovanju raka. Glede občutljivosti na zdravila se celice Caov-3 odzivajo na več pogosto uporabljenih kemoterapevtikov.
Dokazano je, da na te celice delujejo vinblastin, cisplatin in adriamicin. Druga značilnost celic Caov-3 je njihovo obnašanje v različnih pogojih gojenja. Čeprav te celice ne rastejo v mehkem agarju, kažejo tumorogene lastnosti, ko jih vbrizgamo v imunsko oslabljene miši. Zato so celice Caov-3 med številnimi uporabami v raziskavah še posebej primerne za poskuse s 3D celičnimi kulturami.
Zaradi svoje epitelijske morfologije in sposobnosti tvorjenja gostih kolonij so idealna izbira za preučevanje interakcij med celicami, organizacije tkiva in obnašanja celic raka jajčnikov v fiziološko ustreznejšem okolju. Vendar je treba pri načrtovanju poskusov upoštevati dolg čas podvojitve, ki znaša približno 78 ur.

Tkivo	Jajčnik
Bolezen	Serozni adenokarcinom jajčnika visoke stopnje

Sinonimi

- CaOv-3
- CaOV-3
- CAOV-3
- CAOV3
- CaOV3
- CaOv3
- Caov3
- CA-OV-3

RAZVRSTITEV

Organizem	Človek
Seks	Ženska
Lastnosti rasti	Pripadnik
Stopnja biološke varnosti	1

ZNAČILNOSTI

Morfologija	Epitelijam podobni

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IDENTIFIKATORJI

Navajanje vira

Caov-3 (kataloška številka Cytion 300319)

Davčna identifikacijska številka NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_0201

IZRAŽANJE IN DOVZETNOST

Izoenzimi

AK-1, 1, ES-D, 1, G6PD, B, GLO-I, 1-2, Me-2, 2, PGM1, 1, PGM3, 1

RAVNANJE IN GOJENJE

Gojišče

DMEM, w: 4,5 g/L glukoze, w: 4 mM L-glutamina, w: 3,7 g/L NaHCO3, w: 1,0 mM natrijevega piruvata (številka izdelka Cytion 820300a)

Inkubacijska atmosfera	37 °C, 5 %CO2, vlažno ozračje.

Prehranska dopolnila

Gojišče dopolnite z 10 % FBS

Reagenca za disociacijo	TrypLE Express 10 min pri 37 °C

Preusmeritev v drugo kulturo

Odstranite staro gojišče z adherentnih celic in jih sperite s PBS, ki ne vsebuje kalcija in magnezija. Za bučke T25 uporabite 3-5 ml PBS, za bučke T75 pa 5-10 ml. Nato celice popolnoma prekrijte z Accutase, pri čemer uporabite 1-2 ml za bučke T25 in 2,5 ml za bučke T75. Celice pustite inkubirati pri sobni temperaturi 8-10 minut, da se ločijo. Po inkubaciji celice nežno premešajte z 10 ml gojišča, da se ponovno suspendirajo, nato jih 3 minute centrifugirajte pri 300xg. Zavrzite supernatant, ponovno suspendirajte celice v svežem gojišču in jih prenesite v nove bučke, ki že vsebujejo sveže gojišče.

Odtaljevanje in gojenje

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KAKOVOSTI IN KRIOPREZERVACIJA

Sterilnost

Kontaminacija z mikoplazmo se izključi z uporabo testov na podlagi PCR in metod za odkrivanje mikoplazme na podlagi luminiscence. Da se zagotovi, da ni kontaminacije z bakterijami, glivami ali kvasovkami, se celične kulture dnevno vizualno pregledujejo.

Medij za zamrzovanje	Kot gojišče za kriokonzervacijo uporabljamo popolno rastno gojišče (vključno s FBS) + 10 % DMSO za ustrezno vitalnost po odmrznitvi ali CM-1 (kataloška številka 800100 podjetja Cytion), ki vključuje optimizirane osmoprotektante in presnovne stabilizatorje za izboljšanje okrevanja in zmanjšanje stresa, povzročenega s kriom.

Pogoji shranjevanja

Za dolgotrajno shranjevanje viale postavite v tekoči dušik v parni fazi pri približno -150 do -196 °C. Shranjevanje pri -80 °C je sprejemljivo le kot kratek vmesni korak pred prenosom v tekoči dušik.

Pogoji dostave

Kriokonzervirane celične linije se pošiljajo na suhem ledu v potrjeni, izolirani embalaži z zadostno količino hladilnega sredstva, da se med prevozom vzdržuje približno -78 °C. Ob prejemu takoj preglejte embalažo in viale nemudoma prenesite v ustrezno skladišče.

DONATOR

Starost darovalca	54 let
Etnična pripadnost	Evropski

PRAVNE ZADEVE IN VARNOST

Varnostni ukrepi

Pri načrtovanju shranjevanja kriovialov v tekočem dušiku za kasnejše odtaljevanje je treba obvezno upoštevati stroge varnostne ukrepe. Nujni so ustrezne zaščitne rokavice in oblačila, med prenosom zamrznjenih vzorcev v rezervoar s tekočim dušikom ali iz njega pa je potrebna uporaba obrazne maske ali zaščitnih očal. S tem se zmanjša tveganje poškodb zaradi morebitnih eksplozij kriovialov pri odstranjevanju, ki lahko povzročijo izstrelitev ostrih delcev.

Garancija

V podjetju Cytіon stojimo za kakovostjo in uporabnostjo svojih izdelkov.
Zagotavljamo, da bodo naše celice ob začetku gojenja še 60 dni po odpremi iz naših obratov vitalne.
Zagotavljamo, da so vsi materiali skladni s specifikacijami, opisanimi v potrdilu o analizi in/ali listu izdelka
Za vse podrobnosti si oglejte našo <a href=""/Kdo smo/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garancijsko izjavo

Potreben je sporazum o prenosu materiala	Yes