Caov-3

300319

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Опис

Клітини Caov-3, отримані з яєчника 54-річної європеоїдної жінки з аденокарциномою, надають дослідникам репрезентативну модель раку яєчників високого ступеня злоякісності. Клітинна лінія була створена в 1976 році і з тих пір використовується в численних дослідженнях.
За своєю епітеліальною морфологією клітини Caov-3 дуже нагадують характеристики клітин первинного раку яєчників. При культивуванні ці клітини утворюють щільно упаковані колонії, які імітують поведінку, що спостерігається в людському організмі. Їхні унікальні властивості роблять їх ідеальним вибором для дослідників, які вивчають ріст, поведінку та реакцію клітин раку яєчників.
Важливим відкриттям у цій галузі є вплив олл-транс-ретиноєвої кислоти на клітини Caov-3. Дослідження показали, що ця сполука пригнічує ріст цих клітин раку яєчників in vitro. Крім того, клітини Caov-3 експресують різні пухлиноасоційовані антигени, включаючи NB/70K, CA-125, Ba-2 і Ca-1, що підвищує їхню корисність для досліджень таргетної терапії та імунотерапії.
Геном клітин Caov-3 має значні аномалії, що пояснюють їхні пухлинні властивості. Наприклад, ці клітини мають нонсенс-мутацію в гені-супресорі пухлин p53 і володіють множинними копіями онкогена раку яєчників PIK3CA, який відіграє важливу роль у розвитку і прогресуванні раку. З точки зору медикаментозної чутливості клітини Caov-3 реагують на кілька поширених хіміотерапевтичних препаратів.
Показано, що вінбластин, цисплатин та адріаміцин впливають на ці клітини. Іншою характеристикою клітин Caov-3 є їхня поведінка за різних умов культивування. Хоча ці клітини не ростуть у м'якому агарі, вони проявляють пухлинні властивості при введенні мишам з ослабленим імунітетом. Тому, серед багатьох застосувань у дослідженнях, клітини Caov-3 особливо підходять для експериментів з 3D-культурою клітин.
Завдяки своїй епітеліальній морфології та здатності утворювати щільні колонії, вони є ідеальним вибором для вивчення міжклітинних взаємодій, тканинної організації та поведінки клітин раку яєчників у більш фізіологічно релевантному середовищі. Однак при плануванні експерименту необхідно враховувати тривалий час подвоєння, що становить приблизно 78 годин.

Тканина	Яєчник
Хвороба	Серозна аденокарцинома яєчників високого ступеня

Синоніми

- CaOv-3
- CaOV-3
- CAOV-3
- CAOV3
- CaOV3
- CaOv3
- Caov3
- CA-OV-3

КЛАСИФІКАЦІЯ

Організм	Людина
Секс	Жінка
Характеристики росту	Прихильник
Рівень біобезпеки	1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Морфологія	Епітеліальноподібні

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

ІДЕНТИФІКАТОРИ

Посилання

Caov-3 (номер за каталогом Cytion 300319)

Ідентифікаційний номер платника податків NCBI	9606
Целозавр	CVCL_0201

ЕКСПРЕСІЯ ТА СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ

Ізоферменти

AK-1, 1, ES-D, 1, G6PD, B, GLO-I, 1-2, Me-2, 2, PGM1, 1, PGM3, 1

ОБРОБКА ТА ВИРОЩУВАННЯ

Живильне середовище

ДМЕМ, w: 4,5 г/л Глюкоза, w: 4 мМ L-глутамін, w: 3,7 г/л NaHCO3, w: 1,0 мМ піруват натрію (цит. номер 820300a)

Атмосфера інкубації	37°C, 5% CO2, волога атмосфера.

Добавки

Додайте до середовища 10% FBS

Реагент для дисоціації	TrypLE Express 10 хв при 37°C

Пересадка в нове середовище

Видаліть старе середовище з прилиплих клітин і промийте їх PBS, в якому бракує кальцію і магнію. Для колб T25 використовуйте 3-5 мл PBS, а для колб T75 - 5-10 мл. Потім повністю покрийте клітини аккутазою, використовуючи 1-2 мл для колб T25 і 2,5 мл для колб T75. Залиште клітини інкубуватися при кімнатній температурі протягом 8-10 хвилин, щоб відокремити їх. Після інкубації обережно змішайте клітини з 10 мл середовища, щоб ресуспендувати їх, а потім центрифугуйте при 300xg протягом 3 хвилин. Викиньте надосадову рідину, ресуспендуйте клітини у свіжому середовищі та перенесіть їх у нові колби, які вже містять свіже середовище.

Розморожування та культивування

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА КРІОКОНСЕРВАЦІЯ

Стерильність

Зараження мікоплазмою виключається за допомогою аналізів на основі ПЛР та люмінесцентних методів виявлення мікоплазми. Щоб переконатися у відсутності бактеріального, грибкового або дріжджового забруднення, клітинні культури піддаються щоденному візуальному контролю.

Середовище для заморожування	Як середовище кріоконсервування ми використовуємо повне живильне середовище (включаючи FBS) + 10% ДМСО для адекватної життєздатності після відтавання або CM-1 (номер за каталогом Cytion 800100), до складу якого входять оптимізовані осмопротектори та метаболічні стабілізатори для прискорення відновлення та зменшення кріоіндукованого стресу.

Умови зберігання

Для тривалого зберігання помістіть флакони в парофазний рідкий азот при температурі від -150 до -196 °C. Зберігання при -80 °C допустиме лише як короткий проміжний етап перед перенесенням у рідкий азот.

Умови доставки

Кріоконсервовані клітинні лінії транспортуються на сухому льоду в перевіреній ізольованій упаковці з достатньою кількістю холодоагенту для підтримання температури приблизно -78 °C під час транспортування. При отриманні негайно огляньте контейнер і без зволікань перемістіть флакони у відповідне місце зберігання.

ДОНОР

Вік донора	54 роки
Етнічна приналежність	Європейський

ПРАВОВІ ПИТАННЯ ТА БЕЗПЕКА

Заходи безпеки

Плануючи зберігати кріовіал у рідкому азоті для подальшого розморожування, обов'язково слід дотримуватися суворих заходів безпеки. Під час перенесення заморожених зразків до резервуара з рідким азотом або з нього необхідно використовувати захисні рукавички та одяг, а також маску або захисні окуляри. Це необхідно для того, щоб зменшити ризик травмування від потенційних кріогенних вибухів при вилученні, які можуть призвести до розльоту гострих осколків.

Гарантія

У Cytion ми відповідаємо за якість та життєздатність нашої продукції.
Ми гарантуємо, що наші клітини будуть життєздатними на початку культивування протягом 60 днів після відвантаження з нашого заводу.
Ми запевняємо, що всі матеріали відповідають специфікаціям, описаним у сертифікаті аналізу та/або паспорті продукту
Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, зверніться до нашого Заяви про гарантію

Необхідна угода про передачу матеріалів	Yes