SaOS-2

300331

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Описание

Клетките Saos-2 са клетъчна линия на остеосарком, получена от първичния остеогенен сарком на 11-годишна кавказка жена. Тези клетки са широко признат модел за изучаване на остеосарком и костна биология поради остеобластните им характеристики и способността им да произвеждат подобен на кост извънклетъчен матрикс.
Характеризиращи се с високо ниво на алкална фосфатазна активност и експресия на специфични за костите протеини като остеокалцин и остеопонтин, клетките Saos-2 служат като ефективна in vitro система за изследване на костното формиране и патофизиологията на остеосарком. Те са особено ценни за изследване на клетъчните реакции към различни биохимични стимули и механични сили, които имитират костната среда.
Клетките Saos-2 също така показват анеуплоиден кариотип, без няколко хромозоми, но с допълнителни копия на други, което е характерно за много ракови клетъчни линии. Те са отрицателни за микоплазма и притежават стабилна способност за калцификация, което ги прави подходящи за изследвания, свързани с отлагането на минерали.
В контекста на раковите изследвания клетките Saos-2 се използват широко за изследване на молекулярните механизми на туморогенезата, метастазирането и въздействието на противораковите лекарства върху остеосарком. Клетките се използват и за изследване на профилите на генна експресия, свързани с остеобластната диференциация и злокачествеността.
Благодарение на високата си трансфектируемост клетките Saos-2 се поддават на генетични манипулации, което позволява изучаване на генната функция и потвърждаване на молекулярни цели за терапевтична намеса. Тази приспособимост улеснява значителния напредък в разбирането на генетичната и молекулярната основа на костния рак и в разработването на целеви лечения за остеосарком.

Тъкан	Bone
Заболяване	Остеосарком

Синоними

- SAOS-2
- Saos-2
- SAOS 2
- Saos 2
- Saos2
- SaOs2
- SAOS2
- Sarcoma OSteogenic-2
- SaOS
- SAOS

КЛАСИФИКАЦИЯ

Организъм	Човек
Секс	Женски
Свойства, свързани с растежа	Привърженик
Ниво на биологична безопасност	1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Морфология	Подобни на епител

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Туморогенен	Не
Статус на MSI	Стабилен (MSS)

Кариотип

Стволовият хромозомен брой е хипотриплоиден с модален брой от 56 хромозоми на клетка, а компонентът 2S се среща в 13,2 %. Над две трети от хромозомния комплемент се състои от структурно пренаредени хромозоми. Повечето маркерни хромозоми имат сложни пренареждания. Произходът на сегментите, съставящи тези маркери, не може да бъде установен. От разпознаваемите маркери, 6p+/q+, 7p+, 11p+ и 12p+ понякога са присъствали в 2 копия на клетка. Y-хромозомата не е открита в оцветения с QM препарат.

Време за удвояване	35 до 40 часа

ИДЕНТИФИКАТОРИ

Източник

SaOS-2 (каталожен номер 300331 на Cytion)

Данъчен идентификационен номер в NCBI	9606
Целозавър	CVCL_0548

ПРОЯВА И ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНОСТ

Експресирани рецептори

Епидермален растежен фактор (EGF), трансформиращ растежен фактор бета (тип 1 и тип 2)

Експресия на антигена

Кръвна група B, Rh+, HLA A2, A3, Bw16, Bw47

Изоензими

Me-2, 1, PGM3, 1-2, PGM1, 1-2, ES-D, 2, AK-1, 1, GLO-1, 2, G6PD, B, продукт за честота на фенотипа: 0.0002

ОБРАБОТКА И ОТГЛЕЖДАНЕ

Хранителна среда

DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3,1 g/L глюкоза, w: 2,5 mM L-глутамин, w: 15 mM HEPES, w: 0,5 mM натриев пируват, w: 1,2 g/L NaHCO3 (номер на изделието на Cytion 820400a)

Атмосфера за инкубация	37°C, 5%CO2, овлажнена атмосфера.

Добавки

Допълнете средата с 10% FBS

Реагент за дисоциация	Accutase

Пресаждане

Отстранете старата среда от адхезивните клетки и ги промийте с PBS, която не съдържа калций и магнезий. За колби T25 използвайте 3-5 ml PBS, а за колби T75 - 5-10 ml. След това покрийте клетките изцяло с Accutase, като използвате 1-2 ml за колби T25 и 2,5 ml за колби T75. Оставете клетките да се инкубират на стайна температура за 8-10 минути, за да се отделят. След инкубацията внимателно разбъркайте клетките с 10 ml среда, за да ги ресуспендирате, след което центрофугирайте при 300xg за 3 минути. Изхвърлете супернатантата, ресуспендирайте клетките в прясна среда и ги прехвърлете в нови колби, които вече съдържат прясна среда.

Плътност на засяването	1 x 10^4 клетки/cm^2
Обновяване на течността	2 до 3 пъти седмично
Възстановяване след размразяване	Бърз

Размразяване и култивиране

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И КРИОКОНСЕРВАЦИЯ

Стерилност

Замърсяването с микоплазма се изключва както чрез PCR-базирани анализи, така и чрез луминесцентни методи за откриване на микоплазма.
За да се гарантира, че няма бактериално, гъбично или дрождево замърсяване, клетъчните култури се подлагат на ежедневни визуални проверки.

Среда за замразяване	Като среда за криоконсервация използваме пълна среда за растеж (включително FBS) + 10% DMSO за адекватна жизнеспособност след размразяване или CM-1 (каталожен номер 800100 на Cytion), която включва оптимизирани осмопротектори и метаболитни стабилизатори за подобряване на възстановяването и намаляване на криоиндуцирания стрес.

Условия за съхранение

За дълготрайно съхранение поставете флаконите в течен азот в парна фаза при температура около -150 до -196 °C. Съхранението при -80 °C е приемливо само като кратък междинен етап преди прехвърлянето в течен азот.

Условия за доставка

Криоконсервираните клетъчни линии се транспортират върху сух лед в утвърдени, изолирани опаковки с достатъчно хладилен агент, за да се поддържа приблизително -78 °C по време на транспортирането. При получаването незабавно прегледайте опаковката и незабавно прехвърлете флаконите за подходящо съхранение.

ДАРИТЕЛ

Възраст на донора	11 години
Етническа принадлежност	Кавказки

ПРАВНИ ВЪПРОСИ И БЕЗОПАСНОСТ

Мерки за безопасност

Когато планирате да съхранявате криопрепарат в течен азот за бъдещо размразяване, е задължително да спазвате строги мерки за безопасност. Подходящите защитни ръкавици и облекло са от съществено значение, а по време на прехвърлянето на замразени проби към или от резервоара с течен азот е необходимо да се използва маска за лице или предпазни очила. Това се прави, за да се намали рискът от нараняване от потенциални експлозии на криовиолите при изваждането им, които могат да доведат до изхвърляне на остри фрагменти.

Гаранция

Ние в Cytion заставаме зад качеството и жизнеспособността на нашите продукти.
Гарантираме, че нашите клетки ще бъдат жизнеспособни в началото на култивирането в продължение на 60 дни след изпращането им от нашите съоръжения.
Гарантираме, че всички материали отговарят на спецификациите, описани в сертификата за анализ и/или продуктовата листа
За пълни подробности, моля, направете справка с нашата <a href=""/Кои сме ние/Гаранция/"" hreflang=""x-default"">Гаранционна декларация

Необходимо е споразумение за прехвърляне на материали	Yes