SaOS-2

300331

GENERELLE OPLYSNINGER

Beskrivelse

Saos-2-celler er en osteosarkomcellelinje, der stammer fra det primære osteogene sarkom hos en 11-årig kaukasisk kvinde. Disse celler er en bredt anerkendt model til undersøgelse af osteosarkom og knoglebiologi på grund af deres osteoblastiske egenskaber og evnen til at producere en knoglelignende ekstracellulær matrix.
Saos-2-celler er kendetegnet ved deres høje niveau af alkalisk fosfataseaktivitet og udtryk for knoglespecifikke proteiner som osteocalcin og osteopontin og fungerer som et effektivt in vitro-system til at studere knogledannelse og osteosarkoms patofysiologi. De er særligt værdifulde til at undersøge cellulære reaktioner på forskellige biokemiske stimuli og mekaniske kræfter, der efterligner knoglemiljøet.
Saos-2-celler udviser også en aneuploid karyotype, der mangler flere kromosomer, men har ekstra kopier af andre, hvilket er typisk for mange kræftcellelinjer. De er negative for mycoplasma og har en robust evne til forkalkning, hvilket gør dem velegnede til analyser relateret til mineralaflejring.
I forbindelse med kræftforskning bruges Saos-2-celler i vid udstrækning til at udforske de molekylære mekanismer i tumorigenese, metastase og virkningerne af kræftmedicin på osteosarkom. Cellerne bruges også til at undersøge genekspressionsprofiler, der er forbundet med osteoblastisk differentiering og malignitet.
På grund af deres høje transfektibilitet er Saos-2-celler velegnede til genetisk manipulation, hvilket giver mulighed for at studere genfunktion og validere molekylære mål for terapeutisk indgriben. Denne tilpasningsevne har muliggjort betydelige fremskridt i forståelsen af det genetiske og molekylære grundlag for knoglekræft og i udviklingen af målrettede behandlinger af osteosarkom.

Væv	Knogle
Sygdom	Osteosarkom

Synonymer

- SAOS-2
- Saos-2
- SAOS 2
- Saos 2
- Saos2
- SaOs2
- SAOS2
- Sarcoma OSteogenic-2
- SaOS
- SAOS

KLASSIFICERING

Organisme	Menneske
Køn	Kvinde
Vækstegenskaber	Tilhænger
Biosikkerhedsniveau	1

EGENSKABER

Morfologi	Epitel-lignende
Tumorfremkaldende	Nej

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

MSI-status	Stabil (MSS)

Karyotype

Stamkromosomantallet er hypotriploidt med et modalt antal på 56 kromosomer pr. celle, og 2S-komponenten forekommer med 13,2 %. Over to tredjedele af kromosomkomplementet bestod af strukturelt omarrangerede kromosomer. De fleste markørkromosomer havde komplekse omlejringer. Oprindelsen af de segmenter, der udgør disse markører, kunne ikke identificeres. Af de identificerbare markører var 6p+/q+, 7p+, 11p+ og 12p+ lejlighedsvis til stede i 2 kopier pr. celle. Y-kromosomet blev ikke påvist i det QM-farvede præparat.

Fordoblingstid	35 til 40 timer

IDENTIFIKATORER

Kildehenvisning

SaOS-2 (Cytion katalognummer 300331)

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_0548

UDTRYK OG MODTAGELIGHED

Udtrykte receptorer

Epidermal vækstfaktor (EGF), transformerende vækstfaktor beta (type 1 og type 2)

Antigenudtryk

Blodtype B, Rh+, HLA A2, A3, Bw16, Bw47

Isoenzymer

Me-2, 1, PGM3, 1-2, PGM1, 1-2, ES-D, 2, AK-1, 1, GLO-1, 2, G6PD, B, Fænotypefrekvensprodukt: 0.0002

HÅNDTERING OG OPDRÆT

Næringsmedium

DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3,1 g/L Glucose, w: 2,5 mM L-Glutamin, w: 15 mM HEPES, w: 0,5 mM Sodium pyruvate, w: 1,2 g/L NaHCO3 (Cytion artikelnummer 820400a)

Inkubationsatmosfære	37°C, 5%CO2, befugtet atmosfære.

Kosttilskud

Suppler mediet med 10% FBS

Dissociationsreagens	Accutase

Oddyrkning

Fjern det gamle medium fra de klæbende celler, og vask dem med PBS, der ikke indeholder calcium og magnesium. Brug 3-5 ml PBS til T25-kolber og 5-10 ml til T75-kolber. Dæk derefter cellerne helt med Accutase, brug 1-2 ml til T25-kolber og 2,5 ml til T75-kolber. Lad cellerne inkubere ved stuetemperatur i 8-10 minutter for at løsne dem. Efter inkubationen blandes cellerne forsigtigt med 10 ml medium for at resuspendere dem, og centrifugeres derefter ved 300xg i 3 minutter. Kassér supernatanten, resuspender cellerne i frisk medium, og overfør dem til nye kolber, der allerede indeholder frisk medium.

Såtæthed	1 x 10^4 celler/cm^2
Væskeudskiftning	2 til 3 gange om ugen
Genopretning efter optøning	Hurtig

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Optøning og dyrkning

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROL OG KRYOPRÆSERVERING

Sterilitet

Mycoplasma-kontaminering udelukkes ved hjælp af både PCR-baserede assays og luminescensbaserede mycoplasma-detektionsmetoder. For at sikre, at der ikke er nogen bakterie-, svampe- eller gærforurening, underkastes cellekulturerne daglige visuelle inspektioner.

Frysemedium	Som kryopræserveringsmedium bruger vi komplet vækstmedium (inklusive FBS) + 10 % DMSO for tilstrækkelig levedygtighed efter optøning eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som indeholder optimerede osmobeskyttende stoffer og metaboliske stabilisatorer for at forbedre genopretningen og reducere kryo-induceret stress.

Opbevaringsbetingelser

For langtidsopbevaring anbringes hætteglas i flydende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Opbevaring ved -80 °C er kun acceptabelt som et kort mellemtrin før overførsel til flydende nitrogen.

Leveringsbetingelser

Kryopræserverede cellelinjer sendes på tøris i valideret, isoleret emballage med tilstrækkeligt kølemiddel til at opretholde ca. -78 °C under hele transporten. Ved modtagelse skal beholderen straks inspiceres, og hætteglassene skal straks overføres til passende opbevaring.

DONOR

Donorens alder	11 år
Etnisk tilhørsforhold	Kaukasisk

JURIDISKE FORHOLD OG SIKKERHED

Sikkerhedsforanstaltninger

Når man planlægger at opbevare et kryovæske i flydende nitrogen med henblik på fremtidig optøning, er det obligatorisk at overholde strenge sikkerhedsforanstaltninger. Passende beskyttelseshandsker og -tøj er afgørende, og der skal bruges ansigtsmaske eller sikkerhedsbriller under overførslen af frosne prøver til eller fra tanken med flydende nitrogen. Dette er for at mindske risikoen for skader fra potentielle kryovæskeeksplosioner ved fjernelse, som kan resultere i projektion af skarpe fragmenter.

Garanti

Hos Cytion står vi inde for vores produkters kvalitet og levedygtighed.
Vi garanterer, at vores celler vil være levedygtige ved kulturens start i 60 dage efter afsendelse fra vores faciliteter.
Vi sikrer, at alle materialer er i overensstemmelse med de specifikationer, der er beskrevet i analysecertifikatet og/eller produktarket
For alle detaljer henvises til vores <a href="”/Who-we-are/Warranty/”" hreflang="”x-default”">Garantierklæring

Der kræves en aftale om overførsel af materiale	Yes