SK-BR-3

300333

ÜLDINE TEAVE

Kirjeldus

SK-BR-3 rakud on inimese rinnavähi rakuliin, mis on isoleeritud 43-aastase metastaatilise rinnavähiga naissoost patsiendi pleuraefusioonist. SKBR3 rakud loodi 1970ndate alguses ja on tuntud inimese epidermise kasvufaktori retseptori 2 (HER2) üleekspressiooni poolest, mis on retseptori türosiini kinaas, millel on oluline roll teatud tüüpi rinnavähi patogeneesis ja progresseerumises.
Rakuliinile on iseloomulikud rinnavähi puhul levinud geneetilised aberratsioonid, sealhulgas HER2 geeni amplifikatsioon ja mutatsioonid p53 kasvajasupressorgeenis. HER2 üleekspressioon SK-BR-3 rakkudes teeb neist väärtusliku mudeli HER2-positiivse rinnavähi uurimiseks, mida iseloomustab agressiivne kasv ja halb prognoos, ning HER2-le suunatud ravimeetodite jaoks. SK-BR-3 rakud on olnud olulised HER2-vastase monoklonaalse antikeha trastuzumabi (Herceptin) uurimisel, millest on saanud HER2-positiivse rinnavähi ravi nurgakivi.
SK-BR-3 rakkudel on tugev in vitro kasvutempo ja neid on kasutatud mitmesugustes katsesüsteemides, sealhulgas rakusignaalide, ravimiresistentsuse, apoptoosi ja vähirakkude tsükli uuringutes. Need rakud on ka peamine ressurss monoklonaalsete antikehade tootmiseks ja rinnavähirakkude immuunvastuse uurimiseks.
Kokkuvõttes on SK-BR-3 rakuliin asendamatu vahend rinnavähi uurimisel, pakkudes põhjalikke teadmisi HER2-positiivsete kasvajate bioloogiast ja hõlbustades sihtotstarbeliste ravimeetodite väljatöötamist, mis on oluliselt parandanud selle raske vähivormiga patsientide väljavaateid.

Kude	Rind, rinnanäärme
Haigus	Invasiivne ductus kartsinoom
Metastaaside asukoht	Pleuraefusioon

Sünonüümid

- SK-Br-3
- Sk-Br-3
- SK BR 03
- SKBR-3
- SKBr-3
- SK-BR3
- SKBr3
- SkBr3
- SKBR3

KLASSIFIKATSIOON

Organism	Inimene
Sugu	Naine
Kasvuvõime	Järgija
Bioloogilise ohutuse tase	1

OMADUSED

Morfoloogia	Epiteelilaadsed
Tuumorigeenne	Jah, moodustab alasti hiirtel halvasti diferentseerunud adenokartsinoomi

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Karyotüüp

(P9) hüpertriploidne kuni hüpotetraploidne (+A, +B, +C, +E, +F, +G, -D), millel on kõrvalekaldeid, sealhulgas ditsentrilised, akrotsentrilised fragmendid, rõngad, sekundaarsed ahenemised, suured metatsentrilised või polütsentrilised ja suured submetatsentrilised markerid

Kahekordistumisaeg	30 tundi

TUNNUSED

Viide

SK-BR-3 (Cytioni kataloginumber 300333)

NCBI maksukood	9606
Cellosaurus	CVCL_0033

AVALDUMINE JA VASTUVÕTLIKKUS

Valgu ekspressioon

P53 positiivne

Antigeeni ekspressioon

Veregrupp A, Rh+, HLA A11, Bw22(+/-), B40, B18

Isoensüümid

PGM3, 1, PGM1, 1-2, ES-D, 1, AK-1, 1-2, GLO-1, 2, G6PD, B, fenotüübi sagedustoode: 0.0044

Mutatsiooniprofiil

TP53 mut

KÄSITLEMINE JA KASVATAMINE

Kasvatuskeskkond

McCoys 5a, w: 3,0 g/L glükoos, w: stabiilne glutamiin, w: 2,0 mM naatriumpüruvaat, w: 2,2 g/L NaHCO3 (Cytioni artikli number 820200a)

Inkubatsiooni keskkond	37°C, 5%CO2, niisutatud atmosfäär.

Toidulisandid

Täiendada söötme 10% FBS-ga

Dissotsiatsioonireaktiiv	Accutase

Kultuuri edasikasvatamine

Eemaldage kleepunud rakkudelt vana söötme ja peske neid PBS-ga, milles puudub kaltsium ja magneesium. T25 kolbide puhul kasutage 3-5 ml PBS-i ja T75 kolbide puhul 5-10 ml. Seejärel katke rakud täielikult Accutase'iga, kasutades 1-2 ml T25 kolbide puhul ja 2,5 ml T75 kolbide puhul. Laske rakkudel inkubeerida 8-10 minutit toatemperatuuril, et need eralduksid. Pärast inkubeerimist segage rakud ettevaatlikult 10 ml söötmega, et neid resuspenseerida, seejärel tsentrifuugige 3 minutit 300xg juures. Visake supernatant ära, suspenseerige rakud uuesti värskes keskkonnas ja viige need uutesse kolvidesse, mis sisaldavad juba värsket keskkonda.

Külvitihedus	Alusta kultuuri kasvatamist krüoviaalist 3 x 10^4 rakku/cm^2. Kasuta 2 x 10^4 rakku/cm^2 jätkuvateks subkultuurideks.
Vedeliku vahetus	2 kuni 3 korda nädalas
Taastumine pärast sulamist	Pärast sulatamist asetage rakud plaadile tihedusega 5 x 10^4 rakku/cm^2 ja laske rakkudel külmutamisprotsessist taastuda ja kinnituda vähemalt 24 tunni jooksul.

Sulatamine ja kasvatamine

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITEEDIKONTROLL JA KRÜOKONSERVEERIMINE

Viljatus

Mükoplasmakontaminatsioon on välistatud nii PCR-põhiste analüüside kui ka luminestsentsil põhinevate mükoplasma tuvastamise meetodite abil.
Bakteriaalse, seene- või pärmsaaste puudumise tagamiseks kontrollitakse rakukultuure iga päev visuaalselt.

Külmutuskeskkond	Krüosäilitusvedelikusena kasutame täielikku kasvukeskkonda (sh FBS) + 10% DMSO, et tagada piisav elujõulisus pärast sulatamist, või CM-1 (Cytioni katalooginumber 800100), mis sisaldab optimeeritud osmoprotektante ja metaboolseid stabilisaatoreid, et parandada taastumist ja vähendada krüostressi.

Säilitamistingimused

Pikaajaliseks säilitamiseks asetage viaalid aurufaasis vedela lämmastikuga umbes -150 kuni -196 °C juures. Säilitamine temperatuuril -80 °C on vastuvõetav ainult lühikese vaheetapina enne vedela lämmastikuga üleviimist.

Tarne- ja kohaletoimetamistingimused

Krüokonserveeritud rakuliinid transporditakse kuiva jääga valideeritud, isoleeritud pakendis, milles on piisavalt külmutusainet, et säilitada kogu transpordi jooksul ligikaudu -78 °C. Vastuvõtmisel kontrollige konteinerit kohe ja viige viaalid viivitamatult sobivasse hoiuruumi.

ANNETAJA

Doonori vanus	43 aastat
Etniline kuuluvus	Kaukaasia

ÕIGUSLIKUD JA OHUTUSALASED KÜSIMUSED

Ohutusnõuded

Kui plaanitakse krüoviaalide säilitamist vedelas lämmastikus tulevase sulatamise eesmärgil, on kohustuslik järgida rangeid ohutusmeetmeid. Asjakohased kaitsekindad ja -riietus on hädavajalikud ning külmutatud proovide vedela lämmastiku mahutisse või mahutist väljaviimisel tuleb kasutada näomaski või kaitseprille. See on vajalik selleks, et vähendada vigastuste ohtu, mis tuleneb võimalikest krüoviaalide plahvatustest eemaldamisel, mille tagajärjel võivad välja paiskuda teravad killud.

Garantii

Cytion seisab oma toodete kvaliteedi ja elujõulisuse eest.
Me garanteerime, et meie rakud on elujõulised kasvatamise alguses 60 päeva jooksul pärast meie rajatistest saatmist.
Tagame, et kõik materjalid vastavad analüüsisertifikaadis ja/või tootelehel kirjeldatud spetsifikatsioonidele
Täielikke üksikasju leiate meie <a href="""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang="""x-default"">Tagatise avaldusest

Vajalik on materjalide üleandmise leping	Yes