SK-LU-1

300335

INFORMAÇÕES GERAIS

Descrição

A SK-LU-1 é uma linha celular de adenocarcinoma do pulmão humano amplamente utilizada na investigação sobre o cancro, particularmente em estudos centrados no cancro do pulmão de células não pequenas (NSCLC). Sendo uma linha celular sensível à cisplatina, a SK-LU-1 é frequentemente utilizada em estudos que avaliam a resistência à quimioterapia, a progressão do ciclo celular do cancro e os mecanismos de apoptose. Uma das caraterísticas que definem a SK-LU-1 é a sua utilidade na avaliação dos efeitos citotóxicos de vários compostos anticancerígenos, incluindo os que modulam o ciclo celular ou induzem a apoptose através de terapias orientadas. Por exemplo, alguns derivados de imidazopiridina 6-substituídos demonstraram induzir a paragem da fase G2/M e a apoptose nas células SK-LU-1, indicando que estes compostos podem inibir as cinases dependentes da ciclina (CDK) envolvidas na divisão das células cancerosas.
Além disso, as células SK-LU-1 têm sido utilizadas em estudos que exploram os efeitos imunomoduladores de agentes como a melatonina. Em experiências de co-cultura com células mononucleares do sangue periférico (PBMCs), a melatonina demonstrou aumentar a capacidade do sistema imunitário para induzir a apoptose nas células SK-LU-1. O tratamento levou a um aumento do stress oxidativo, redução dos níveis de glutationa (GSH) e paragem do ciclo celular na fase G0/G1, sugerindo que a melatonina pode ter potencial como tratamento suplementar em NSCLC, aumentando a resposta imunitária e promovendo a morte das células cancerígenas.
Globalmente, o SK-LU-1 constitui um modelo in vitro robusto para estudar o adenocarcinoma do pulmão e testar novos agentes terapêuticos, incluindo os que visam o ciclo celular, induzem a apoptose ou modulam as respostas imunitárias. A sua capacidade de reação a agentes quimioterapêuticos como a cisplatina e a vasta gama de dados experimentais disponíveis tornam-no uma ferramenta importante na investigação do CPNPC.

Tecido	Pulmão
Doença	Adenocarcinoma (grau III)

Sinónimos

- SK-Lu-1
- SK LU 1
- SK-Lu1
- SK-LU1
- SKLU-1
- SKLU1
- SKLU01

CLASSIFICAÇÃO

Organismo	Humano
Sexo	Feminino
Propriedades de crescimento	Aderente
Nível de biossegurança	1

CARACTERÍSTICAS

Morfologia	De tipo epitelial
Tumorigénico	Sim, em ratos imunotolerantes e ratinhos nu-nu

Cariótipo

O número de cromossomas da linha de caule é hipotetraplóide, com o componente 2S a ocorrer em 4,4%. Cromossomas marcadores 1p, t(1q,11q), 11q+, t(13,?), 16q+, t(12q, 18q). M10, t(2q,13q), i(15), e ?t(xp,21q) ocorreram em todas as metáfases S, e t(1p,?), t(1p,14q), t(16,?), e t(14,21) ocorreram em algumas. Para além disso, ocorreram frequentemente 4 a 9 pequenos marcadores de origem não identificável. O cromossoma n.º 7 era geralmente hexassómico, os cromossomas x eram dissómicos e o cromossoma n.º 15 normal estava ausente. Não foi detectado qualquer cromossoma Y na preparação corada com QM. Produto de frequência fenotípica: 0.00003

IDENTIFICADORES

Referência

SK-LU-1 (número de catálogo Cytion 300335)

Número de identificação fiscal do NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_0629

EXPRESSÃO E SUSCETIBILIDADE

Expressão proteica

P53 positivo

Expressão do antígeno

Tipo de sangue O, Rh+, HLA Aw24, Aw32, B27, Bw41

Isoenzimas

Me-2, 1, PGM3, 1, PGM1, 2, ES-D, 2, AK-1, 1, GLO-1, 2, G6PD, B

MANUSEAMENTO E CULTURA

Meio de cultura

EMEM (MEM Eagle), com: 2 mM L-Glutamina, com: 2,2 g/L NaHCO3, com: EBSS (número de artigo Cytion 820100a)

Atmosfera de incubação	37°C, 5%CO2, atmosfera humidificada.

Suplementos

Completar o meio com 10% de FBS e 1% de NEAA

Reagente de dissociação	Accutase

Subcultura

Retirar o meio antigo das células aderentes e lavá-las com PBS sem cálcio e magnésio. Nos frascos T25, utilizar 3-5 ml de PBS e nos frascos T75, 5-10 ml. Em seguida, cobrir completamente as células com Accutase, utilizando 1-2 ml para os frascos T25 e 2,5 ml para os frascos T75. Deixar as células incubar à temperatura ambiente durante 8-10 minutos para as destacar. Após a incubação, misturar suavemente as células com 10 ml de meio para as ressuspender e, em seguida, centrifugar a 300xg durante 3 minutos. Deitar fora o sobrenadante, ressuspender as células em meio fresco e transferi-las para novos frascos que já contenham meio fresco.

Densidade de sementeira	1 x 10^4 células/cm^2
Renovação de fluidos	2 vezes por semana
Recuperação após o descongelamento	Após o descongelamento, coloque as células em placas a uma densidade de 5 x 10^4 células/cm^2 e deixe-as recuperar do processo de congelamento e aderir durante pelo menos 24 horas.

Descongelamento e cultura

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTROLO DE QUALIDADE E CRIOPRESERVAÇÃO

Esterilidade

A contaminação por micoplasma é excluída utilizando ensaios baseados em PCR e métodos de deteção de micoplasma baseados em luminescência.
Para garantir que não há contaminação bacteriana, fúngica ou de leveduras, as culturas de células são sujeitas a inspecções visuais diárias.

Meio de congelação	Como meio de criopreservação, utilizamos um meio de crescimento completo (incluindo FBS) + 10% DMSO para uma viabilidade pós-descongelamento adequada, ou CM-1 (número de catálogo Cytion 800100), que inclui osmoprotectores optimizados e estabilizadores metabólicos para melhorar a recuperação e reduzir o stress induzido pela crio.

Condições de armazenamento

Para conservação a longo prazo, colocar os frascos em azoto líquido em fase de vapor a uma temperatura entre -150 e -196 °C. O armazenamento a -80 °C é aceitável apenas como um curto passo intermédio antes da transferência para azoto líquido.

Condições de envio

As linhas celulares criopreservadas são expedidas em gelo seco em embalagens validadas e isoladas com refrigerante suficiente para manter aproximadamente -78 °C durante o transporte. Aquando da receção, inspecionar imediatamente o recipiente e transferir sem demora os frascos para um local de armazenamento adequado.

DOADOR

Idade do dador	60 anos
Etnia	Caucasiano

ASPECTOS LEGAIS E DE SEGURANÇA

Precauções de segurança

Quando se planeia armazenar um criovial em nitrogénio líquido para descongelação futura, é obrigatório aderir a medidas de segurança rigorosas. Luvas e vestuário de proteção adequados são essenciais, e a utilização de uma máscara facial ou óculos de segurança é necessária durante a transferência de amostras congeladas para ou do tanque de nitrogénio líquido. Isto destina-se a mitigar o risco de ferimentos provocados por potenciais explosões de crioviais após a remoção, que podem resultar na projeção de fragmentos afiados.

Garantia

Na Cytion, nós garantimos a qualidade e a viabilidade de nossos produtos.
Garantimos que nossas células serão viáveis no início da cultura por 60 dias após o envio de nossas instalações.
Asseguramos que todos os materiais estão em conformidade com as especificações descritas no Certificado de Análise e/ou Folha de Produto
Para mais informações, consulte a nossa <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Declaração de Garantia

É necessário um Acordo de Transferência de Material	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB