SK-LU-1

300335

GENERAL INFORMATION

Description

A SK-LU-1 é uma linhagem celular de adenocarcinoma pulmonar humano amplamente utilizada na pesquisa sobre o câncer, particularmente em estudos voltados para o câncer de pulmão de células não pequenas (NSCLC). Por ser uma linhagem celular sensível à cisplatina, a SK-LU-1 é frequentemente empregada em estudos que avaliam a resistência à quimioterapia, a progressão do ciclo celular canceroso e os mecanismos de apoptose. Uma das características marcantes da SK-LU-1 é sua utilidade na avaliação dos efeitos citotóxicos de vários compostos anticâncer, incluindo aqueles que modulam o ciclo celular ou induzem a apoptose por meio de terapias direcionadas. Por exemplo, demonstrou-se que certos derivados de imidazopiridina 6-substituídos induzem a parada na fase G2/M e a apoptose em células SK-LU-1, indicando que esses compostos podem inibir as cinases dependentes de ciclina (CDKs) envolvidas na divisão celular do câncer. Além disso, as células SK-LU-1 têm sido utilizadas em estudos que exploram os efeitos imunomoduladores de agentes como a melatonina. Em experimentos de cocultura com células mononucleares do sangue periférico (PBMCs), demonstrou-se que a melatonina aumenta a capacidade do sistema imunológico de induzir a apoptose nas células SK-LU-1. O tratamento levou ao aumento do estresse oxidativo, à redução dos níveis de glutationa (GSH) e à parada do ciclo celular na fase G0/G1, sugerindo que a melatonina pode ter potencial como tratamento complementar no NSCLC, ao potencializar a resposta imunológica e promover a morte das células cancerosas.
De modo geral, a linha celular SK-LU-1 oferece um modelo in vitro robusto para o estudo do adenocarcinoma de pulmão e para o teste de novos agentes terapêuticos, incluindo aqueles que têm como alvo o ciclo celular, induzem a apoptose ou modulam as respostas imunológicas. Sua responsividade a agentes quimioterápicos como a cisplatina e a ampla gama de dados experimentais disponíveis fazem dele uma ferramenta importante na pesquisa do NSCLC.

Tissue	Pulmão
Disease	Adenocarcinoma (grau III)

Synonyms

- SK-Lu-1
- SK LU 1
- SK-Lu1
- SK-LU1
- SKLU-1
- SKLU1
- SKLU01

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Female
Growth properties	Adherent
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	De tipo epitelial
Tumourigenic	Sim, em ratos imunotolerantes e camundongos nu-nu

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Karyotype

O número cromossômico da linhagem-tronco é hipotetraplóide, com o componente 2S representando 4,4%. Cromossomos marcadores 1p, t(1q,11q), 11q+, t(13,?), 16q+, t(12q, 18q). M10, t(2q,13q), i(15) e ?t(xp,21q) ocorreram em todas as metafases S, e t(1p,?), t(1p,14q), t(16,?) e t(14,21) ocorreram em algumas. Além disso, ocorreram com frequência de 4 a 9 pequenos marcadores de origem não identificável. O cromossomo nº 7 era geralmente hexassômico, os cromossomos X eram disômicos e o cromossomo nº 15 normal estava ausente. Nenhum cromossomo Y foi detectado na preparação corada com QM. Produto de frequência fenotípica: 0,00003

IDENTIFIERS

Citation

SK-LU-1 (número de catálogo da Cytion 300335)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_0629

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Protein expression

P53 positivo

Antigen expression

Tipo sanguíneo O, Rh+, HLA Aw24, Aw32, B27, Bw41

Isoenzymes

Me-2, 1, PGM3, 1, PGM1, 2, ES-D, 2, AK-1, 1, GLO-1, 2, G6PD, B

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

EMEM (MEM Eagle), contendo: 2 mM de L-glutamina, contendo: 2,2 g/L de $NaHCO_3$, contendo: EBSS (número de artigo da Cytion 820100a)

Incubation atmosphere	37 °C, 5% de CO_2, atmosfera umidificada.

Supplements

Adicione ao meio 10% de FBS e 1% de NEAA

Dissociation reagent	Accutase

Subculturing

Remova o meio antigo das células aderentes e lave-as com PBS sem cálcio nem magnésio. Para frascos T25, use 3 a 5 ml de PBS; para frascos T75, use 5 a 10 ml. Em seguida, cubra as células completamente com Accutase, utilizando 1 a 2 ml para frascos T25 e 2,5 ml para frascos T75. Deixe as células incubarem à temperatura ambiente por 8 a 10 minutos para que se desprendam. Após a incubação, misture delicadamente as células com 10 ml de meio para ressuspender, depois centrifugue a 300xg por 3 minutos. Descarte o sobrenadante, ressuspenda as células em meio fresco e transfira-as para novos frascos que já contenham meio fresco.

Seeding density	1 x 10^4 células/cm^2
Fluid renewal	2 vezes por semana
Post-thaw recovery	Após o descongelamento, semeie as células a uma densidade de 5 x 10^4 células/cm^2 e deixe que elas se recuperem do processo de congelamento e se adiram por pelo menos 24 horas.

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

A contaminação por micoplasma é descartada por meio de ensaios baseados em PCR e de métodos de detecção de micoplasma baseados em luminescência.
Para garantir que não haja contaminação por bactérias, fungos ou leveduras, as culturas celulares são submetidas a inspeções visuais diárias.

Freeze medium	Como meio de criopreservação, utilizamos meio de crescimento completo (incluindo FBS) + 10% de DMSO para garantir viabilidade adequada após o descongelamento, ou CM-1 (número de catálogo da Cytion 800100), que inclui osmoprotetores e estabilizadores metabólicos otimizados para melhorar a recuperação e reduzir o estresse induzido pela criopreservação.

Storage conditions

Para preservação a longo prazo, coloque os frascos em nitrogênio líquido em fase de vapor a uma temperatura entre aproximadamente −150 e −196 °C. O armazenamento a −80 °C é aceitável apenas como uma etapa intermediária de curta duração antes da transferência para o nitrogênio líquido.

Shipping conditions

As linhagens celulares criopreservadas são enviadas em gelo seco, em embalagens isoladas e validadas, com refrigerante suficiente para manter a temperatura em aproximadamente −78 °C durante todo o transporte. Ao receber a remessa, inspecione o recipiente imediatamente e transfira os frascos sem demora para o local de armazenamento adequado.

DONOR

Donor age	60 anos
Ethnicity	caucasiano

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

Ao planejar o armazenamento de um criotubo em nitrogênio líquido para descongelamento futuro, é obrigatório seguir medidas de segurança rigorosas. É essencial o uso de luvas e roupas de proteção adequadas, além do uso obrigatório de máscara facial ou óculos de proteção durante a transferência de amostras congeladas para dentro ou para fora do tanque de nitrogênio líquido. Isso visa mitigar o risco de ferimentos decorrentes de possíveis explosões dos criotubos durante a remoção, o que pode resultar na projeção de fragmentos pontiagudos.

Warranty

Na Cytion, garantimos a qualidade e a viabilidade de nossos produtos.
Garantimos que nossas células permanecerão viáveis no início da cultura por
60 dias após o envio de nossas instalações.
Asseguramos que todos os materiais estão em conformidade com as especificações descritas no
Certificado de Análise e/ou na Ficha Técnica do Produto.
Para obter todos os detalhes, consulte nossa
Declaração de Garantia.

Material Transfer Agreement required	Yes