HuT-78

300338

GENERAL INFORMATION

Description

La línea celular HuT-78 es una línea de linfoma de células T humanas derivada de un paciente con síndrome de Sézary, una variante leucémica del linfoma cutáneo de células T (CTCL). Estas células se caracterizan por su fenotipo de células T colaboradoras maduras, que expresan CD4 y carecen de marcadores de superficie CD8, lo cual concuerda con su origen en una población de células T malignas. Las células HuT-78 son particularmente importantes en estudios sobre la biología de las células T, la respuesta inmunitaria y el linfoma, ya que ofrecen información sobre los mecanismos moleculares y celulares que subyacen a las leucemias y linfomas de células T.
Las células HuT-78 presentan una variedad de cariotipos anormales, que incluyen reordenamientos cromosómicos complejos y aneuploidía, los cuales suelen estar asociados con su fenotipo maligno. Estas células responden a la estimulación mitogénica, lo que puede aprovecharse en investigaciones relacionadas con la activación de las células T y las vías de señalización. Además, las células HuT-78 son sensibles a diversos agentes quimioterapéuticos, lo que las convierte en un modelo valioso para probar medicamentos contra el cáncer, particularmente aquellos dirigidos a los linfomas de células T. Los investigadores también utilizan las células HuT-78 para estudiar las interacciones entre las células de linfoma y el sistema inmunológico, lo que permite comprender mejor los mecanismos de evasión inmunológica.
Esta línea celular se cultiva en suspensión, lo que requiere condiciones específicas para mantener su viabilidad y crecimiento. Las células HuT-78 son fundamentales para avanzar en la comprensión de la patogénesis de los CTCL y en el desarrollo de posibles estrategias terapéuticas dirigidas a las células T malignas.

Tissue	Sangre
Disease	Micosis fungoide y síndrome de Sezary

Synonyms

- Hut 78
- HUT 78
- HuT 78
- HUT-78
- HuT78
- Hut78
- HUT78
- NCI-H78

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Male
Growth properties	Suspension
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	Células redondas
Cell type	Linfoblasto T

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IDENTIFIERS

Citation

HuT-78 (número de catálogo de Cytion 300338)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_0337

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Receptors expressed

Interleucina-2 (interleucina 2, IL-2)

Protein expression

P53 negativo

Antigen expression

CD4

Products

Interleucina-2 (interleucina 2, IL-2), factor de necrosis tumoral alfa (TNF alfa)

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

RPMI 1640, con 2,0 mM de glutamina estable y 2,0 g/L de $NaHCO_3$ (número de artículo de Cytion: 820700a)

Incubation atmosphere	37 °C, 5 % de CO_2, atmósfera humidificada.

Supplements

Añade al medio un 10 % de suero fetal bovino (FBS) inactivado por calor

Subculturing

Mantenga los cultivos agregando o reemplazando el medio periódicamente. Inicie los cultivos con una densidad de 5×10^5 células/ml y mantenga la concentración celular dentro del rango de 3×10^5 a 1×10^6 células/ml para lograr un crecimiento óptimo.

Seeding density	1 x 10^5 células/ml
Fluid renewal	De 2 a 3 veces por semana
Post-thaw recovery	Deja que las células se recuperen del proceso de congelación durante 24 a 48 horas.

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

Se descarta la contaminación por micoplasmas mediante ensayos basados en PCR y métodos de detección de micoplasmas basados en luminiscencia.
Para garantizar que no haya contaminación bacteriana, fúngica o por levaduras, los cultivos celulares se someten a inspecciones visuales diarias.

Freeze medium	Como medio de criopreservación, utilizamos un medio de crecimiento completo (que incluye FBS) + 10 % de DMSO para garantizar una viabilidad adecuada tras la descongelación, o CM-1 (número de catálogo de Cytion 800100), que incluye osmoprotectores y estabilizadores metabólicos optimizados para mejorar la recuperación y reducir el estrés inducido por la criopreservación.

Storage conditions

Para la conservación a largo plazo, coloque los viales en nitrógeno líquido en fase de vapor a una temperatura de entre −150 y −196 °C, aproximadamente. El almacenamiento a −80 °C solo es aceptable como un paso intermedio breve antes de transferirlos al nitrógeno líquido.

Shipping conditions

Las líneas celulares criopreservadas se envían en hielo seco, en un embalaje aislante validado que contiene suficiente refrigerante para mantener una temperatura de aproximadamente −78 °C durante todo el transporte. Al recibir el envío, revise el contenedor de inmediato y traslade los viales sin demora al lugar de almacenamiento adecuado.

DONOR

Donor age	53 años
Ethnicity	caucásico

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

Cuando se planea almacenar un criovial en nitrógeno líquido para su descongelación futura, es obligatorio cumplir con estrictas medidas de seguridad. Es esencial contar con guantes y ropa de protección adecuados, y se requiere el uso de una mascarilla o lentes de seguridad durante la transferencia de muestras congeladas hacia o desde el tanque de nitrógeno líquido. Esto tiene como objetivo mitigar el riesgo de lesiones por posibles explosiones de los criotubos al retirarlos, lo que puede provocar la proyección de fragmentos afilados.

Warranty

En Cytion, respaldamos la calidad y la viabilidad de nuestros productos.
Garantizamos que nuestras células serán viables al inicio del cultivo durante
60 días a partir de la fecha de envío desde nuestras instalaciones.
Aseguramos que todos los materiales cumplen con las especificaciones descritas en el
Certificado de Análisis y/o la Ficha del Producto.
Para obtener más detalles, consulte nuestra
Declaración de garantía.

Material Transfer Agreement required	Yes